Бенари · семена цветов

Каталог



Salvia farinacea ‘Эволюция’®

Benary

www.Benary.de

Культуры и рекомендации по их возделыванию

Сорта и гибриды Бенари, а также лучшие оригинальные семена других селекционных фирм.



Абонентский ящик:
Postfach 11 27
34331 Hann. Muenden
Deutschland
Адрес офиса:
Petersweg 72
34346 Hann. Muenden

Телефон: +49 (0) 55 41 70 09 0
Факс: +49 (0) 55 41 70 09 20
e-mail: info@Benary.de
Интернет: www.Benary.de
www.Begonia-Nonstop.de
www.Viola-Cats.de

Адрес компании:
34346 Hann. Muenden

Торговый реестр:
Goettingen B 112002

Коммерческий директор:
Nick ten Pas

Изображение:
Scabiosa japonica var. Alpina 'Ритц синий'

FastraX

www.Benary.de

Ernst Benary Samenzucht GmbH: Инновации, Интерактивность, Информация



Echinacea
'Примадонна®
насыщенно-розовый'
и 'Белый'



Офис фирмы Benary в Ганн-Мюнден



Владимир Мостицкий во время работы выставки «Цветы 2005» Москве. Многие селекционные достижения фирмы Бенари были отмечены высокими наградами международных выставок

Начните свой новый сезон продаж с интересными, высококачественными продуктами Benary. Benary представляет инновационный, удовлетворяющий сегодняшним потребностям рынка ассортимент однолетников и двулетников для клумб, балконов, а также многолетники с высоким уровнем качества посевного материала и растений.

Мы предлагаем инновации не только за счет новых сортов, но и за счет нового качества ApeX-технологии посевного материала, которая гарантирует увеличение выхода рассады.

Вы можете дополнительно получить подробные сведения о новых различных культурах с описаниями и указаниями для достижения более высокого качества и оптимизации производственных процессов, если сделаете запрос на получение CD-ROM.

Интерактивность с целью повышения экономичности декоративного растениеводства на всех уровнях – все это предлагает Benary, как и интенсивную поддержку производства, а также развитие содействующей продаже программы "Point of Sale" - концепции для высококачественного ассортимента Benary. Используйте шанс для активного обмена опытом с Benary на ежегодных "Днях открытых дверей", инновационных выставках с разнообразными культурными новшествами, сравнениями сортов, широко представленными посадочными образцами и привлекательным представлением продаж.

Производители могут в любое время заказать из ассортимента Benary по своему выбору семена или молодые растения от поставщиков рассады. Для ответов на появившиеся вопросы Вы можете обратиться в наш отдел продаж в любое время. Обратитесь к нам, мы охотно проконсультируем Вас.



Penstemon 'Мистика' ApeX-семена



Penstemon 'Мистика'



Демонстрационные участки и тепцы Бенари в Ганн- Мюнден

www.Benary.de



Begonia tuberhybrida
F_1 л молодые растения
из ячеек

Содержание

Apex Seed – профессиональный посевной материал	3
Обзор новинок	4
Benary – семена цветов от А до Я	10
Benary – однолетние декоративные травы	180
Benary – многолетние декоративные травы	182
Benary – семена (декоративная капуста, декоративная тыква, томат)	185
Benary – семена пряных трав	187
Benary – программы	189
«Весенний Флирт»® - программа для ранней весны	189
«FastraX» - программа быстрых многолетников	190
Benary Материалы Point Of Sale	192
Индекс	194
Рекомендаци по выращиванию	200

Стадии проращивания

(от посева до готового молодого растения)

Стадия 1
Начинается с появления корня у зародыша. Корни касаются субстрата. Кончается при полном раскрытии зародышевых листьев.

Стадия 2
Исходным пунктом являются полностью раскрытые зародышевые листья. Кончается полностью развитым не семядольным листком и соответственно - парой листьев.

Стадия 3
Полностью развившийся настоящий лист или пара листьев до момента, когда готовы к продаже 80% молодых растений.

Стадия 4
Все молодые растения готовы к продаже и закалены. Эта стадия продолжается примерно 7 дней.

Используемые условные обозначения

⊙	однолетник или культивируемые как однолетники		Для обрамления, бордюров
⊙⊙	Двулетник или наилучшие результаты при выращивании в течение двух лет	△	Для альпийских горок
			Плоды декоративны
	многолетние растения и полукустарники	T	Образующий кустарник рост
		D	Душистые, ароматные
	Растение для выращивания в горшке		Ядовитое растение
W	Для отапливаемых теплиц	Bie	Медонос
K	Для холодных теплиц	Treib	Подходит для выгонки
	Теплолюбивые цветущие культуры	Арабские цифры – средняя высота растения в см	
	Холодостойкие цветущие культуры	Римские цифры – период цветения – месяцы I-XII для климатических условий центральной части Германии	
	Для посева в открытый грунт		
®	Зарегистрированный товарный знак	Минимальная партия (Min.) Самая маленькая по количеству единиц подлежащая доставке партия.	
○	Светолюбиво		
◐	Теневыносливо		
	Необходимо укрывать в зиму		
	Ползучее, вьющееся растение		
	Ампельное, свисающее растение		
	Подходит на срезку		

Benary Программы

FrühlingsFlirt®
Программа Benary для ранней весны

FastraX
программа Benary для многолетников, зацветающих в 1-й год (не требующих вернализации)

Награды


ALL AMERICA SELECTIONS WINNER	(AAS) ALL AMERICA SELECTIONS североамериканская организация за нововведения в области цветоводства
FLEUROSELECT GOLD MEDAL / FLEUROSELECT QUALITY	награжденный и соответственно проверенный FLEUROSELECT, европейским обществом за нововведения в области цветоводства
FloraStar® WINNER	FLOROSTAR североамериканская организация за новшества в области горшечного цветоводства
Benary APEX SEED	APEX SEED Посевной материал со значительно улучшенной всхожестью по сравнению с не необработанным материалом

ApeX Seed технология обработки семян от Benary для повышения экономичности

Высококачественный посевной материал - это ключ для рационального и экономичного производства молодых растений. Различные технологические методы работы с посевным материалом, используемые Benary, заботятся о том, чтобы с ApeX-материалами Вы смогли получить больше молодых растений более высокого качества.

Идея программы проста и даёт производителям молодых растений весомые преимущества:

- Более быстрое проращивание и высокая всхожесть
- Большее количество получаемых молодых растений
- Унифицированное развитие молодых растений
- Сокращение издержек при выращивании в ячеистых лотках
- Более надежное планирование культивирования
- Лучшая гигиена посевного материала и профилактика заболеваний
- Более удобный посев и контроль высева
- Сокращение периода покоя семени




Geum 'Cooky'
Apex - семена прошие специальную обработку с желтым покрытием (1-2% семян окрашены в синий цвет. л)
Необработанные семена (п)

Alchemilla 'Thriller'®
Apex - семена прошие специальную обработку (1-2% семян окрашены в синий цвет. л)
Необработанные семена (п)

Посевной материал ApeX имеет точно измеренные характеристики эффективности и экономичности. Используйте преимущества следующих продуктов, приносящих прибыль:

ApeX-сорта	Увеличение выхода рассады по сравнению с необработанными семенами	Минимальная всхожесть семян в земле
Alchemilla mollis 'Триллер'®	15%	80%
Geranium sanguineum 'Взгляд'®	30%	65%
Geum coccineum 'Печенье' (дополнительное пленочное покрытие)	20%	80%
Lavandula angustifolia 'Настоящая лаванда' 'Хидкот Синий', 'Munstead разнообразие'	30%	80%
Lewisia cotyledon 'Специальная смесь' (дополнительное пленочное покрытие)	15%	80%
Penstemon digitalis 'Мистика' (дополнительное пленочное покрытие)	30%	90%
Rudbeckia fulgida ' Золотой шторм'	25%	75%
Trollius chinensis 'Золотая королева'	60%	75%
Verbena rigida (venosa) и 'Поларис'®	15%	80%

Наряду с комплексными технологиями обработки посевного материала, Benary, предлагает стандартные дополнительные обработки семян с фунгицидами, образующие оболочки (гранулы) более чем для 52 серий и сортов.



Penstemon digitalis 'Mystica'
ApeX семена (л.) и простой посевной материал (п.)



Anthirrhinum 'Анимация смесь' (улучшенная.)



'Анимация бархатный красный'



'Анимация розовый'



Arabis 'Компинки'®



'Анимация светло-розовый' (улучшенная.)



'Анимация насыщенно-оранжевый'



'Анимация желтый' (улучшенная.)



Begonia F_1 'Нонстоп® насыщенно-красный'



Begonia F_1 'Олимпия® Спринт розовый'



Begonia F_1 'Олимпия® Спринт смесь' (улучшенная)



Begonia F_1 'Нонстоп® смесь' (улучшенная)



Begonia F_1 'Лото® яблоневый цвет'



Callistephus (Астра) 'Халк'



Callistephus (Астра) 'Халк'



Celosia 'Свежий взгляд оранжевый'



Echinacea 'Примадонна® белый'



Cosmos 'Космик смесь'



Cosmos 'Космик красный'



Delphinium 'Цвета лета'



Delphinium 'Летние звёзды'

Helianthus F_1 'Солита'



Delphinium 'Лис'



Delphinium 'Лис'



Gaillardia 'Солнце Аризоны'



Helianthus F_1 'Солита'



Gazania 'Талант® красные тона'



Helianthus 'Пачино® смесь'



Echinacea 'Примадонна® белый'

Benary НОВИНКИ 2004-2006



'Конфетка® яблоневый цвет'



Impatiens 'Конфетка ® смесь' (улученная)



Impatiens 'Конфетка® лавандовый'



Lobelia F_1 'Веселье® синий'



Lobelia F_1 'Веселье® лососевый'



Pentas F_1 'Калейдоскоп насыщенно-красный'



Pentas F_1 'Калейдоскоп карминово-красный'




Pentas F_1 'Калейдоскоп лиловый'



Pentas F_1 'Калейдоскоп яблоневый цвет'



Penstemon 'Мистика'



Lychnis 'Люмина' ассортимент



'Люмина красный темно-листный'




'Конфетка® яблоневый цвет'



'Люмина оранжевый'



'Конфетка® лавандовый'



'Люмина лососевые тона'



Pentas F_1 'Калейдоскоп' ассортимент

www.Benary.de



Pentas F_1 'Граффити смесь'



Pentas F_1 'Граффити светло-красный'




Pentas F_1 'Граффити фиолетовый'



Pentas F_1 'Граффити светло-розовый'



Pentas F_1 'Граффити белый'



Scabiosa 'Ритц синий'



Prunella 'Белла насыщенно-розовый'



Sedum 'Дух'



Scabiosa 'Ритц синий'







Сверху вниз:
Tagetes 'Атлантис желтый',
'Атлантис золотой',
'Атлантис оранжевый'



Salvia 'Сальвано'
('Сальваторе')



Salvia 'Эволюция'®



Rudbeckia 'Майя'



FLEUROSELECT GOLD MEDAL
Rudbeckia 'Майя'



Vinca 'Первый поцелуй черника'



Vinca 'Первый поцелуй румянец'



(слева направо) 'Фантазия красный с глазком', 'Белый с красным глазком', 'Желтый с глазком', 'Рубиновый', 'Фиолетовый'



Viola F_1 'Фантазия сиреневый'



Viola F_1 'Фантазия белый с глазком'

'Желтый с глазком' (улучшенный)

'Красный с глазком' (улучшенный)



Viola F_1 'Фантазия смесь' (улучшенная)



Melinis 'Саванна'

'Великаны Benary Сладкий лимон'

'Оклахома карминно-розовый'

'Оклахома желтый'

'Оклахома ванильный'

'Оклахома смесь серии' (улучшенная)



Zinnia 'Великаны Benary Сладкий лимон'

www.Benary.de

Новинки 2004 - 2005

Arabis caucasica	'Компинки'® ♀
Begonia semperflorens F_1	'Олимпия® Спринт розовый' ⊙ 'Олимпия® Спринт смесь' ⊙ (улучшенная)
Begonia tuberhybrida F_1	'Нонстоп® насыщенно-красный' ⊙ 'Нонстоп® смесь' ⊙ (улучшенная)
Cosmos sulphureus	'Космик красный' ⊙ 'Космик смесь' ⊙
Delphinium grandiflorum FastraX	'Летние звёзды' ♀ 'Цвета лета' ♀
Delphinium nudicaule FastraX	'Лис' ♀
Gaillardia x grandiflora (aristata) FastraX	'Солнце Аризоны' ♀ AAS ПОБЕДИТЕЛЬ FLEUROSELECT ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Helianthus annuus	'Пачино® смесь' ⊙
Lobelia speciosa F_1 FastraX	'Веселье® синий' ♀ FLEUROSELECT ЗНАК КАЧЕСТВА
Melinis (Rynchelytrum) nerviglumis	'Саванна' ⊙
Pentas lanceolata F_1	'Граффити светло-розовый' ⊙ 'Граффити светло-красный' ⊙ 'Граффити фиолетовый ⊙ 'Граффити белый' ⊙ 'Граффити смесь' ⊙
Prunella grandiflora FastraX	Белла насыщенно-розовый' ♀
Rudbeckia hirta	'Майя' ⊙ FLEUROSELCT ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Salvia splendens	'Сальвано' ⊙
Sedum selskianum FastraX	'Дух' ♀
Vinca (Catharanthus) hybrida	'Первый поцелуй черника' ⊙ AAS ПОБЕДИТЕЛЬ 'Первый поцелуй румянец' ⊙ (улучшенный) 'Первый поцелуй смесь' ⊙ (улучшенная)
Viola wittrockiana F_1	'Фантазия сиреневый' ⊙⊙ 'Фантазия белый с глазком" ⊙⊙ 'Фантазия смесь' ⊙⊙ (улучшенная)
Zinnia elegans	'Великаны Benary Сладкий лимон' ⊙
Zinnia elegans	'Оклахома желтый' ⊙ 'Оклахома карминно-розовый' ⊙ 'Оклахома ванильный' ⊙ 'Оклахома смесь серии' ⊙ (улучшенная)

Новинки 2005 - 2006

Antirrhinum majus F_1	'Анимация желтый' ⊙ (улучшенный) 'Анимация светло-розовый' ⊙ (улучшенный) 'Анимация розовый' ⊙ 'Анимация бархатный красный' ⊙ 'Анимация насыщенный оранжевый' ⊙ 'Анимация смесь' (улучшенная) ⊙
Begonia semperflorens F_1	'Лото® яблоневый цвет' ⊙
Callistephus chinensis (Астра)	'Халк' ⊙
Celosia plumosa	'Свежий взгляд оранжевый' ⊙ FLEUROSELECT ЗНАК КАЧЕСТВА
Echinacea purpurea	'Примадонна® белый' ♀
Gazania rigens	'Талант® красные тона' ⊙
Helianthus annuus F_1	'Солита' ⊙
Impatiens walleriana F_1	'Конфетка ® яблоневый цвет' ⊙ 'Конфетка ® лавандовый' ⊙ 'Конфетка ® смесь' ⊙ (улучшенная)
Lobelia speciosa F_1 FastraX	'Веселье® лососевый' ♀
Lychnis (Silene) x haageana FastraX	'Люмина красный темнолистный ' ♀ 'Люмина лососевые тона' ♀ 'Люмина оранжевый' ♀
Penstemon digitalis Benary APEX SEED	'Мистика' ♀
Pentas lanceolata F_1	'Калейдоскоп яблоневый цвет' ⊙ 'Калейдоскоп карминово-красный' ⊙ 'Калейдоскоп лиловый' ⊙ 'Калейдоскоп насыщенно-красный' ⊙
Salvia farinacea	'Эволюция'® ⊙ AAS ПОБЕДИТЕЛЬ FLEUROSELECT ЗНАК КАЧЕСТВА
Scabiosa japonica var. alpina FastraX	'Ритц синий' ♀
Tagetes erecta F_1	'Атлантис желтый' ⊙ 'Атлантис золотой' ⊙ 'Атлантис оранжевый' ⊙ 'Атлантис смесь' ⊙
Viola wittrockiana F_1	'Фантазия желтый с глазком' ⊙⊙ (улучшенный) 'Фантазия красный с глазком' ⊙⊙ (улучшенный) 'Фантазия рубиновый' ⊙⊙ 'Фантазия фиолетовый' ⊙⊙ 'Фантазия белый с красным глазком' ⊙⊙ 'Фантазия смесь' ⊙⊙ (улучшенная)



Achillea ‘Колорадо’



Achillea ‘Паркерс Вариетат’



Achillea ‘Вишневая королева’



Achillea ‘Aurea’



Achillea ‘Жемчужина Бенари’®

Achillea Тысячелистник ♃

Применение:	прочный многолетник, медонос, лекарственное растение, подходит для срезки. A. tomentosa для посадки на альпийской горке
Сроки продажи:	с марта по октябрь, срезка: июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	A. filipendulina: июль - август для цветения в конце мая - начале июня A. millefolium: декабрь - февраль для цветения в мае A. ptarmica: февраль-март для цветения в июле A. tomentosa: июль - август для цветения в конце мая - начале июня
Проращивание:	при 18-21 °C в течение 10-15 дней
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена слегка прижимают к почве и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев понижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	13-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка без заморозков при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Растения при зимовке укрывают нетканым полотном. Выгонка при 15-18 °C.

A 0150 Achillea filipendulina (в кг)
«Паркерс Вариетат» (Parkers Variet_t) (A. eupatorium)
90-120 см, бронзово-желтые ароматные зонтики на длинных стеблях, можно использовать как сухоцвет, VII-X ⚔

A 0160 Achillea millefolium «Колорадо» (Colorado) (в кг) FastraX
60, богатая смесь из красных, розовых, абрикосовых, желтых и кремово-белых тонов, а также чисто белых, культивируется как однолетник V-X ⚔

A 0170 Achillea millefolium «Вишневая королева» FastraX (Kirschkoenigin) (в кг)
60, от пурпурно-розового до пурпурно-красного, культивируется как однолетник V-X ⚔

A 0390 Achillea ptarmica «Жемчужина Бенари»® FastraX (Benarys Perle) (в кг)
60, густомахровые, белые маленькие шарики, элитное качество, культивируется как однолетник VII-X ⚔

A 0450 Achillea tomentosa «Aurea» (Aurea) (в кг)
20, желтый, VI-VIII, пушистый лиственный покров VI–VIII, △ ⫴

Aconitum Аконит, борец ♃

Применение:	растение для контейнера и групповых посадок, хорошо стоит в срезке
Сроки продажи:	рассада: март-апрель и август-октябрь; цветущие растения: июль-август; срезка: июль-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март
Проращивание:	1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C 1 неделя при 5-10 °C далее культивируется при 12-15 °C
Условия проращивания:	в прохладе, посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом, увлажняют и культивируют по приведенной температурной схеме. Холодную фазу осуществляют либо в ящиках в открытом грунте, либо в не отапливаемых теплицах. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата.
Температура:	10-13 °C. Температура вентиляции: 15 °C. Зимовка в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Зимовка без заморозков при 0-3°C. Очень раннее выращивание (до 4 недель) или выгонка на срезку в пленочном парнике производится с января при 8-10 °C и в феврале при 10-12 °C.

A 0850 Aconitum napellus «Ньюри Блю» (Newry Blue) (в гр)
90 см, темно-синий

Ageratum houstonianum Агератум Хоустона ⊙

Применение:	растения для клумб, рабаток, балконных ящиков, срезки
Сроки продажи:	с середины апреля по июнь, срезка: июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	середина декабря - март
Проращивание*:	Стадия I: 2-4 дня при 24-25 °C Стадия II: 5-7 дней при 22-24 °C Стадия II-IV: при 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать, семена прижимают, но не присыпают землей
Температура:	до появления проростков минимум 16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Более низкие температуры замедляют начало цветение. Температуры ниже 10 °C в течение длительного периода могут вызвать хлороз.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Ageratum F_1-Hybriden Агератум гибриды (в гр)

A 3640	«Голубой Дунай» (Blaue Donau) 18 см, средне-синий, ранний и равномерно развивающийся, обильное цветение
A 3770	«Королевские Гавайи» (Royal Hawaii) 15 см, пурпурно-фиолетовый, очень ранний, высокодекоративен, замечательно подходит для контейнеров
A 3830	«Белые Гавайи» (White Hawaii) 18, белые цветки, гладкий лиственный покров, неприхотлив, интенсивный рост

Агератум для срезки (в граммах)

A 3971	«Прекрасный букет» (Schnittwunder) (селекция Benary) 60 см, средне-синий, раскидистый крупноцветковый ✂
A 3980	«Белый букет» (Weisser Schnitt) 60, белоснежные, крупные цветки, прочные стебли, раскидистый, быстрый рост

Alchemilla mollis Манжетка мягкая 2↓

Применение:	прочное, неприхотливое растение, используется для обрамления клумб, как почвопокровник, как лекарственное растение, как декоративнолиственное и для срезки
Сроки продажи:	как декоративнолиственное: июль-сентябрь, цветущие: май июнь, срезка: апрель-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
Срок посева:	с ноября по март для получения хорошо укорененных не цветущих растений, апрель-июль для получения цветущих растений в следующем году Проращивание при 20-22 °C в течение 7-12 дней
Условия проращивания:	в темноте, посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листков температуру понижают до 18-20 °C и сокращают влажность.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C.Зимовка без заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка при 12-18 °C.

A 4090	«Триллер»® (Thriller) (в гр) 50 см, зеленовато-желтые цветки, декоративной формы похожие на зонтики, серо-зеленая листва, замечательный флористический аксессуар, VI-VII ✂
A 4090T	«Триллер»® (Thriller) (в гр) ApeX-Seed для более быстрого проращивания и повышения всхожести на 15%



Ageratum ‘Белый букет’



Ageratum F_1 ‘Королевские Гавайи’



Ageratum F_1‘Голубой Дунай’




Ageratum F_1 ‘Белые Гавайи’

Alchemilla ‘Триллер’®





ApeX- (л.) и простой посевной материал (п.)



Alyssum «Золотая Гора»



Alyssum «Компактум»

Allium schoenoprasum Лук шнитт смотри Benary Пряные травы

Alyssum montanum Алиссум горный ♃

Применение:	многолетник для альпинария, обрамление клумб, рабаток, посадка между каменных плит, экстенсивное озеленения, медонос,
Сроки продажи:	с марта по май и с августа по октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с марта по сентябрь
Проращивание	18-20 °C в течение 10-14 дней
Условия проращивания:	подсвечивать, семена только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. Далее после появления проростков медленно понижают температуру до 16-18 °C и культивируют в менее влажной среде.
Температура:	12-15 °C или выращивание в открытом грунте. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C, так же возможна зимовка в открытом грунте. Период вернализации 8-10 недель. Выгонка производится в холоде (с 51 календарной недели) за 8-10 недель при 10-15 °C или в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

A 4340 «Золотая Гора» (Berggold) (Benary) (в кг)
30, лучистые золотисто-желтые, ароматные грозди цветков, вечнозелёное растение, IV-V, D

Alyssum saxatile (Aurinia saxatilis) Алиссум скальный ♃

Применение:	многолетник для альпинария, обрамление клумб, короткий период цветения
Сроки продажи:	с марта по май и с августа по октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с марта по август
Проращивание	при 18-20 °C в течение 10-14 дней
Условия проращивания:	посевы не присыпают, а слегка покрывают вермикулитом и содержат в равномерной влажности. После появления проростков постепенно понижают температуру до 16-18 °C и культивируют в менее влажной среде.
Температура:	12-15 °C или выращивание в открытом грунте. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без заморозков при 3-5 °C. Период вернализации 8-10 недель. Выгонка производится в холоде (с 51 календарной недели) за 8-10 недель при 10-15 °C или в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

A 4390 «Компактум» (Compactum) (в кг)
30, золотисто-желтый, вечнозелёный IV-V, D

Amaranthus caudatus Амарант хвостатый ☉ ⚔

Применение:	привлекательное растение-солитер и в сочетании с другими растениями, используется на срезку и как сухоцвет
Сроки продажи:	с мая по июнь, срезка: май-ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	начало января – апрель для получения срезки при выращивании в теплице; в феврале - марте для получения срезки при выращивании в открытом грунте для цветения начиная с мая Проращивание 21-24 °C в течение 6-10 дней
Температура:	15-22 °C. Температура вентиляции: 24 °C. Амарант переносит температуры до 4 °C, заморозков не выносит.

A 4550 «Зелёный хвост» (Gruenschwanz)
90 см, длинные свисающие кисти цветков. Идеально на срезку и получения сухоцветов для флористики. VI-IX, ⚔ ☉

Ammi majus Амми большая ⊙ ⚔

Применение:	пряное, лекарственное растение, используется на срезку и как сухоцвет
Сроки продажи:	срезка (теплица): январь - декабрь; срезка (открытый грунт): с конца июня по октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
	Срок посева с конца января по апрель для получения срезки при выращивании в теплице; в апреле-мае на срезку в открытом грунте
Проращивание	при 15-18 °C в течении 10-12 дней
Условия проращивания:	проращивание в темноте. Посевы покрывают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 12-15 °C. Посевы в открытом грунте укрывают нетканым полотном или фольгой, чтобы избежать высыхания посевного материала.
Температура	12-18 °C, температура вентиляции: 20 °C

A 4710 Ammi majus (в килограммах)
80, белые зонтики цветов, растение покрыто изящными листьями, идеально на срезку и получения сухоцветов ⚔

Ammobium alatum Аммобиум крылатый ⊙

Применение:	для посадки группы, на рабатках, в горшках, для получения срезки и как сухоцвет
Сроки продажи:	С апреля по июнь, срезка: круглогодично
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с января по июнь
Проращивание	при 15-20 °C в течение 4-7 дней
Условия проращивания:	посев лишь слегка присыпают и поддерживают постоянную влажность. После появления проростков понижают температуру до 10-15 °C.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 16 °C. A. alatum не переносит отрицательных температур.

A 4790 «Бикини» ® (Bikini) (Benary) (в граммах)
(Benary), 30-40 см., цветок размером 2 см с желтой сердцевиной, растение компактное, все растения практически единой высоты, прочные стебли, для выращивания в теплицах и открытом грунте, также для оформления клумб. Часто одновременно цветет все растение, которое обладает сильной ветвистостью, что хорошо на срезку.




Ammobium ‘Бикини’®


Anacyclus ‘Садовый малыш’

Anacyclus depressus (Anacyclus pyrethrum var. depressus) Анациклус прижатый ♃

Применение:	вечнозелёный многолетник для рабаток, альпинариев и бордюров, озеленения балконов, посадки в контейнеры и горшки
Сроки продажи:	с марта по май и с августа по октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	не цветущий материал: апрель-июнь, цветущий: июнь-август
Проращивание	18-21 °C в течение 5-10 дней
Условия проращивания:	подсвечивание, посевы слегка прижимают к земле и содержат в равномерной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и температуру до 18 °C. Посевы не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света.
Температура:	14-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 6-8 недель при 15-18 °C или в холоде при 7-12 °C.

A 4810 «Садовый малыш» ® (Gartenzwerg) (Benary) (в граммах)
15 см., плотные серебряные коврики листвы, усеянные белыми цветами типа маргариток с красной нижней стороной лепестков, вечнозелёное почвопокровное растение VI-VIII, △ ⧙△ ⧙


Ammi majus


Anemone 'Аннабелла насыщенно-розовый'


Anemone 'Аннабелла белый'


Anemone sylvestris

Anemone 'Аннабелла насыщенно-розовый'



Anemone multifida (Anemone globosa, Anemone magellanica) Анемона многораздельная ♃

Применение:	посадка на клумбах, как растение для альпинариев, горшков и для создания «ковров»
Сроки продажи:	не цветущие растения: сентябрь-октябрь; цветущие: апрель-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-апрель
Проращивание:	12-18 дней при 20 °C дневной и 5 °C ночной температуры
Условия проращивания:	подсвечивать, субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. Семена не ставят под прямые солнечные лучи. После появления первых листьев снижают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате. Температурные перепады способствуют проращиванию.
Температура:	12-15 °C или установка в открытом грунте. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном. Выгонка: за 7-8 недель в тепле при 12-18 °C или в прохладе при естественных условиях (очень медленно, в зависимости от наружной температуры) для цветения в мае.

'Аннабелла' (Annabella)–серия (штучно)

Высотой 25 см, грациозная летняя анемона (многолетник для горшка), с мая по июнь дает множество побегов с простыми цветками величиной 3 см, превосходный продукт для посадки по 3 растения в горшок 13 см. нуждается в вернализации.

A 6031	'Аннабелла насыщенно-розовый' Прорастает приблизительно на 14 дней позже, чем 'Аннабелла белый'
A 6051	'Аннабелла белый' Цветение на 3-7 дней раньше, чем у 'Аннабелла насыщенно-розовый'

Anemone pulsatilla смотри Pulsatilla vulgaris

Anemone sylvestris Анемона лесная ♃

Применение:	многолетник для альпинариев и кромок лесных посадок
Сроки продажи:	не цветущий товар: сентябрь-октябрь; цветущий: апрель-июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-апрель
Проращивание:	12-18 дней при 15-18 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. Высеянные семена не подвергают воздействию прямых солнечных лучей. После появления первых листьев сокращают влажность в с убстрате и снижают температуру до 15 °C.
Температура:	12-15 °C или установка в открытом грунте. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном. Выгонка: в начале февраля при 6-10 °C для цветения в начале мая.

A 6270	Anemone sylvestris (в гр) 40 см, белая, крупная лесная анемона, V–VI, D

Anethum graveolens смотри Benary - Пряные травы

Anethum graveolens Укроп ⊙

Применение:	пряное, лечебное растение, для получения срезки и засушивания
Сроки продажи:	горшечная культура: круглый год; срезка (теплица): январь-декабрь; срезка (открытый грунт): июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	круглый год для получения пряной продукции; в начале января – апреле культура на срезку в теплице; в апреле-июне культура на срезку в открытом грунте
Проращивание:	5-12 дней при 15-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать, посевы только слегка присыпают вермикулитом, прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 12-15 °C. Клумба должна быть присыпана сверху тонким слоем мульчи.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C

Z 7950 ‘Фиерлинг’ (Vierling) (в кг)
80 см, желтые зонтики цветов и сине-зеленый лиственный покров, для получения срезки и как сухоцвет, ⚔


Anethum ‘Фиерлинг’

Antirrhinum majus Львиный зев ⊙ ⚔

Применение:	в зависимости от сорта: на срезку в открытом грунте (июнь-сентябрь), срезки при выращивании под стеклом (апрель-май или сентябрь-ноябрь), для горшечной культуры (апрель-август), как клумбовое растение (май-июнь).
Сроки продажи:	в зависимости от применения с апреля по ноябрь; срезка: март-декабрь
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена в оболочке(‘Анимация’)
Срок посева:	Для всех сортов открытого грунта: с конца января; для всех клумбовых и горшечных сортов: с начала февраля; для выгонки (срезка): с середины ноября Проращивание*: стадия I: 6-10 дней при 18-24 °C Стадия II: 18-21 день при 18-21 °C Стадия III+IV: 15-17 °C
Условия проращивания:	подсвечивать, посевы не присыпают, только прижимают. На стадии I держат по возможности при 100% относительной влажности воздуха, позже медленно снижают относительную влажность воздуха и влажность субстрата, культивируют более сухо. При посевах до конца февраля, необходимо дополнительное освещение. Antirrhinum очень восприимчив к солям на стадиях проращивания. Осторожно подкармливают раствором комплексного сбалансированного удобрения с содержанием азота 50-75 мг на литр воды.
Температура:	15 °C. После укоренения температуру можно опустить до 8-10 °C. Температура вентиляции: 20-25 °C. Температура должна соответствовать освещению. Чем больше света, тем выше температуры. Летом культивируют как можно прохладнее. Более высокие температуры приводят к излишне рыхлым соцветиям.

* Описание стадий смотреть во введении каталога


‘Анимация красный’


‘Бархатный красный’


‘Кармазин’


‘Тёмно-розовый’


‘Розовый’


‘Светло-розовый’ (улучшенный)


‘Насыщенно-оранжевый’


‘Оранжевый’


‘Желтый’ (улучшенный)


‘Белый’

‘Анимация ® смесь’ (улучшенный)



Antirrhinum ‘Анимация’ (Animation) Benary-F_1-гибриды для выгонки ⚔ (штучно)

100 см, длинные, сильные стебли, слабое образование боковых побегов. Раннее, равномерное цветение. Для зимнего и весеннего цветения. Унифицированная зрелость срезки в пределах серии, для выращивания в закрытом грунте. Посевной материал в оболочке (желтый окрас покрытия) для лучшего контроля за качеством сева.

A 6920C ‘Анимация тёмно-розовый’
A 6960C ‘Анимация желтый’ (улучшенный)
A 6990C ‘Анимация светло-розовый’ (улучшенный)
A 7030C ‘Анимация кармазин’
A 7060C ‘Анимация оранжевый’
A 7080C ‘Анимация розовый’
A 7090C ‘Анимация красный’
A 7110C ‘Анимация бархатный красный’
A 7100C ‘Анимация насыщенно-оранжевый’
A 7120C ‘Анимация белый’
A 7160C ‘Анимация ® смесь’ (улучшенная)

www.Benary.de




Antirrhinum 'Великаны предвестники смесь'



'Великаны предвестники розовый'



'Великаны предвестники белый'



'Великаны предвестники желтый'



Antirrhinum 'Цветочные ливни смесь'

Antirrhinum 'Великаны предвестники' (Riesen Vorbote) Benary-F_1-гибриды (в гр)

100 см, высококачественные цветы на срезку в схожем качестве как при выращивании в теплице, так и под открытым небом. Предназначено для выращивания одного или нескольких стеблей (в зависимости от технологии). VI-X

A 7510	'Великаны предвестники желтый'
A 7550	'Великаны предвестники бархатный пурпурный'
A 7590	'Великаны предвестники розовый', средне-розовый
A 7660	'Великаны предвестники алый'
A 7620	'Великаны предвестники белый'
A 7650	'Великаны предвестники смесь', из этих отдельных окрасок

Antirrhinum среднерослые сорта (в гр)

A 9780 'Высокая песня великолепная смесь' (Hohes Lied Prachtmischung)
50 см, огромные цветки для клумб и срезки, широкие соцветия, прорастает слабее, чем другие сорта

Antirrhinum карликовая смесь (в гр)

B 0320 'Цветочный ковер смесь' (Floral Carpet Mix) F_1-гибриды
20 см, быстро растущие, высотой только 20 см, при этом шириной 40 см, очень равномерные кустики. Очень богатое цветение, идеально для групповых посадок, △

B 0370 'Цветочные ливни смесь' (Floral Showers Mix) F_1-гибриды
15 см, широкие плоские «ковры», сверхраннее цветение для продажи товара с конца апреля

Antirrhinum азалиецветные сорта (в гр)

B 0700 'Мадам Баттерфляй' (Madame Butterfly) F_1-гибриды
75 см, большие, махровые азалиевидные цветки в длинных метелках, богатая игра окрасок, ⚔



'Великаны предвестники алый'

Aquilegia alpina Водосбор, Аквилегия альпийская ♃

Применение: многолетник для альпинариев, любительское растение, для создания «ковров»; цветение через 9-10 месяцев, нуждается в вернализации
Сроки продажи: не цветущий товар: сентябрь-октябрь; цветущий: апрель-июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: для не цветущего товара: январь-март; для цветущего: в мае- конце июля для цветения в следующем году
Проращивание: 20-35 дней при 22-25 °C
Условия проращивания: в темноте. Семена присыпают вермикулитом, песком или субстратом. По возможности обеспечивают 100% относительную влажность воздуха на стадии I. Далее поддерживают постоянную влажность, но избегают переувлажнения. Всходы не должны пересыхать.
Температура: Первоначально 14-16 °C, после укоренения температура может опускаться до 8-10 °C. Температурные колебания повышают качество. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Более низкие температуры продлевают срок выращивания.

B 2560 Aquilegia alpina (в гр)
60 см, темно-синий, с коротким шпорцем, V-VI



Aquilegia alpina

Aquilegia caerulea Водосбор, Аквилегия ♃

Применение: для обрамления клумб, альпинария, как горшечное растение, для создания «ковров» и обильно цветущих вазонов
Сроки продажи: середина февраля - конец апреля, основная продажа партий к Пасхе
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: середина мая - конец июня для выгонки горшечной культуры и цветения с февраля следующего года; с марта по апрель при зимовке в открытом грунте для цветения с апреля-мая следующего года
Проращивание*: стадия I: 21-30 дней при 20-24 °C.
Стадия II: 18-20 °C
Стадия III: 16-18 °C
Стадия IV: 14-16 °C
Условия проращивания: в темноте, Семена присыпают вермикулитом, песком или субстратом. По возможности обеспечивают 100% относительную влажность воздуха на стадии I. Далее поддерживают постоянную влажность, но избегают переувлажнения. Более низкие температуры в стадии I (15-20 °C) продлевают срок выращивания.
Температура: Первоначально 14-16 °C, после укоренения температура может опускаться до 8-10 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Более низкие температуры продлевают срок выращивания. Очень высокие температуры в сочетании со слабой освещенностью при выгонке приводят к низкому качеству растений. A. flabellata нуждается минимум в одной 4-недельной прохладной фазе (открытый грунт или не отапливаемая теплица) при 0-5 °C для индукции цветения. Чем больший лиственный покров образует растение перед прохладной фазой и чем эта фаза дольше, тем раньше, равномернее и качественнее по размеру получаются цветки растения при выгонке.



Aquilegia 'Специальный вид Benary'

* Описание стадий смотреть во введении каталога

B 3000 'Небесно-голубой' (Himmelblau) (в гр)
60 см, с белой короной, длинные шпорцы, VI-VII
B 3150 'Специальный вид Benary' (Benarys Spezialrasse) (в гр)
75 см, особенно благородные, большие, с длинными шпорцами образцовые цветки прекрасных, насыщенных окрасок



Aquilegia alpina



Aquilegia F_1 'Музыка® желтый'



Aquilegia 'Маленькая звездочка'®



'Камео сине-белый'



'Камео светло-красно-белый'



'Камео розово-белый'

Aquilegia
'Камео смесь'



'Камео нежно-розовый'



'Камео белый'



'Музыка'® (Musik®) Benary-F_1-гибриды (штучно)

50 см, ясные светящиеся окраски цветков с длинными шпорцами, плотный экран цветков, очень унифицированная высота роста и устойчивое, хорошо разветвленное строение растения.

B 3330	'Музыка® сине-белый'
B 3350	'Музыка® желтый', примерно на 15 см выше чем другие окраски
B 3370	'Музыка® розово-белый'
B 3390	'Музыка® красно-желтый'
B 3440	'Музыка® красно-белый'
B 3450	'Музыка® белый'
B 3460	'Музыка® смесь', смесь серии (кроме 'Музыка® желтый')

Aquilegia flabellata Водосбор, Аквилегия ♃

Применение:	для обрамления клумб, альпинария, как горшечное растение и создание «ковров», для обильно цветущих вазонов
Сроки продажи:	середина февраля - конец апреля, основная продажа партий к Пасхе
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	середина мая - конец июня для выгонки горшечной культуры и цветения с февраля следующего года; с марта по апрель при зимовке в открытом грунте для цветения с апреля-мая следующего года
Проращивание*:	стадия I: 21-30 дней при 20-24 °C. Стадия II: 18-20 °C Стадия III: 16-18 °C Стадия IV: 14-16 °C
Условия проращивания:	в темноте, семена присыпают вермикулитом, песком или субстратом. По возможности обеспечивают 100% относительную влажность воздуха на стадии I. Далее поддерживают постоянную влажность, но избегают переувлажнения. Более низкие температуры в стадии I (15-20 °C) продлевают срок возделывания.
Температура:	Первоначально 14-16 °C, после укоренения температура может опускаться до 8-10 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Более низкие температуры продлевают срок возделывания. Очень высокие температуры в сочетании со слабой освещенностью при выгонке приводят к низкому качеству растений. A. flabellata нуждается минимум в одной 4-недельной прохладной фазе (открытый грунт или не отапливаемая теплица) при 0-5 °C для индукции цветения. Чем больший лиственный покров образует растение перед прохладной фазой и чем эта фаза дольше, тем раньше, равномернее и качественнее по размеру получаются цветки растения при выгонке.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

B 2780	'Маленькая звездочка'® (Mini-Star®) в гр) 15 см, светящийся синий с белой коронкой, зимостойкий сорт, идеально для альпинария и как горшечная культура

'Камео' (Cameo)-серия (штучно)

15 см, равномерный компактный рост, изящные цветки величиной от 3 см, серебристо-зеленая листва. Зимостойкий многолетник и горшечное растение с цветением с февраля (при выгонке), V

B 2580	'Камео сине-белый'
B 2690	'Камео светло-красно-белый'
B 2600	'Камео розово-белый'
B 2710	'Камео белый'
B 2740	'Камео нежно-розовый'
B 2770	'Камео смесь'

Aquilegia hybrida Водосбор, Аквилегия гибридная ♃

Применение:	для обрамления клумб, альпинария, как горшечное растение, для создания ковров и обильно цветущих вазонов.
Сроки продажи:	середина февраля - конец апреля, основная продажа партий к Пасхе
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	середина мая - конец июня для выгонки горшечной культуры и цветения с февраля следующего года; с марта по апрель при зимовке в открытом грунте для цветения с апреля-мая следующего года
Проращивание*:	стадия I: 21-30 дней при 20-24 °C. Стадия II: 18-20 °C Стадия III: 16-18 °C Стадия IV: 14-16 °C
Условия проращивания:	в темноте, семена присыпают вермикулитом, песком или субстратом. По возможности обеспечивают 100% относительную влажность воздуха на стадии I. Далее поддерживают постоянную влажность, но избегают переувлажнения. Более низкие температуры в стадии I (15-20 °C) продлевают срок возделывания.
Температура:	Первоначально 14-16 °C, после укоренения температура может опускаться до 8-10 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Более низкие температуры продлевают срок возделывания. Очень высокие температуры в сочетании со слабой освещенностью при выгонке приводят к низкому качеству растений. A. flabellata нуждается минимум в одной 4-недельной прохладной фазе (открытый грунт или не отапливаемая теплица) при 0-5 °C для индукции цветения. Чем больший лиственный покров образует растение перед прохладной фазой и чем эта фаза дольше, тем раньше, равномернее и качественнее по размеру получаются цветки растения при выгонке.



Aquilegia F_1 'Весеннее волшебство ® сине-белый'



'Светло-красно-желтый'



'цвета морской волны -белый'



'Светло-красно-белый'



'Розово-белый'



'Белый'

'Весеннее волшебство'® (Spring Magic®) (штучно) Benary-F_1-гибриды

35 см, очень унифицированные и хорошо разветвленные растения с прекрасной, округлой структурой. 'Весеннее волшебство' ® обильно осыпано очень ранними цветками величиной 5-6 см, лиственный покров изящный, серебристо-зеленый. Цветение на 2-3 недели раньше чем 'Музыка' ®.

B 3740	'Весеннее волшебство ® сине-белый'
B 3790	'Весеннее волшебство ® светло-красно-желтый'
B 3780	'Весеннее волшебство ® светло-красно-белый'
B 3741	'Весеннее волшебство ® цвета морской волны-белый'
B 3770	'Весеннее волшебство ® розово-белый'
B 3800	'Весеннее волшебство ® белый'
B 3820	'Весеннее волшебство ® смесь'



Aquilegia F_1 'Весеннее волшебство ® смесь'



Arabis 'Снежная шапка'®



Arenaria montana

Arabis 'Компинки'®



Arabis caucasica (Arabis albida, Arabis alpina ssp. caucasica) Резуха, арабис кавказский ♃

Применение: стелющийся многолетник для альпинариев и рабаток, как культура для горшка и вазонов, медонос
Сроки продажи: не цветущий товар: апрель-октябрь, цветущий: февраль-май
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-июнь для не цветущего товара, начало августа - середина сентября для очень раннего цветения с 8 недели
Проращивание: 10-14 дней при 18-22 °C.
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы присыпают только очень тонким слоем вермикулита. Поддерживают постоянную влажность, но не в сырости. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 15-18 °C. Растения после пересадки в горшки выставляют в открытый грунт в полутень. Зимовка в теплице/пленочном парнике при 1-3 °C или возможно в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка в прохладе с 51 календарной недели за 9-11 недель при 8-10 °C или в тепле за 3-4 недели при 15-18 °C.

B 4031 'Компинки'® (Compinkie'®) (Benary) (штучно)
15 cm, раскидистый стелящийся рост, розовые подушки, компактное вечнозелёное растение
B 4110 'Снежная шапка'® (Schneehaube®) (Benary) (в гр)
15 cm, раскидистый стелящийся рост, белые подушки, компактное вечнозелёное растение △

Arenaria montana Песчанка горная ♃

Применение: многолетник для альпинария, экстенсивного озеленения
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для продажи в марте-июле без цветения; июнь-август для продажи в феврале-мае цветущих растений
Проращивание: 9-14 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 10-11 недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

B 4500 Arenaria montana (в гр)
15 см, белые эффектные ковры цветов, вечнозелёное растение V-VI, ⁞

Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum frutescens) Хризантема кустарниковая ⊙

Применение: растение для клумб, горшков, вазонов, балконных ящиков
Сроки продажи: апрель-июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-апрель
Проращивание: 10-14 дней при 18-20 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 16-18 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Для индукции цветения температуру понижают до 14-16°C.
Чем прохладнее температуры, тем компактнее будет строение растения. A. frutescens очень хорошо реагирует на температурные изменения и утреннюю прохладу. Растения защищают нетканым полотном от поздних ночных заморозков.

J 1020 'Беленькая' (Whity)
50 см, привлекательное длительное белое цветение, идеально как растение для клумб и вазонов, VI–X


Armeria Армерия ♃

Применение: вечнозеленый, образующий плотный покров многолетник, как горшечное растение, для альпинария, срезка
Сроки продажи: март-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: для не цветущего товара: январь-июнь; для цветущего: июнь-август для цветения с марта
Проращивание: 4-10 дней при 20-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 17-20 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 13-17 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 10-11 недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C. Рост приостанавливается при температуре ниже + 7 °C.

B 4670 Armeria hybrida 'Орнамент'® (Ornament®) (Benary) (в гр) 30 см, смесь из ярких окрасок, вечнозеленый лиственный покров как газон, V–VII, △ ⫶ ⚔

B 4700 Armeria maritima 'Лаучеана(Шплленденс)' (Laucheana (Splendens)' (в гр) 20 см, светящийся розовый, обширные прочные лиственные покровы-газоны, V–VII, △ ⫶

B 4640 Armeria pseudoarmeria (в гр) (A. latifolia) 'Крупноцветковая отборная' (Grossblumige Spielarten) (Benary) 60 см, в оживленных красках, вечнозеленый лиственный покров как газон, V–VII, △ ⚔



Armeria 'Орнамент'®



Asclepias tuberosa

Artemisia dranunculus смотри Benary · Пряные травы

Artemisia vulgaris смотри Benary · Пряные травы

Asclepias tuberosa Ваточник клубненосный, Плевральный корень, Ластовень ♃

Применение: образующий кустарник многолетник, солитер, как горшечное растение, на срезку, лечебное
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-февраль для цветения в июне-августе (тепличная культура); январь-февраль для цветения с июля в открытом грунте; июнь-июль для цветения в феврале-мае (тепличная культура)
Проращивание: 14-20 дней при 21-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевной материал слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 18-20 °C.
Температура: 15-18 °C, Зимовка при 3-5 °C. Зимовка в открытом грунте возможна только с достаточной зимней защитой. A. tuberosa не переносит сильные заморозки. Выгонка с февраля за 8-10 недель при 15-18 °C. При температуре ниже 10 °C рост приостанавливается.

B 5120 Asclepias tuberosa (в кг) FastraX
60 см, оранжевые соцветия зонтики, IV-IX, ⚔ ♧ ◠ ○

Armeria 'Лаучеана'





Asparagus ‘Мейери’



Asparagus ‘Нанус’

Asparagus Аспарагус, Спаржа ♃

Применение:	декоративнолиственное растение, для посадки в кашпо, на срезку зелени, круглый год как горшечное растение
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	октябрь-июнь, возможно круглый год.
Проращивание:	25-30 дней при 22-25 °C
Условия проращивания:	в темноте. Семенам дают разбухнуть в теплой воде перед посадкой. Посевы присыпают вермикулитом, субстратом или песком, держат в темноте и сильной влажности. После появления первых листьев, ставят посевы на свет и снижают температуру до 20-22 °C.
Температура:	20-22 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка без получения срезки при 10-15 °C.

B 5510	Asparagus densiflorus ‘Мейери’ (Meyeri) Медленно растущее горшечное растение с плотным лиственным покровом, длинные, цилиндрические побеги ("кошачьи хвосты"), Ⓦ
B 5550	Asparagus densiflorus ‘Шпренгери’ (Sprengeri), для кашпо и зеленых декораций, свисающее растение, ⚷ ⚔ ⍑ Ⓦ
B 5540	Asparagus myriocladus сильные, плотно собранные побеги, для зеленой срезки или как маленькое растение для горшков и вазонов, Ⓦ
B 5610	Asparagus officinalis pseudoscaber ‘Кружевное покрывало’ (Spitzenschleier) 100 см, как культура открытого грунта и для весенней срезки из теплицы, ♃
B 5520	Asparagus setaceus (A. plumosus) ‘Нанус’ (Nanus) для изысканных букетов и цветочных композиций, ⍑ ⚔ Ⓦ

Aster alpinus Астра альпийская ♃

Применение:	для рабаток, альпинария, как горшечное растение, медонос
Сроки продажи:	май-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-март для цветения с июня; март-июнь для цветения в следующем году, для обильного цветения рекомендуется вернализация
Проращивание:	14-20 дней при 18-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов температуру снижают до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка возможна в открытом грунте или без заморозков при 3-5 °C. Выгонка возможна начиная с середины декабря за 5-7 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 12-15 °C.



‘Тёмная краса’



‘Белая краса’



‘Хеппи Энд’

Aster alpinus (в гр)

30 см, маргаритковидные соцветия величиной 5-6 см с желтой сердцевинкой. V-VI

B 6110	‘Светло-синий’
B 6170	‘Тёмная краса’ (Dunkle Schoene), тёмно-фиолетовый
B 6160	‘Белая краса’ (Weisse Schoene), крупноцветковый
B 6220	‘Хеппи Энд’ (Happy End), (Benary), чистый, розовый
B 6230	‘Тримикс’ (Trimix) (Benary), смесь серии из белого, розового и синего окрасов



Aster alpinus ‘Светло-синий’

Aster amellus
Астра итальянская или горная ♃ ⚔

Применение: для рабаток, срезки, медонос
Сроки продажи: апрель-октябрь; срезка: август-ноябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: март-май для не цветущего товара; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание: 14-20 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов температуру снижают до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Посев не ставят под прямой солнечный свет. Возможно неравномерное прорастание.

B 6410 'Гибридус' (Hybridus) (в гр)
60 см, синего, лавандового и розового оттенков окраски, VIII-IX, ⚔

Aster chinensis смотри Callistephus chinensis

Aster novae-angliae и novi-belgii Астра новоанглийская и новобельгийская (шероховатая и гладколистная) ♃ ⚔

Применение: для рабаток, многолетник-солитер, на срезку, медонос
Сроки продажи: апрель-октябрь; срезка: июнь-ноябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-июнь; декабрь-март для цветения с сентября
Проращивание: 14-20 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов температуру снижают до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Для вегетативного роста необходим длинный световой день (14-16 ч).
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в открытом грунте или без заморозков при 3-5 °C. Выгонка возможна начиная с середины декабря за 7-10 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 12-15 °C. При температурах выше 25 °C происходит преждевременная индукция цветения.

B 6660 novae-angliae 'Сентябрьский рубин' FastraX (Septemberrubin) (Benary) (в гр), 120 см, пурпурно-красная астра с шероховатыми листьями, богатое цветение, культивируется как однолетник, IX–X, ⚔

B 6690 novi-belgii (в гр) FastraX
120 см, отборные сорта, идеально для групповых посадок, IX-X, ⚔

B 6880 novi-belgii + novae-angliae (Benary) (в гр) FastraX
'Композиция Benary®' (Benarys Composition®)
140 см, смесь отдельных окрасок обоих видов, культивируется как однолетник, IX–X, ⚔


Композиция программы FastraX


'Сентябрьский рубин'


'Композиция Benary®'



Aster novi-belgii



Astilbe ‘Гранде’



‘Белла’



‘Звезда шоу’®



Astrantia ‘Примадонна’®

Astilbe arendsii Астильба Алдерса ♀ ⚔

Применение:	горшечное растение, для рабаток, срезка
Сроки продажи:	май-октябрь, срезка: апрель-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-март для не цветущего товара; июнь-июль для цветущего товара в следующем году
Проращивание:	14-21 день при 22-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать, субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. Посеянные семена не подвергают воздействию прямого солнечного света. Во время проращивания требуется 100% влажность субстрата. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 18 °C. Далее культивируют в равномерной постоянной влажности. Используют только свежие семена. Если посевы, тем не менее, не прорастают, снижают температуру на 3-4 недели до 5 °C, чтобы нарушить спокойствие зародыша. Затем снова повышают температуру до 22-25 °C.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После укоренения снижают температуру до 12-15 °C или устанавливают растения в открытом грунте. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Растения в открытом грунте защищают нетканым полотном от прямого солнечного света. Астильба нуждаются в прохладной фазе минимум от 12 недель при 5 °C для индукции цветения. Выгонка возможна с середины декабря за 8-10 недель при 15-18 °C.

B 7190	‘Белла’ (Bella) (Benary) (в гр) 50 см, смесь, интенсивная игра окрасок, компактные, плотные соцветия метелки. Предназначено для открытого грунта и горшка
B 7230	‘Гранде’ (Grande) (Benary) (в гр) 80 см, удивительно красивая смесь от красного до кремового, стройные прямые метелки цветков для получения срезки, ⚔
B 7260	‘Звезда шоу’® (Showstar®) (Benary) (в гр) 30-40 см, плотные, прямые метелки цветков, оригинальная игра окрасок из белых, кремовых, розовых и красных оттенков цвета, декоративная резная листва, для открытого грунта и горшка. VI–VIII, ◐ ○

Astrantia major Астранция крупная, Звездовка ♀

Применение:	образующий кустарник многолетник, как цветущее горшечное растение, на срезку, медонос
Сроки продажи:	март-октябрь, срезка: май-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для продажи не цветущих растений в сентябре-октябре, апрель-июль для продажи цветущего товара с мая следующего года
Проращивание:	7-14 дней при 15-18 °C, 14-24 дня при 0-4 °C; 7 дней при 10 °C, далее при 12-15 °C
Условия проращивания:	в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом, песком, субстратом, поддерживают постоянную влажность и культивируют согласно температурной схеме. Температурные перепады способствуют проращиванию. Всходы появляются неравномерно.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за 10-12 недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

B 7510	‘Примадонна’® (Primadonna®) (в гр) 75 см, цветки от светло- до глубоко-пурпурных, собраны в зонтики величиной 4 см на длинных, раскидистых, разветвленных стеблях, широкий, кустистый рост, идеально для рабаток или как особенный ценный цветок на срезку, V–VIII, ⚔

Atriplex hortensis Лебеда садовая ⊙ ⚔

Применение: овощ, лечебное растение, получение срезки и засушивание
Сроки продажи: как овощ: май-октябрь; срезка (открытый грунт): июнь-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: как овощ: март-сентябрь, отдельными партиями; срезка: конец марта - июль
Проращивание: 7-14 дней при 20-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C. Посевы в открытом грунте укрывают нетканым полотном или фольгой, чтобы избежать высыхания.
Температура: 12-18 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 20 °C. Atriplex переносит температуры до 6 °C.

'Шпиль' (Spire)-серия (штучно)

150 см, прямые, разветвленные кисти семян, идеально на срезку и засушивания, можно использовать как овощ, ⚔

B 7670 'Зеленый шпиль' (Green Spire), зелёный
B 7690 'Красный шпиль' (Red Spire), красный

Aubrieta cultorum (Aubretia-Hybriden) Обриета культурная ♃

Применение: стелющийся многолетник для альпинариев, стыков камней, рабаток, медонос
Сроки продажи: февраль-май для цветущего товара; март-октябрь для не цветущего
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для продажи не цветущих растений в июне-сентябре; июль-сентябрь для цветущих с февраля следующего года растений
Проращивание: 14-20 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать, посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают температуру до 15-18 °C. Температуры выше 24 °C тормозят проращивание.
Температура: 10-15 °C. Зимовка при 3-7 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Для вернализации требуется прохладная фаза минимум от 8-12 недель. Выгонка за 9-12 недель при 10-18 °C, чем теплее условия, тем короче срок культивирования. При теплой и очень ранней выгонке (с 51 календарной недели) необходим дополнительный ассимиляционный свет. Выгонка в прохладе возмо жна в пленочном парнике при температурах 7-10 °C для цветения в апреле-мае.

B 8580 'Хендерсона' (Hendersonii) (в гр)
15 см, фиолетовый, крупные цветки, вечнозелёное растение IV-V
B 8620 'Королевский красный' (Royal Red) (в гр)
15 см, ярко-красные, крупные цветки, вечнозелёное растение IV-V
B 8640 'Королевский фиолетовый' (Royal Violet) (в гр)
15 см, темно-фиолетовые, интенсивно окрашенные крупные цветки, вечнозелёное растение IV-V



Aubrieta 'Хендерсона'



Aubrieta 'Королевский красный'




Aubrieta 'Королевский фиолетовый'



'Обаяние® насыщенно-розовый'



'Обаяние® алый'



'Обаяние® лососево-оранжевый'



'Обаяние® розовый'



'Обаяние® алый'

Begonia cheimantha Бегония зимоцветная, Бегония Лорена Ⓦ (штучно)

Применение:	привлекательное горшечное растение к Рождеству
Сроки продажи:	октябрь-декабрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март; июль-сентябрь для получения маленьких растений
Прорастание:	21-35 дней при 22-24 °C
Условия прорастания:	подсвечивать. Посевы не присыпают и поддерживают постоянную влажность. Длина светового дня должна продляться зимой минимум до 12 часов. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и снижают температуру до 22 °C. Обращают внимание на равномерную влажность субстрата. Молодые зародыши не должны ни в коем случае пересыхать. Бегония Лорена восприимчива к солям на стадии молодых растений.
Температура:	20-22 °C. Температура вентиляции: 23 °C. Реакция на освещенность зависит от температуры. При температурах 20-22 °C 12-15 коротких световых дней достаточно для образования цветов. При температурах ниже 20 °C 5-8 дней при длинном световом дне также способствуют образованию цветов. Поэтому температура в теплице не должна опускаться ниже 20 °C в течение летних месяцев. После появления первых бутонов температуру можно опустить до 16-18 °C для лучшей окраски цветов. Цветущие растения переносят температуры до 12 °C на короткий период.

C 0200 'Люби меня' (Love-Me) Benary F1 гибриды
25 см, компактные, с малым лиственным покровом разветвленные внутри своего строения растения, цветение светло-розовое в предрождественский период очень богатое и продолжительное.

Begonia elatior F_1 гибриды Бегония высокая ⊙

Применение:	растения для клумб и балконов, кашпо, горшков и вазонов
Сроки продажи:	середина апреля - июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена и в гранулах
Срок посева:	21-23 недели до срока продажи для клумбовых растений; ноябрь для горшечных растений цветущих в апреле; с декабря по январь для клумб в мае
Прорастание:	10-14 дней при 23-25 °C
Условия прорастания:	подсвечивать. Посевы не присыпают, на стадии I:> 95% влажности воздуха для равномерного проращивания. Семена в гранулах особенно хорошо смачивают. Стадии II–IV: медленно снижают влажность воздуха и снижают температуру (20-23 °C),подкармливают сбалансированными комп лексными удобрениями с содержанием нитратной формы азота 75-100 мг на литр воды. Воду для полива подогревают (> 18 °C). Она не должна быть слишком холодной. Растениям не позволяют пересыхать.
Температура:	Первоначально 20 °C, позже снижают температуру до 18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. К концу культивирования снижают температуру до 16 °C.для закаливания растений и лучшей окраски цветов

'Обаяние'® (Charisma®)-серия

Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)
25 см. первые полученные в семенах гибриды Begonia Elatior с высококлассной пригодностью для сада

C 0480 'Обаяние® лососево-оранжевый'
C 0570 'Обаяние® розовый',
C 0620 'Обаяние® алый',
C 0610 'Обаяние® насыщенно-розовый',

Begonia semperflorens F_1-гибрид

‘Супер Олимпия®’

Ihr Name ist Programm

- Высокое качество посевного материала, унифицированное развитие молодых растений
- Первоклассная пригодность для сада, невероятная выносливость к любой погоде, к любому местоположению
- Очень крепкая и обильно цветущая бегония
- Широкая цветовая палитра, различные варианты использования




Begonia F_1 'Супер Олимпия® смесь'


'Супер Олимпия® красный'


'Супер Олимпия® коралловый'


'Супер Олимпия® насыщенно-розовый'


'Супер Олимпия® розовый'


'Супер Олимпия® белый'


'Супер Олимпия® светло-розовый'

Begonia semperflorens Бегония вечноцветущая ⊙

Применение:	очень хорошее растение для клумб и групп, балконных ящиков и вазонов
Сроки продажи:	с середины апреля по июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена и в гранулах
Срок посева:	начиная с середины декабря
Проращивание*:	стадия I: 5-10 дней при температуре в среднем 23-26 °C ('Вечеринка': 10-14 дней) и относительной влажности воздуха 95% и выше. Стадия II: 10-14 дней при 20-21 °C Стадия III+IV: 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена или гранулы не присыпают. Длина светового дня должна продляться зимой минимум до 12 часов. При использовании гранул температуры должна быть несколько выше, а относительная влажность воздуха составлять 100% для обеспечения равномерного проращивания. Обращают внимание на равномерную влажность субстрата. Молодые зародыши не должны ни в коем случае пересыхать.
Температура:	17-19 °C, температура вентиляции: 20 °C. Растения перед продажей закаливают при ультрафиолетовом свете и 7-10 °C.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Begonia F_1 'Супер Олимпия®' ('Super Olympia®')-серия Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

20 см, следующее поколение унаследовавшее всё положительные характеристики уважаемой серии 'Олимпия®'. Раннее цветение, равномерный рост, крупные благородной формы цветки. Сбалансированный цветовой спектр больших соцветий из 6 отдельных окрасок обеспечивает разнообразное и длительное цветение клумб, смешанных вазонов и балконных ящиков.

C 2400	'Супер Олимпия® светло-розовый'
C 2370	'Супер Олимпия® коралловый'
C 2410	'Супер Олимпия® розовый'
C 2440	'Супер Олимпия® красный'
C 2460	'Супер Олимпия® насыщенно-розовый'
C 2480	'Супер Олимпия® белый'
C 2500	'Супер Олимпия® смесь'






'Спринт красный'


'Спринт светло-розовый'


'Спринт насыщенно-розовый'


'Спринт смесь'


'Спринт белый'


'Спринт двуцветный'

Begonia F_1 'Спринт' (Sprint)-серия
Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

20 см, цветение примерно на 10 дней раньше чем 'Супер Олимпия®'. Очень хороший внешний вид, а также пригодность для открытого грунта, при возделывании гораздо лучше, чем другие очень ранние сорта.

C 1190	'Спринт двуцветный'
C 1260	'Спринт светло-розовый'
C 1210	'Спринт розовый'
C 1180	'Спринт красный'
C 1160	'Спринт насыщенно-розовый'
C 1230	'Спринт белый'
C 1270	'Спринт смесь'

Begonia F_1 'Лото'® (Lotto®)- серия
Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

25-30 см, компактное, закрытое строение растений, невероятно крупные цветы с захватывающей интенсивностью окраски, богатое постоянное цветение до морозов, хорошая устойчивость к дождям и жаре.

C 1410	'Лото® яблоневый цвет'
C 1460	'Лото® розовый'
C 1520	'Лото® алый'
C 1540	'Лото® белый'
C 1570	'Лото® смесь', кроме 'Яблоневый цвет'


Begonia F_1 'Лото® яблоневый цвет'


'Лото® алый'


'Лото® розовый'


'Лото® белый'


'Лото® смесь'



'Дерби'®



'Олимпия® Звездочка'®



'Органди'®



Benary F_1 'Водка'®



'Бренди'®



'Джин'



'Виски'



'Ром'®

Begonia специальные сорта (штучно и в гранулах)

C 2770 'Дерби'® (Derby®) Benary F1 гибриды
20 см, F1 гибрид с неповторимой кораллово-лососево-розовой окраской цветов с более светлой сердцевиной поверх свежезеленых листьев. Компактный, шарообразный габитус делает сорт привлекательным для контейнеров и балконных ящиков.

C 2750 'Олимпия® Звездочка'® (Olympia® Starlet®) Benary F1 гибриды 20 см, белый с розовой каемкой, компактный рост и богатое цветение, не входит в смесь 'Супер Олимпия® смесь'.

C 3700 'Органди'® (Organdy®) Benary F_1 гибриды
20 см, специальная смесь зеленолистных и бронзоволистных низких сортов серии 'Олимпия'®, отличается высоким совершенством роста. 10 различных окрасок от чисто белого до темного ярко-красного цвета. Привлекает внимание как на больших так и на маленьких клумбах.

Benary F_1 'Коктейль'® (Cocktail®)-серия
Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

15-20 см, круглое, закрытое строение растений, темная красно-коричневая листва, хорошая устойчивость против атмосферных воздействий. Раннее, продолжительное и обильное цветение. Привлекательно в контейнере, отлично для клумбы. Во всем мире является бестселлером среди Begonia semperflorens, с самым тёмным лиственным покровом. Высокое качество посевного материала, унифицированное цветение и хороший внешний вид, а также, в частности, невероятные по размеру цветки и рост в открытом грунте - вот основа этого успеха.

C 2760 'Бренди'® (Brandy®), нежно-розовый
C 2830 'Джин' (Gin), светящийся розовый
C 2920 'Ром'® (Rum®), белый с красной каймой
C 3290 'Виски' (Whisky) белый
C 2330 'Водка'® (Wodka®), насыщенный алый
C 3800 'Коктейль'® (Cocktail®), смесь серии из вышеперечисленных окрасок



Benary F_1 'Коктейль'®

Begonia F_1 'Взгляд'® (Vision®)-серия
Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

20 см, крупные цветки, устойчивая окраска, контрастная с бронзовым лиственным покровом. Цветение такое же пышное и такая же устойчивость как у серии 'Коктейль'®, но структура несколько крупнее. Замечательно для более больших клумбовых посадок или контейнера. Высокая устойчивость к жаре, идеальна для городского озеленения.

C 2940	'Взгляд® лососевый'
C 2960	'Взгляд® розовый'
C 2420	'Взгляд® красный'
C 3030	'Взгляд® насыщенно-розовый'
C 3150	'Взгляд® белый'
C 3400	'Взгляд® смесь' смесь серии



'Взгляд® розовый'



'Взгляд® красный'



'Взгляд® лососевый'



'Взгляд® насыщенно-розовый'

'Взгляд® белый'

'Взгляд® смесь'




'Вечеринка смесь'

Begonia F_1 'Вечеринка' (Party)-серия
Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

30 см, зеленолистная и темнолистная серия 'Вечеринка' покоряет выносливостью цветения.
Яркая окраска, кустистый рост идеальны для обширных посадок (например, для городского озеленения) или как долго цветущее растение для заднего плана рабатки.

Тёмный лиственный покров:
C 0990 'Вечеринка розовый темнолистный'
C 1060 'Вечеринка красный темнолистный'
C 0940 'Вечеринка белый темнолистный'

Зелёный лиственный покров:
C 1170 'Вечеринка карминно-розовый зеленолистный'
C 0930 'Вечеринка алый зеленолистный'
C 1250 'Вечеринка белый зеленолистный'

Зелёный и темный лиственный покров:
C 1360 'Вечеринка смесь'



'Вечеринка красный темнолистный'


'Вечеринка розовый темнолистный'


'Вечеринка белый темнолистный'


'Алый зеленолистный'


'Карминно-розовый зеленолистный'


'Белый зеленолистный'

Комбинация из 'Вечеринка смесь' и Rudbeckia 'Toto® золотистый'

Begonia tuberhybrida F_1-гибрид

NONSTOP®

Working 'Nonstop'® for you!

- Уже 30 лет: клубневая бегония № 1
- Крупные, густомахровые цветки, компактный унифицированный рост

- Бесподобный облик сада
- Идеальный вид для горшка, клумбы и как ампельное растение
- Широкая цветовая палитра, разнообразие возможных комбинаций





Begonia F_1 'Нонстоп ® смесь'



'Нонстоп ® яблоневый цвет'



'Нонстоп ® абрикосовый'



'Нонстоп ® желтый'



'Нонстоп ® золотисто-оранжевый'



'Нонстоп ® светло-розовый'



Begonia tuberhybrida Бегония клубневая ⊙

Применение:	растение для клумб и балкона, кашпо, горшков и вазонов
Сроки продажи:	Как горшечное растение в апреле-июле, как клумбовое в середине апреля - июне
Форма посевного материала:	очищенные семена и в гранулах
Срок посева:	ноябрь для цветущих в апреле горшечных растений; с декабря по январь для клумбовых растений в мае
Проращивание*:	стадия I: 7-14 дней при 23-25 °C и относительная влажность воздуха 95% и выше. Стадия II: 28-42 дня при 20-21 °C Стадия III и IV: 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена или гранулы не присыпают, особенно хорошо смачивают и поддерживают постоянную влажность. Со стадии II обеспечивают длинный световой день (14 ч) и уменьшают влажность в субстрате. Обращают внимание на равномерную влажность субстрата. Молодые зародыши не должны ни в коем случае пересыхать. Вода для полива должна быть минимум 18 °C.
Температура:	16-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. За 10 дней до начала продажи для закаливания опускают температуру до 16 °C. При температуре 14 °C начинается образование клубней.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Begonia F_1 'Нонстоп'® (Nonstop®)
Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

20 см. Уже 30 лет Benary производит клубневую бегонию № 1 с густомахровыми цветками величиной 8-9 см, с очень стойкой до самых морозов окраской. С прочным, разветвленным от корня, компактным и унифицированным ростом. Замечательно подходит для клумб, контейнера или балконных ящиков, для тени, полутени или солнечного положения.

C 7360	'Нонстоп ® яблоневый цвет' белый с розовой обратной стороной лепестков и розовыми бутонами
C 7100	'Нонстоп ® абрикосовый'
C 7170	'Нонстоп ® желтый'
C 7290	'Нонстоп ® золотисто-оранжевый'
C 7340	'Нонстоп ® светло-розовый'
C 7370	'Нонстоп ® лососевый'
C 7390	'Нонстоп ® ярко-красный'
C 7140	'Нонстоп ® оранжевый'
C 7440	'Нонстоп ® розовый'
C 7420	'Нонстоп ® розовая кайма', двуцветный, белый и розовый
C 7460	'Нонстоп ® алый'
C 7350	'Нонстоп ® насыщенно-красный'
C 7450	'Нонстоп ® белый'
C 7480	'Нонстоп ® смесь'



Идеи продаж от Benary

Расположите это долго цветущее растение в сочетании с:
- привлекательным логотипом, для запоминания и повторного узнавания
- привлекательными постерами в торговом помещении (приобретение: etiketten@floramedia.de)
- фирменным адресом домашней страницы www.begonia-nonstop.de

С вопросами обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0


'Нонстоп ® лососевый'


'Нонстоп ® ярко-красный'


'Нонстоп ® оранжевый'


'Нонстоп ® розовый'


'Нонстоп ® розовая кайма'


'Нонстоп ® алый'


'Нонстоп ® насыщенно-красный'


'Нонстоп ® белый'





Композиция из Begonia F_1



Begonia F_1 ‘Орнамент® желтый’



‘Орнамент® светло-розовый’



‘Орнамент® оранжевый’



‘Орнамент® алый’

Begonia F_1 ‘Орнамент’® (Ornament®)-серия Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

18 см. тёмный лиственный покров, партнер серии ‘Нонстоп’® с одинаковым ростом и цветением лидер на рынке. Компактные растения, имеют насыщенную контрастную окраску до морозов, огромное разнообразие и прекрасный внешний вид как вблизи, так и на расстоянии. Очень устойчиво к жаре.

C 7560	‘Орнамент® желтый’
C 7590	‘Орнамент® светло-розовый’
C 7670	‘Орнамент® оранжевый’
C 7690	‘Орнамент® алый’
C 7740	‘Орнамент® смесь’

Begonia F_1 ‘Шутка’® (Pin-Up®) Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

25 см. роскошное обилие огромных простых цветков, неповторимое сочетание окрасок. Как Fleuroselect, так и All America Selections подтверждают высокое качество этой оригинальной, пламенной красоты: привлекательная игра цвета, роскошное цветение, очень хороший рост, высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и выносливость.

C 4230 ‘Шутка ® пламя’ цветки золотистые с насыщенно-оранжевой каймой. Привлекательный контраст с немного темноватым лиственным покровом.

C 4250 ‘Шутка ® розовый’, богатое цветение и хороший рост, белоснежные с насыщенно-розовой каймой цветки



Begonia F_1 ‘Шутка ® розовый’ в композиции



‘Шутка ® пламя’



‘Шутка ® розовый’


Begonia F_1 ‘Панорама® абрикосовый’


‘Панорама® желтый’


‘Панорама® розовый’


‘Панорама® алый’


‘Панорама® белый’


‘Панорама’® и ‘Иллюминация’®

Begonia F_1 ‘Панорама’® (Panorama®)-серия Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)


25 см. Хороший рост, сильное ветвление, маленькая тонкая листва, богатое цветение. Идеально для балконных ящиков, вазонов, кашпо, клумб.

C 8900	‘Панорама® абрикосовый’, изумрудно-зелёная листва
C 8950	‘Панорама® желтый’, зелёная листва
C 8960	‘Панорама® розовый’, зелёная листва
C 8980	‘Панорама® алый’, коричневатая листва
C 8990	‘Панорама® белый’, зелёная листва
C 8900	‘Панорама® смесь’, смесь из вышеперечисленных окрасок

Begonia F_1 ‘Иллюминация’® (Illumination®)- серия Benary F_1 гибриды (штучно и в гранулах)

Цветоносы длиной до 80 см, плотно собранные величиной 6-8 см, махровые цветки. После изначально почти прямого роста на стадии молодых растений, все 5 отдельных окрасок меняют структуру растений, создавая импозантные кашпо или балконные ящики. Кашпо с 3-4 растениями имеют устойчивую, яркую окраску, всегда элегантны и привлекательны.

C 9200	‘Иллюминация® абрикосовый’ оживленная игра цвета абрикосово-желтых кистей с привлекательной красноватой каймой
C 9180	‘Иллюминация® лососево-розовый’
C 9250	‘Иллюминация® оранжевый’
C 9330	‘Иллюминация® розовый’
C 9350	‘Иллюминация® белый’
C 9390	‘Иллюминация® смесь’


‘Иллюминация® абрикосовый’


‘Иллюминация® розовый’


‘Иллюминация® оранжевый’


‘Иллюминация® белый’


‘Иллюминация® лососево-розовый’



Bellis ‘Хабанера ® белый с красными кончиками’



‘Хабанера ® красный’



‘Хабанера ® розовый’



‘Хабанера ® белый’



‘Роггли красный’



‘Роггли розовый’



‘Роггли белый’





Bellis ‘Робелла’

Bellis perennis Маргаритка многолетняя ☉

Применение:	групповое растение для рабаток, украшения могил, создания «ковров», как горшечное растение
Сроки продажи:	с марта по апрель
Форма посевного материала:	очищенные семена и в гранулах (кроме ‘Хабанера’®)
Срок посева:	без заморозков для горшка: конец августа середина сентября; культивирование без отопления: середина-конец августа
Проращивание*:	стадия I+II: 14-21 день при 18 °C Стадия III+IV: 7-14 дней при 15 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. До появления всходов ящики с посевами немного притеняют. Посевы не должны быть загущены (примерно 1 гр./м2). На стадии I требуется 100% влажность воздуха. Со стадии II медленно сокращают влажность воздуха.
Температура:	10-12 °C. При температурах выше 12 °C обильное образование листвы, тонкие стебли цветов и начало индукции цветения. Следует стремиться к зимовке без заморозков при 2-5 °C. Возможна зимовка при отрицательных температурах, но растения нужно защищать нетканым полотном от сквозняка и прямого солнечного света. Выгонка с 50 календарной недели за 5-7 недель при 10-12 °C. Температуры ниже 6 °C тормозят развитие почек. При теплых наружных температурах необходимо своевременное проветривание. Слишком высокие температуры в сочетании с недостатком освещения ведут к преждевременному, неравномерному цветению и образованию простых цветков.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

‘Хабанера’® (Habanera®) -серия (Benary) (штучно)

15 см, густомахровые игольчатые цветы величиной 6 см в небольших аккуратных розетках, самая крупноцветковая маргаритка среди профессиональных сортов. Особенно хорошо подходит для культивирования без заморозков в защищенном грунте. Специальная селекция для подобных условий культивирования и выращивания в открытом грунте.

D 3420	‘Хабанера ® розовый’, нежно-розовый с розовыми кончиками
D 3450	‘Хабанера ® красный’
D 3480	‘Хабанера ® белый’
D 3490	‘Хабанера ® белый с красными кончиками’ неповторимая комбинация окраски
D 3500	‘Хабанера ® смесь’, смесь отдельных окрасок

‘Роггли’(Roggli)-серия (штучно и в гранулах)

12 см, компактные, достаточно пропорциональные растения. Очень раннее цветение, махровые цветки величиной 5 см из трубчатых лепестков, цветки крупнее, чем у ‘Тассо’ ®. Идеально для клумб и как горшечное растение.

D 3270	‘Роггли розовый’
D 3000	‘Роггли красный’
D 3380	‘Роггли белый’

‘Робелла’ (Robella) (штучно и в гранулах)


15 см, неповторимая особая краска в лососево-розовых тонах, густомахровые цветки 5 см в диаметре из трубчатых лепестков, раннее цветение, III-VI

D 3040	‘Робелла’, лососево-розовый

‘Роминетте’ (Rominette)-серия (штучно и в гранулах)

12 см, очень компактные, покрывающие землю растения. Раннее цветение, маленькие помпонные цветки. Богатое цветение густомахровых цветков величиной 2 см на прочных стеблях. Идеально для маленького цветочного вазоны, посадки на клумбе и рабатке, а также для посадки на могилах.

D 2390 ‘Роминетте карминно-розовый’ исключительная окраска цветов
D 2400 ‘Роминетте розовый’
D 2410 ‘Роминетте красный’
D 2440 ‘Роминетте белый’
D 2470 ‘Роминетте смесь’


‘Роминетте смесь’ включая ‘Красный’, ‘Карминно-розовый’, ‘Розовый’ и ‘Белый’

‘Tacco’® (Tasso®)-серия (Benary) (штучно и в гранулах)

12 см, крупные цветки-помпоны величиной 4 см, густомахровые. Очень привлекательно для выращивания в горшках и ячейках, все отдельные окраски очень унифицированы в росте и в цветении.

D 2590 ‘Tacco® тёмно-розовый’ непревзойденная окраска

D 2600 ‘Tacco® клубника со сливками’ (Tasso® Erdbeersahne) неповторимая игра светло-розового, лососевого и розового тонов

D 2630 ‘Tacco® светло-розовый’
D 2640 ‘Tacco® красный’
D 2650 ‘Tacco® белый’
D 2670 ‘Tacco® смесь’, из отдельных окрасок



‘Tacco® клубника со сливками’


‘Tacco® смесь’


‘Tacco® светло-розовый’


‘Tacco® красный’


‘Tacco® белый’


‘Tacco® тёмно-розовый’

Bergenia cordifolia (Megasea cordifolia) Бадан сердцелистный ♃

Применение: зелёный в зимний сезон декоративный лиственный покров, почвопокровный многолетник, медонос, растение для горшка для осенней продажи, срезка
Сроки продажи: март-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-март для не цветущих растений; июнь-июль для цветущих в марте-апреле растений
Проращивание: 10-28 дней при 21-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. Не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев снижают температуру до 15-20 °C. Посевы бадана очень нуждаются в тепле, поэтому высеваются при температуре не менее чем + 21 °C.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Выносят температуры до 28 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка с декабря за 6-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-15 °C. Раннее культивирование возможно в пленочном парнике. Низкие температуры способствуют измене нию окраски листьев на красную.

D 4340 Bergenia cordifolia (в гр)
60 см, розовые, соцветия из цветков-колокольчиков, блестящие овальные вечнозелёные листья, IV–V, △ ⚔


Bergenia cordifolia





Brachycome ‘Браво фиолетовый с черной сердцевиной’



‘Браво тёмно-синий с черной сердцевиной’



Browallia ‘Синие колокольчики Benary’



‘Браво белый с черной сердцевиной’



Brachycome ‘ Браво смесь серии’

Borago officinalis смотри Benary · Пряные травы

Brachycome iberidifolia Брахикома иберисолистная

Применение:	для рабаток, альпинариев, балконных ящиков, кашпо и как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	середина апреля - июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с середины января по май
Проращивание:	10-14 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев ставят на свет и подкармливают раствором сбалансированного комплексного удобрения с содержанием Азота 50 мг на литр воды. В течение первых 4 недель всходы очень восприимчивы к высокой концентрации солей.
Температура:	в период прироста 18 °C, позже 12-16 °C, при высокой интенсивности освещения возможны высокие температуры без снижения качества растений. В течение непродолжительного времени растение переносит температуры ниже 10 C, но это ограничивает рост.

‘Браво’ (Bravo)-серия (в гр)

25 см, привлекательные летние горшечные растения, шарообразный, округлый, компактный рост и в горшке, и в открытом грунте, стойкое, замечательное сияние цвета, обильное цветение.

‘Браво тёмно-синий с черной сердцевиной’

‘Браво фиолетовый с черной сердцевиной’

‘Браво белый с черной сердцевиной’

‘Браво смесь серии’, в целом из 6 красок

Briza maxima смотри Benary · Однолетние декоративные травы

Briza media смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Bromus macrostachys смотри Benary · Однолетние декоративные травы

Browallia speciosa Броваллия красивая Ⓦ

Применение:	горшечное растение
Сроки продажи:	круглый год
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	конец ноября для цветения в 1-2 декаду мая; возможно, круглый год, в большинстве случаев с февраля по май для цветения летом
Проращивание:	10-14 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев ставят под свет и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20-22 °C. Ночная температура на 3-4 °C ниже чем в днем. Температуры выше 24 °C ухудшают образование цветов. Не переносит заморозки.

D 5180 ‘Синие колокольчики Benary’ (Benarys Blaugloeckchen) (Benary) (штучно) 20 см, синие цветки, кустистый, компактный рост

Bupleurum griffithii (Bupleurum rotunddifolium griffithii) Буплерум, Володушка золотистая ⊙

Применение: флористический аксессуар
Сроки продажи: срезка: с января по октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: пленочный парник/теплица: с декабря по октябрь, посев отдельными партиями; открытый грунт: с конца апреля, без заморозков, посев отдельными партиями
Проращивание: 14-21 день при 15-18 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, субстратом или землей и поддерживают равномерную влажность. Заморозки могут повреждать молодые проростки.
Температура: 15-24 °C. Температура вентиляции: 26 °C. Не переносит ночных заморозков. При температурах ниже 8 °C рост приостанавливается.

D 5410 'Декор' (Decor) (в кг)
80 см, желтые соцветия-зонтики величиной 5-6 см. Крепкие стебли, на срезку как флористический аксессуар, VII–IX, ⚔



Bupleurum 'Декор'

Calceolaria herbeohybrida л-Hybride Кальцеолярия гибридная ⊙

Применение: горшечное растение
Сроки продажи: декабрь-май
Форма посевного материала: семена в гранулах
Срок посева: июнь-июль (для крупных садовых выставок); август-сентябрь: основное время посева; до октября для получения растений в середине мая
Проращивание: 14-16 дней при 18-20 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы не присыпают. Гранулы прижимают, хорошо поливают и поддерживают постоянную влажность. Защищают от прямого солнечного света (притеняют). Посевам не позволяют пересыхать. После появления первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 14-18 °C. Температура в течение всего срока выращивания может держаться на данном уровне. 'Золушка' не нуждается в прохладной фазе для образования цветков. Температуры выше 25 °C ведут к увяданию растений.



Calceolaria 'Золушка смесь'



'Золушка оранжевые тона'

'Золушка' (Cinderella)-серия (в гранулах)

Компактное строение растений с ярким, плотным букетом цветов. Раннее унифицированное цветение. Идеально для продажи отдельными партиями. Не нуждается в прохладной фазе для индукции цветения и может культивироваться в теплых и даже прохладных условиях.

D 6030P 'Золушка желтый в точечку'
D 6050P 'Золушка оранжевые тона'
D 6090P 'Золушка красный'
D 6150P 'Золушка смесь'

Calceolaria 'Золушка желтый в точечку' и 'Красный'





Calceolaria ‘Goldari’®

Calceolaria integrifolia (Calceolaria rugosa) Кальцеолярия морщинистая ⊙

Применение:	растения для клумб, балконных ящиков и горшка
Сроки продажи:	с середины апреля по июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена и в гранулах
Срок посева:	конец октября - февраль; в середине декабря для цветения в мае
Проращивание:	14-16 дней при 15 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы не присыпают, гранулы прижимают, хорошо поливают и поддерживают постоянную влажность. Защищают от прямого солнечного света (притеняют). Посевам не позволяют пересыхать. После появления первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C.

D 6750P «Золотистый» (‘Goldari’®) (штучно и в гранулах) Benary F_1 гибриды, 30 см, особенно раннее, богатое и выносливое золотистое цветение. Идеальный сорт для балконных ящиков и рабаток. Поставляется от Benary в упаковке-ампуле, которая сохраняет всхожесть и высокое качество посевного материала.

Calendula officinalis Календула лекарственная ⊙

Применение:	растения для клумб, балкона, горшка и контейнера, медонос, лечебное растение, на срезку
Сроки продажи:	горшечные растения: с апреля по сентябрь; срезка: с января по октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в конце января в феврале для цветения в апреле-мае; в июле-августе для цветения в сентябре-октябре; в октябре-ноябре для цветения в феврале-апреле. Для срезки в защищенном грунте в ноябре-феврале
Проращивание:	5-10 дней при 21 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают равномерное увлажнение. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C и ставят посевы на свет. Избегают переувлажнения почвы.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: с 18 °C. Ночью допускаются температуры около 8 °C. C. officinalis не выносит заморозков. Раннее культивирование возможно в не отапливаемой теплице или в пленочном парнике.



‘Принцесса золотисто-черный’



‘Принцесса черный-оранжевый’



‘Принцесса оранжевый’



‘Принцесса золотистый’



‘Принцесса смесь’

‘Цыганка’ (Gitana)-серия (в кг)

D 8580 ‘Цыганка оранжевый’ (Gitana Orange), 30 см, сочная оранжевая окраска

D 8570 ‘Цыганка желтый’ (Gitana yellow), 30 см, желтый с коричневым

D 8540 ‘Цыганка смесь Фиеста’ (Gitana Fiesta Mix) 30 см, компактные округлые растения, полумахровые цветы средней величины во все возможных для календулы окрасках.

‘Принцесса’ (Prinzess)- серия (в кг)

50 см, полумахровые цветки с трубчатыми лепестками у центра, на прочных, длинных стеблях на срезку. Предназначены для профессионального выращивания цветов на срезку производства и культивирования в не отапливаемых теплицах. ⚔

D 9000 ‘Принцесса золотистый’, с трубчатыми лепестками у центра

D 9030 ‘Принцесса золотисто-черный’ золотисто-желтый с черной сердцевиной

D 9050 ‘Принцесса оранжевый’, отличный сорт на срезку

D 9070 ‘Принцесса черно-оранжевый’ оранжевый с черной сердцевиной

D 9090 ‘Принцесса смесь’, смесь серии из отдельных окрасок

Callistephus chinensis Астра однолетняя ⊙

Применение:	горшечное растение, для клумб балконных ящиков и срезки.
Сроки продажи:	май-октябрь, срезка: июнь-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Сроки посева:	в зависимости от применения: Как горшечное растение Рано высеваемые (в середине декабря - начале января) 'Звездный свет'(Starlight), 'Бесконечная красота' (Tausendschoen) Поздно высеваемые (март-июнь) 'Маленькая королева'(Zwergkoenigin), 'Миледи'(Milady)? 'Звездочка'(Starlet)
На срезку	
Раннее выращивание под стеклом или пленкой*	(в начале- середине февраля): 'Поммакс'® (Pommax'®) 'Астория' (Astoria), 'Фан'® (Fan®), Комплимент' (Kompliment), 'Гала' (Gala), 'Дюшес'(Durchesse), 'Матадор'® (Matador ®)
Выращивание в открытом грунте*	(март-апрель): 'Раннее чудо' (Fruehwunder), 'Астория' (Astoria), 'Помпон' (Pompon), 'Гигантские лучи'(Riesenstrahlen), 'Фан' ® (Fan ®), 'Поммакс'® (Pommax'®), 'Дюшес'(Durchesse), ' Принцесса Benary' (Benarys Prinzess), 'Комплимент'® (Kompliment®), 'Стэнди' (Standy), 'Гала' (Gala), 'Матадор' (Matador).
Позднее выращивание под стеклом или плёнкой *	(в начале июня - конце июля): 'Поммакс'® (Pommax'®), 'Матадор'® (Matador ®), 'Дюшес' (Durchesse), 'Стэнди' (Standy), 'Фан' ® (Fan ®), 'Астория' (Astoria).
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 16-20 °C. Не культивируется при температуре ниже 8 °C. Низкие температуры и короткий световой день ведут к образованию розеток и укорачиванию стеблей цветов.
Проращивание:	7-21 день при 15-21 °C
Условия проращивания:	в темноте. Используют стерильный субстрат и обрабатывают его перед посевом фунгицидами. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листков сокращают влажность субстрата, понижают температуру до 15-17 °C и культивируют рассаду при длинном светом дне. Чем прохладнее проращивание, тем сильнее и устойчивее будет рассада. Более высокие температуры вызывают замедление прорастания.

* Сорта перечислены, начиная с самого раннего

Карликовые астры, для горшков и клумб

Астры представляют собой почти безграничное разнообразие форм роста и видов окраски. Программа астр Benary предлагает широкий выбор компактно растущих сортов для получения профессионального горшечного товара и позволяет создать привлекательный ассортимент цветущих растений с мая вплоть до осени.

Астра 'Миледи' (Milady)-серия (в кг)

25 см, идеальная астра для горшка с относительно поздним цветением начиная с конца августа. У неё очень хороший ветвистый рост образующий полусферу, завершают которую густо-махровые цветки типа Дюшес. Прекрасно сформированные цветы показывают богатое цветение в стадии, когда они уже готовы к продаже. VIII-X

E 1440 'Миледи тёмно-синий'
E 1460 'Миледи светло-фиолетовый'

E 1470 'Миледи розовый'
E 1490 'Миледи розово-красный'
E 1500 'Миледи алый'
E 1510 'Миледи белый'
E 1540 'Миледи смесь серии'



Астра 'Миледи светло-фиолетовый'



Астра 'Миледи тёмно-синий'



Астра 'Миледи розово-красный'



Астра 'Миледи розовый'



Астра 'Миледи алый'



Астра 'Миледи белый'



Астра 'Миледи смесь серии'


'Звездный свет смесь'


'Звездный свет розовый'


'Бесконечная красота ® свеже-розовый'


'Бесконечная красота ® огненно-красный'


'Бесконечная красота ® карминно-красный'


'Бесконечная красота ® красно-алый'


'Бесконечная красота ® нежно-розовый'

Астра 'Звёздочка'® (Starlet®) (в кг)

20 см. Отличный поздно цветущий сорт для горшка с исключительной, красивой формой цветов. Шарообразные, компактные кустики образующие большое количество звездчатых, полумахровых цветков величиной 3-4 см с привлекательными сочетаниями окрасок из белых, розовых, красных и синих тонов. IX

E 1550 'Звёздочка® смесь'

Астра 'Звездный свет' (Starlight)- серия (в кг)

20 см. Идеально для ранних посевов. Сорта серии «Звездный свет» образуют прекрасные круглые, очень компактные кустики с большим количеством игольчатых цветов величиной 8-10 см. Светящиеся краски и густая махровость подчеркивают благородный характер грациозных цветов. 'Звездный свет' устойчив к фузариозу. Раннее цветение VIII-IX

E 1310 'Звездный свет синий'

E 1320 'Звездный свет светло-синий'
E 1330 'Звездный свет розовый'

E 1340 'Звездный свет алый'

E 1370 'Звездный свет нежно-розовый'

E 1380 'Звездный свет смесь серии'

Астра 'Бесконечная красота'® (Tausendschoen®)-серия (в кг)

20 см. Широкий и низкий рост, отлично подходит как горшечное растение. Махровые цветы величиной 8 см образуют в горшке шарообразный, светящийся букет и на клумбе кажутся плотным ковром. Позднее цветение. IX

E 0920 'Бесконечная красота ® тёмно-синий', (Benary)
E 1000 'Бесконечная красота ® свеже-розовый', однотонный
E 0990 'Бесконечная красота ® огненно-красный', позднее цветение
E 0980 'Бесконечная красота ® карминово-красный'
E 1060 'Бесконечная красота ® лазурно-голубой', (Benary) густо-махровый
E 1110 'Бесконечная красота ® красно-алый', яркий
E 1020 'Бесконечная красота ® белый'
E 0950 'Бесконечная красота ® нежно-розовый', (Benary)
E 1080 'Бесконечная красота ® смесь серии' из отдельных красок серии


'Бесконечная красота ® смесь серии'

Астра 'Маленькая королева' (Zwerg Koenigin) - серия (Benary) (в кг)

25 см. Широко и кустисто растущая астра для горшка и клумбы, поражает благородными цветами из плотно собранных друг к другу плоских, широких лепестков-ленточек. Густомахровые цветки величиной 8 см образуют устойчивую в окраске шапку. Раннее цветение. VIII-IX

E 0310	'Королева синий'
E 0540	'Королева голубой '
E 0360	'Королева кармезиновый'
E 0400	'Королева розовый'
E 0480	'Королева алый'
E 0430	'Королева белый'
E 0520	'Королева смесь', из отдельных окрасок

Астры Benary – сорта на срезку

Очень обширная программа астр Benary предлагает профессиональные сорта на срезку разнообразные по видам, выращиванию и областям использования. Огромный спектр окраски, разнообразие форм роста и цветов. В зависимости от потребностей рынка и в зависимости от производственных возможностей Вы можете найти у Benary оптимальные сорта на срезку для производства как в закрытом так и в открытом грунте.

Астра 'Астория'(Astoria)-серия (в кг)

70 см. Привлекательная, с простыми цветками, короткими лепестками (6-7 см ø) и прочными стеблями. 'Астория' лучше всего подходит для выращивания в пленочном парнике или теплице. Растения можно срезать, когда они ещё расцветают. Все 5 сортов 'Астория' с различной окраской цветут одновременно рано. VII-VIII.

F 9940	'Астория синий'
F 9960	'Астория тёмно-синий'
F 9970	'Астория карминово-розовый'
F 9980	'Астория розовый'
F 9990	'Астория белый'
F 9910	'Астория смесь серии'


'Королева смесь


'Королева кармезиновый'


'Королева розовый'


'Королева алый'


'Астория розовый'


'Астория смесь серии'


'Астория карминово-розовый'



'Принцесса Benary смесь серии'



'Принцесса светло-лососевый'



'Принцесса светящийся красный'



'Дюшес серебристо-синий'



'Фан ® лососевый'



'Фан ® насыщенно-розовый'



'Фан ® пурпурно-красный'

Астра 'Принцесса Benary' (Benarys Prinzess) - серия (в кг)

70 см. Качественная астра на срезку с мощным, хорошо разветвлённым ростом. Широкие язычковые цветы (8-10 см ø) с обрезанными трубочками у сердцевины, у которых в большинстве случаев присутствует светлая середина, которая создает привлекательный цветовой акцент. VIII-IX.

F 4030	'Принцесса Benary синий'
F 4210	'Принцесса Benary тёмно-розовый'
F 4070	'Принцесса Benary желтый'
F 4080	'Принцесса Benary голубой'
F 4090	'Принцесса Benary светло-лососевый'
F 4130	'Принцесса Benary кармазиновый'
F 4140	'Принцесса Benary лососево-розовый'
F 4160	'Принцесса Benary светящийся розовый'
F 4170	'Принцесса Benary светящийся красный'
F 4200	'Принцесса Benary насыщенно-красный'
F 4190	'Принцесса Benary белый'
F 4260	'Принцесса Benary смесь серии'

Астра 'Дюшес'(Duchesse)-серия (в кг)

70 см. Крупные (8-10 см ø), пионовидные цветки предлагает серия 'Дюшес'. Крепкие стебли и прямой рост. Возможно несколько более низкая всхожесть по сравнению с другими астрами. Позднее цветение. VIII-IX.

F 5870	'Дюшес тёмно-синий'
F 5880	'Дюшес тёмно-розовый'
F 5900	'Дюшес голубой'
F 5950	'Дюшес серебристо-синий', двуцветный
F 6150	'Дюшес смесь серии'

Астра 'Фан'®(Fan®)-серия (в кг)

60 см. 9 окрасок 'Фан'® обеспечивают множество средней величины (5-6 см ø), полумахровых цветков с ярко желтой сердцевиной. Астры 'Фан' ® обладают прямым ростом и цветут поэтапно. Вследствие этого они являются непревзойденным сортом на срезку всего растения - это дает хорошие предпосылки для масштабных посадок этой астры как в открытом грунте, так и в теплице. Отличное качество, высокая устойчивость к фузариозу и хорошая экономичность - это 'Фан' ®: одна из самых значимых срезочных астр для профессионального выращивания. С начала VIII

F 9280	'Фан ® желтый'
F 9290	'Фан ® голубой'
F 9320	'Фан ® светло-розовый'
F 9370	'Фан ® лососевый'
F 9340	'Фан ® пурпурно-красный'
F 9410	'Фан ® красный'
F 9440	'Фан ® насыщенно-синий'
F 9470	'Фан ® насыщенно-розовый'
F 9520	'Фан ® белый'
F 9590	'Фан ® смесь', смесь серии из вышеупомянутых окрасок



'Фан ® смесь»

Астра ‘Гала’ (Gala)-серия (в кг)

80 см. Прекрасный, прочный, прямой рост, это то, что идеально, то что представляет из себя ‘Гала’ с её густомахровыми игольчатыми цветами (9-10 см ø). Особенно прочные стебли, это группа астр для профессионального выращивания. VIII-IX.

F 5200 ‘Гала синий’

F 5260 ‘Гала винно-красный’
F 5280 ‘Гала желтый’

F 5220 ‘Гала карминово-розовый’

F 5320 ‘Гала лавандовый’

F 5300 ‘Гала розовый’
F 5360 ‘Гала алый’
F 5240 ‘Гала фиолетовый’
F 5350 ‘Гала смесь серии’
Смесь серии из вышеупомянутых окрасок


‘Гала смесь серии’


‘Гала винно-красный’


‘Гала лавандовый’

Астра ‘Халк’(Hulk) (Benary) (в кг)

55-65 см. Неповторимые, привлекательные зеленые "цветы" без лепестков с желто-белой сердцевиной. Хорошо ветвится и очень обильно цветёт. Высокий доход. Высокое качество, долго стоит в срезке. ‘Халк’ расширяет ассортимент астр исключительной формой этого сорта и это шанс для каждого производителя цветов на срезку. VIII-IX

E 4620 ‘Халк’, зелёные "цветы" без лепестков с желтой сердцевиной


Астра ‘Халк’

Астра ‘Комплимент’®(Kompliment®)-серия (Benary) (в кг)

75 см. Элегантная форма цветов на длинных, прямых стеблях. Насыщенные краски 'темно-синий', 'желтый' и 'рубиновый' дополняют палитру окрасок 'Комплимент'®, теперь также появилась смесь серии. 'Комплимент' с их прямыми стеблями и когтевидными лепестками цветов (10-12 см ø) - идеальный ассортимент. VIII-IX

F 0180 ‘Комплимент® тёмно-синий’
F 0210 ‘Комплимент® желтый’
F 0230 ‘Комплимент® голубой’
F 0300 ‘Комплимент® лососево-розовый’
F 0370 ‘Комплимент® рубиновый’
F 0410 ‘Комплимент® белый’
F 0430 ‘Комплимент® смесь серии’


‘Комплимент® смесь серии’


‘Комплимент® лососево-розовый’


Астра ‘Комплимент ® рубиновый’


'Матадор ® смесь серии'


'Матадор ® огненно-красный'


'Матадор ® кармазиновый'


'Матадор ® лососево-розовый'


'Поммакс ® светло-кармазиновый'



'Поммакс ® светло-фиолетовый'


'Матадор ® светящийся-карминовый'

'Поммакс ® лилово-розовый'




'Поммакс ® алый'


'Поммакс ® смесь серии

Астра 'Матадор'® (Matador®)-серия (в кг)

80 см. Длинные, по-настоящему прочные стебли соединены в серии 'Матадор' ® с отличным качеством цветов сортотипа Принцесса. Цветы величиной 10-11 см предстают в серии 'Матадор' в отлично подобранной, расширенной цветовой гамме, в дополнение к 'Матадор ® средне-синий' теперь добавились 3 прекрасных оттенка синего тона. Ветвление от основного стебля и прямой рост серии 'Матадор' ® подходят для выращивания как в теплице, так и в пленочном парнике. VIII-IX.

F 5370	'Матадор ® огненно-красный'
F 5380	'Матадор ® желтый'
F 5390	'Матадор ® кармазиновый'
F 5400	'Матадор ® лососево-розовый'
F 5410	'Матадор ® светящийся-карминовый'
F 5420	'Матадор ® насыщенно-синий
F 5460	'Матадор ® белый'
F 5470	'Матадор ® нежно-синий'
F 5520	'Матадор ® смесь серии', из отдельных окрасок

Астра 'Поммакс'® (Pommax®)-серия (в кг)

75 см. Наполовину шарообразные и густомахровые цветы величиной 7,5 см зацветают горизонтально на сильных, не ветвистых стеблях. Благодаря высокой прочности и толерантности к фузариозу астры 'Поммакс' ® очень хорошо подходят для выращивания в теплицах. С начала VIII.

E 4320	'Поммакс ® тёмно-синий'
E 4400	'Поммакс ® желтый'
E 4420	'Поммакс ® голубой'
E 4440	'Поммакс ® светло-кармазиновый'
E 4460	'Поммакс ® светло-фиолетовый'
E 4470	'Поммакс ® лилово-розовый'
E 4480	'Поммакс ® алый'
E 4340	'Поммакс ® насыщенно-красный'
E 4550	'Поммакс ® белый'
E 4590	'Поммакс ® смесь серии', из отдельных окрасок

'Поммакс ® темно-синий



Астра 'Помпон'(Pompon)-серия (в кг)

60 см. Густомахровые, наполовину шарообразные цветы-«подушки» (5-6 см _) из коротких, трубчатых лепестков. 10 отдельных окрасок с плотным ростом с тугими стеблями предлагает серия 'Помпон' для использования как отличный сорт для срезки в маленькие букеты. Растения также хороши для выращивания в защищенном грунте. С начала VIII.

E 3970	'Помпон сине-белый'
E 3900	'Помпон кроваво-красный'
E 3960	'Помпон тёмно-синий'
E 3980	'Помпон желтый'
E 4020	'Помпон голубой'
E 3990	'Помпон вишневый'
E 4040	'Помпон пурпурно-фиолетовый'
E 4110	'Помпон чисто-розовый' (Benary)
E 4100	'Помпон красно-белый' необычный, ярко-красный с белой серединой
E 4120	'Помпон белый'
E 4180	'Помпон смесь серии', из отдельных окрасок



Астра 'Помпон сине-белый'



'Помпон красно-белый'



'Помпон кроваво-красный'



'Помпон вишневый'




'Помпон чисто-розовый'

Астра 'Гигантские лучи' (Riesen Strahlen)-серия (в кг)

60 см. Густомахровые с изящно заостренными игольчатыми лепестками серия 'Гигантские лучи' представляет свои крупные цветы величиной 12-14 см. Растения имеют объемный кустистый, вполне разветвленный рост. С начала VIII.

E 7670	'Гигантские лучи огненно-красный' (Benary), светящийся красный
E 7890	'Гигантские лучи желтый'
E 7720	'Гигантские лучи средне-голубой'
E 7820	'Гигантские лучи чисто-белый'
E 7740	'Гигантские лучи серебристо-синий'
E 7780	'Гигантские лучи серебристо-розовый'
E 7920	'Гигантские лучи смесь серии', из отдельных окрасок




'Помпон пурпурно-фиолетовый'



'Гигантские лучи смесь серии'



'Гигантские лучи серебристо-синий'




'Гигантские лучи огненно-красный'

Астра ‘Стэнди’ (Standy)-серия (в кг)

75 см. На данный момент астры ‘Стэнди’ являются наиболее устойчивыми в фузариозу и вертициллезному увяданию. ‘Стэнди’ является ‘необходимостью’ для каждого профессионального ассортимента астр. Средней величины густомахровые цветы-«подушки» (7,5-10 см _), состоящие из трубчатых лепестков, обрамленных по краю венком простых лепестков правильной формы. Плотный прямой рост, хорошие стебли позволяет получать высококачественный материал срезки. VIII-IX.

F 1100	‘Стэнди кремово-белый’
F 1110	‘Стэнди тёмно-синий’
F 1130	‘Стэнди светло-синий’
F 1140	‘Стэнди светло-розовый’
F 1150	‘Стэнди карминово-красный’
F 1160	‘Стэнди лососево-розовый’
F 1170	‘Стэнди розовый’
F 1180	‘Стэнди красный’
F 1220	‘Стэнди смесь серии’, из отдельных окрасок



‘Стэнди смесь серии’



‘Стэнди кремово-белый’



‘Стэнди светло-синий’



‘Стэнди тёмно-синий’



‘Стэнди светло-розовый’



‘Стэнди карминово-красный’



‘Стэнди лососево-розовый’



‘Стэнди розовый’



‘Стэнди красный’

Пробное поле Benary с телицами в Ганн. Мюнден

www.Benary.de

Campanula carpatica F_1-гибриды
Колокольчик карпатский ♃

Применение:	многолетник для альпийской горки и горшка
Сроки продажи:	январь- сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена 'Жемчужина': так же и в мультигранулах ø 5 семян /гранула
Срок посева:	1: конец мая - конец июля; 2: ноябрь-март для цветения середина апреля-август; 3: март для цветения начиная с июля-августа
Проращивание:	14-18 дней при дневной температуре 20-22 °C и ночной температуры 16 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семя не присыпают, а прижимают, держат в постоянной влажности и по возможности ставят в освещенное место. Посевы ни в коем случае не должны пересыхать. Изменение температуры стимулирует проращивание. Избегать воздействия прямого солнечного света.
Температура:	1+2: срок культивирования с момента установки в теплицу зависит от температуры и освещения. При 15-18 °C и длинном световом дне: 7-9 недель, причем 'Жемчужина' культивируется примерно на 2 недели меньше 'Клипс' ®. Температура вентиляции: 20 °C. 2+3: стратификация для индукции цветения не требуется.



Campanula F_1 'насыщенно-синий Клипс ®'



'синий Клипс®'



'белый Клипс ®'

'Клипс'® (Clips®) (в гр) FastraX

20 см, растение с большим количеством побегов, шарообразный, закрытый рост, роскошное цветение больших цветов-колокольчиков, изящная листва. Для оформления альпинариев, каменных садов или обрамления клумб. Круглогодичная культура как цветущее горшечное и комнатное растение. ♃

H 1150	'синий Клипс®', небесно-голубой
H 1140	'насыщенно-синий Клипс ®', интенсивный синий, темно-зеленая листва
H 1160	'белый Клипс ®', сияющий белый

'Жемчужина'(Pearl) FastraX FloraStar WINNER
F_1-гибриды (штучно)

18 см. Очень раннее цветение, примерно на 2 недели раньше чем 'Клипс'®, унифицированный, компактный рост. Прекрасное замкнутое шарообразное строение кустика, раскрытые цветы. ☉

H 1010	'Жемчужина насыщенно-синий'(Pearl Deep Blue), самый темно-синий сорт на рынке
H 1040	'Жемчужина белый'(Pearl White), чисто-белый

(в мультигранулах , ø 5 семян/гранула)

H 1010P	'Жемчужина насыщенно-синий'
H 1040P	'Жемчужина белый'





Campanula F_1 'Жемчужина насыщенно-синий' и 'белый'



Campanula F_1 'Жемчужина' очищенные семена (л.) м мультигранулы (п.)

Campanula F_1 'Жемчужина насыщенно-синий' и 'Жемчужина белый'



Campanula glomerata ‘Даурика (Суперба)’



Campanula garganica



Campanula poscharskyana



Campanula poscharskyana

Campanula На срезку Колокольчик ♃

Применение:	многолетник для рабатки, срезки, медонос
Сроки продажи:	апрель-октябрь, срезка: май-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-май для не цветущих растений; июнь-август для цветения в марте-мае следующего года на срезку
Проращивание:	14-30 дней при 18-22 °C
Условия проращивание:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами. Посевы слегка присыпают вермикулитом и содержат в постоянной влажности. Посев не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листков снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка возможна в тепле начиная с декабря за 7-8 недель (C. glomerata) и соответственно за 10-12 недель (C. persicifolia) при 15-18 °C или в прохладе при 5-13 °C при длинном световом дне. Получение ранней срезки возможно за 3 недели в пленочном парнике.

H 1430 Campanula glomerata ‘Даурика (Суперба)’(Dahurica (Superba) (в гр)
50 см, темно-фиолетовое соцветие на вершине стебля, образующий кустарник многолетник на срезку, VI–VIII, ⚔

Campanula для горшка Колокольчик ♃

Применение:	многолетник для альпинария, экстенсивного озеленения поверхностей, каменных садов, обсадки могил, медонос
Сроки продажи:	апрель-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	C. garganica: январь-апрель для не цветущих растений C. garganica: июнь-август для цветения в следующем году C. poscharskyana: январь-февраль для цветения начиная с июня C. poscharskyana: июнь-август для цветеня в следующем году
Проращивание:	C. garganica: 14-20 дней при 15 °C, C. cochlearifolia и C. poscharskyana: 14-30 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидом. Посевы слегка присыпают вермикулитом и содержат в постоянной влажности. Посев не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листков снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможна в открытом грунте. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка в тепле начиная с декабря за 6-7 недель (C. poscharskyana) и соответственно за 7-8 недель (C. garganica) при 15-18 °C или в прохладе при 10-13 °C при длинном световом дне.

H 1360 Campanula garganica (C. elatinoides var. garganica) (в гр)
10 см, звездообразные раскрытые синие цветы, крепкий, почвопокровный многолетник, VI–VIII, △ ⌒

H 1560 Campanula poscharskyana (в гр) FastraX
30 см, сине-фиолетовые цветы-звезды, свисающий рост, идеально для каменных садов, культивируется как однолетник, VI–IX, △

Carlina acaulis (Carlina acaulis var. caulescens) Колючник бесстебельный ♃

Применение: многолетник для альпинария, срезки, как сухоцвет, медонос
Сроки продажи: апрель-октябрь; срезка: июль-август; засушенные цветы: Предверие и в период Рожества
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с марта по ноябрь для не цветущих растений; январь-март для цветения в июле следующего года
Проращивание: 18-25 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами против грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и содержат в постоянной влажности. Посев не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка возможна начиная с декабря за 14-16 недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-15 °C.

H 3750 Carlina acaulis simplex (в гр)
30 см, большие головки цветов, блестящие, жесткие, перистые листья, VI–VIII, △


Carlina acaulis simplex


Celosia 'Амиго желтый'

Catharanthus hybrida смотри Vinca hybrida

Celosia cristata Целозия гребенчатая ⊙

Применение: растение для клумбы, горшка и вазона
Сроки продажи: с середины апреля по август
Форма посевного материала: семена в оболочке
Срок посева: январь-июль
Проращивание: 7-14 дней при 23-25 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и содержат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 20-22 °C и сокращают влажность. Посевы не подвергают воздействию прямых солнечных лучей.
Температура: 18-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. К концу культивирования достаточно 16 °C, но желательны более высокие температуры, так как целозия теплолюбива.


'Амиго пурпурный'


'Амиго махагоново-красный'


'Амиго неоново-розовый'



'Амиго алый'


'Амиго'(Amigo) (штучно)

15 см. Блестящие, светящиеся краски. 'Амиго' представляет собой растение с плотным и светящимся петушиным гребнем, как привлекательное растение контейнеров для теплых мест на балконе или террасе. Раннее цветение и компактный с равномерным ростом кустик делают 'Амиго' подходящим для профессионалов, для производства горшечной культуры.

H 4120C 'Амиго желтый'
H 4150C 'Амиго пурпурный'
H 4160C 'Амиго махагоново-красный', темнолиственный
H 4170C 'Амиго неоново-розовый'
H 4190C 'Амиго алый'
H 4230C 'Амиго смесь'

Celosia plumosa (C. argentea var. plumosus)


'Амиго смесь'



Celosia 'Свежий взгляд'-серия: 'красный', 'желтый' и 'оранжевый'



'Глория желтый'



'Глория розовый'



'Глория алый'



'Новый взгляд'



Celosia 'Свежий взгляд'-серия

Целозия метельчатая ⊙

Применение:	растение для клумб, горшка, вазонов
Сроки продажи:	с середины апреля по август
Форма посевного материала:	семена в оболочке
Срок посева:	январь-июнь
Проращивание*:	стадия I и II: 7-14 дней при 22-25 °C стадия III: 18-20 °C стадия IV: 17-18 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности (относительная влажность воздуха 95%). После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и снижают температуру до 18-20 °C. Со стадии III начинают подкармливать комплексным удобрением из расчета 100 мг азота на 1 литр воды еженедельно. Избегают переувлажнения.
Температура:	18-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. К концу культивирования достаточно 16 °C, но желательны более высокие температуры, так как целозия теплолюбива.

*Описание стадий смотреть во введении каталога

'Свежий взгляд'(Fresh Look)-серия (Benary) (штучно)

35 см, рост очень интенсивный и очень быстро образовываются основные и побочные побеги, с прочными, выступающими метелками цветков в красных, желтых и оранжевых тонах, выдающаяся серия, высоко оцененная наградами за отличное качество как в горшечной культуре, так и в открытом грунте.

H 3921C 'Свежий взгляд желтый'

H 3931C 'Свежий взгляд оранжевый'

H 3941C 'Свежий взгляд красный'

'Глория'(Gloria)-серия (Benary) (штучно)

20 см, рано цветущие, компактные и выносливые сорта серии 'Глория' удачно подходят для посадки в горшки и другие емкости. Блестящие краски очень отчетливо видны на больших метелках. В теплых, солнечных местах ими можно украсить балкон и террасу или высадить на клумбу или рабатку. Короткий период культивирования способствует дополнительным продажам товара вплоть до осени.

H 3830C 'Глория желтый'
H 3860C 'Глория розовый'
H 3900C 'Глория алый'
H 3950C 'Глория смесь'

'Новый взгляд'® (New Look®) (Benary) (штучно)

35 см, большие, пламенно-красные метелки, кустистый, разветвленный рост и, обильное цветение, уникальная темная листва позволили сорту 'Новый взгляд'® стать победителем AAS. Богатое цветение и выносливость целозии помогут внести с её помощью экзотическую нотку в оформление вашего балкона и террасы. В более теплом климате юга её бесконечным великолепием цветов украшают клумбы и рабатки. Новые сорта серии Look также входят в программу «Fall in love» ® цветущих осенью растений от Benary. 'Новый взгляд'® совпадает по периоду цветения и форме с серией 'Свежий взгляд'.

H 3910C 'Новый взгляд'®

Centaurea Василёк ♃

Применение: многолетник-солитер, горшечное растение, срезка, лечебное растение, медонос
Сроки продажи: апрель-октябрь, срезка: апрель-август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для не цветущих горшечных растений, продажа в марте-июне; C. marcophala: июнь-август для цветения в апреле-августе; C. montana: март-апрель для цветения в сентябре-октябре; яенварь-март на срезку
Проращивание: 14-21 день при 20-25 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, песком или землей и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 17-18 °C и далее культивируют при коротком световом дне.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Ночные температуры 10-12 °C способствует лучшему формированию растения. Зимовка без заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 7-12 недель при 15-18 °C, чем выше температура, тем короче срок культивирования. При выращивании в тепле нуждается в ассимиляционном освещении. Очень раннее цветение возможно в неотапливаемом парнике за 2-3 недели.

H 4260 Centaurea macrocephala (в кг)
100-150 см, золотистые гигантские цветки- снежинки, высокодекоративно, VII–VIII, ⚔

H 4290 Centaurea montana (в кг) FastraX
60 см, горный небесно-голубой василек, V-VIII, ⚔


Centaurea montana


Centaurea macrocephala


Centaurea cyanus Василёк синий ⊙

Применение: горшечное растение, для клумб и срезки, медонос
Сроки продажи: в горшках: апрель-май; срезка: январь-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: горшечная культура: начиная с февраля по май; срезка из теплицы: октябрь-июнь, отдельными партиями; срезка из открытого грунта: апрель-июнь, отдельными партиями
Проращивание: 5-8 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, песком или землей и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 17-18 °C и далее культивируют при коротком световом дне. При непосредственном посеве в открытый грунт по возможности высевают реже, поддерживают влажность земли и защищают молодые растения от ночных заморозков.
Температура: 10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. C. cyanus выносит температуры до 10 °C, но это замедляет рост.

H 4560 'Блауер Юнге' (Blauer Junge) (в гр)
90 см, темно-синий василек, VI–IX, Bie, ⚔


H 4500 «Праздничная драгоценность» (Jubilee Gem) (в гр)
40 см, ярко синего цвета, устойчивый, VI–IX, ⚔


Centaurea 'Блауер Юнге'


Centaurea 'Праздничная драгоценность'



Centranthus
'Розово-красный'



Centranthus 'Белый'

Centranthus ruber Центрантус красный ♃

Применение: образующий кустарник многолетник, лечебное растение для контейнеров и срезки
Сроки продажи: май-сентябрь, срезка: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль - март для цветения в июне-июле; в открытый грунт начиная с марта для цветения в сентябре-октябре; Начиная с августа июля для очень раннего цветения в апреле
Проращивание: 14-21 день при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы прижимают и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев посевы не подвергают воздействию прямого солнечного света. Всходы появляются неравномерно.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено.. Выгонка начиная с марта за 6-8 недель при 15-18 °C или возможно в прохладе при 8-15 °C.

H 6120 'Розово-красный' (в кг) FastraX
80 см, пурпурно-розовый, сильные, слабо ветвистые стебли, блестящая, сине-зеленая листва, V–VII, ⚔

H 6140 'Белый' (в кг) FastraX
80 см, партнер к сорту 'Розово-красный' V–VII, ⚔

Cerastium tomentosum (Cerastium tomentosum var. columnae) Ясколка войлочная ♃

Применение: почвопокровный многолетник для альпинариев и каменных садов, декоративнолиственное растение, образует плотный ковер, медонос
Сроки продажи: не цветущие растения: март-октябрь; цветущие: февраль-июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с ноября по июль для не цветущих растений; в середине июля – конце августа для цветущих с конца февраля растений
Проращивание: 7-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы прижимают и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Посевы не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5°C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка начиная с декабря за 6-8 недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C.

H 6990 'Серебряный ковёр' (Silberteppich) FastraX
20 см, низкий серебристо-белый ковёр с украшением из чисто белых цветов, вечнозелёное, V-VI, △



Cerastium 'Серебряный ковёр'



Cerastium
'Серебряный ковёр'

Cheiranthus смотри Erysimum

Chrysanthemum frutescens смотри Argyranthemum frutescens

Chrysanthemum leucanthemum смотри Leucanthemum vulgare

Chrysanthemum maximum смотри Leucanthemum x superbum

Chrysanthemum parthenium смотри Tanacetum parthenium

Chrysanthemum ptarmiciflorum смотри Tanacetum ptarmiciflorum

Chrysanthemum Хризантема ⊙

Применение:	групповое растение, для горшков или балконных ящиков
Сроки продажи:	апрель-июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в горшок: январь-апрель; в открытый грунт: апрель, возможен непосредственный посев
Проращивание:	10-12 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	посевы присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают температуру до 15-18 °C.
Температура:	C. multicaule: 10-12 °C и C. paludosum: 15-17 °C. Температура вентиляции: 15 и соответственно 18 °C. Чем прохладнее, тем компактнее будет строение растения. Начиная с апреля возможно культивирование в открытом грунте. Растения от ночных заморозков укрывают нетканым полотном.

J 1880 Chrysanthemum multicaule ‘Гном’(Kobold) (в кг)
(Coleostephus multicaulis), 20 см, маленькие, желтые цветы, длительное цветение, VII–X,

J 2000 Chrysanthemum paludosum ‘Белое кольцо’ (Weisser Ring) (в кг)
(Hymenostemma paludosum), 30 см, длительное цветение, для обрамления клумб и групповых посадок, VII–X

Cineraria maritima смотри Senecio cineraria



Chrysanthemum ‘Гном’



Chrysanthemum ‘Белое кольцо’



Cleome ‘Розовая королева’



Cleome ‘Смесь’

Cleome spinosa Клеома колючая ⊙

Применение:	статное групповое растение, так же используется как солитерное
Сроки продажи:	май-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с февраля по май
Проращивание:	4-6 дней при 26-30 °C дневной температуры и 20-21 °C ночной
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом. В период плохой естественной освещенности необходим добавочный ассимиляционный свет. Колебание дневных и ночных температур способствует проращиванию. Субстрат держат постоянно влажным, но не допускают никакого переувлажнения. После появления первых листьев дневную температуру можно опустить до 22-25 °C. Более низкие температуры замедляют проращивание и делают его неравномерным.
Температура:	18-25 °C. Температура вентиляции: 27 °C. Cleome - это теплолюбивое растение, оно не переносит температуры ниже 10 °C в стадии рассады. Перед продажей растения обязательно закаливают.

J 3760	‘Хелен Кампбелл’ (Helen Campbell), (в кг), 90 см, белоснежный
J 3770	‘Вишневая королева’ (Kirschkoenigin), (Benary) (в кг) 90 см, густо-карминовый, почти красный оттенок
J 3790	‘Розовая королева’ (Rosakoenigin), (в кг), светло-розовый
J 3870	‘Фиолетовая королева’ (Violettkoenigin), (в кг), 90 см, насыщенно-фиолетовый
J 3930	‘Смесь’, (в кг), смесь из вышеупомянутых окрасок

Cobaea scandens Кобея лазящая ⊙

Применение:	привлекательное, быстро растущее вьющееся растение для подпорных стенок, балкона или зимнего сада, для вазонов
Сроки продажи:	середина апреля - июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль- апрель
Проращивание:	14-20 дней при 18-21 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают субстратом или вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев начинают удобрять.
Температура:	14-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают при 10-12 °C. Кобея не переносит заморозки. Зимовка возможна в не отапливаемой теплице, но это затруднительно.

J 4010	Cobaea scandens (в кг) до 400 см, фиолетовые, привлекательные вьюны для ширм и стен, VII–X, ⁂

Coleostephus multicaulis смотри Chrysanthemum multicaule




Cleome ‘Вишневая королева’

Coleus blumei (Soleonstemon scutellariodes) Колеус Блюме

Применение:	декоративнолиственное растение для клумб, вазонов, балконных ящиков и горшков.
Сроки продажи:	с середины апреля по ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	Начиная с января
Проращивание:	5-10 дней при 22-24 °C.
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в увлажненном состоянии. После развития первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 20 °C. После каждого полива дожидаются подсыхания земляного кома. Избегают сильного переувлажнения.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают. Колеус не переносит температуры ниже 5 °C.

J 4810 'Волшебная смесь'(Wizard Mix) (в гр)
20-30 см, мелколиственный, ветвистый от корня и компактно растущий сорт, равномерное и позднее цветение. Яркие, контрастные окраски.



Coleus 'Волшебная смесь'

Coreopsis grandiflora Кореопсис крупноцветковый

Применение:	горшечная культура, рабатки и для посадки в кадках
Сроки продажи:	май-сентябрь, срезка: июнь-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	однолетник ('Ранний восход'): февраль-апрель; двулетник ('Солнечный луч' и 'Солнечное дитя'): май-июль
Проращивание:	14-21 день при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы лишь слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате, но ни в коем случае не дают рассаде пересыхать.
Температура:	15-21 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте с зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за 6-7 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Выгонка в прохладе удлиняет период культивирования.



Coreopsis 'Ранний восход'

J 5620 'Ранний восход' (Early Sunrise) FastraX
45 см, круглые кустики, множество полумахровых цветков величиной 5 см. Для рабатки и городского озеленения, маленьких и больших садов, для срезки и производства рассады, культивируется как однолетник. VII–X

J 5740 'Солнечное дитя' (Sonnenkind) (Benary)
40 см, компактные кусты, обильное цветение из желтых с коричневом кольцом цветов, нуждается в вернализации, е

J 5780 'Луч солнца' (Sunray или Sonnenstrahl)
35 см, богатое цветение махровых, золотистых цветов все лето напролёт, нуждается в вернализации

Coriandrum sativum смотри
Benary · Семена пряных трав

Cortaderia selloana смотри
Benary · Однолетние декоративные травы



Coreopsis 'Солнечное дитя'



Cosmos ‘Раннее чудо’

Corydalis lutea (Pseudofumaria lutea)
Хохлатка желтая ♃


Применение:	образующий кустарник многолетник для альпийской горки, медонос
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь - март для цветения начиная с июня; в июле-августе для цветения в следующем году
Проращивание:	7-14 дней при 15-18 °C. 21-28 дней при 0-4 °C. 7 дней при 10 °C, далее при 12-15 °C
Условия	в холоде. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом, держат в постоянной влажности по приведенной температурной схеме. Прохладная фаза может проводиться в прохладном складском помещении или в открытом грунте. Изменение температуры стимулирует проращивание. Всходы появляются неравномерно. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

J 6220 Corydalis lutea (в гр)
30 см, богатое желтое цветение, серо-зеленая листва, идеально для стыков между камнями, V–X, △ ◐

Cosmos bipinnatus (Bidens formosa)
Космос дваждыперистый ⚔

Применение:	обрамление клумб, групповые посадки, срезка
Сроки продажи:	середина мая - август; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в горшок: с февраля по май; в открытый грунт: с мая, не переносит поздних заморозков
Проращивание:	5-8 дней при 20 °C.
Условия проращивания:	в темноте. Семена присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 17-18 °C.
Температура:	15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C

J 6550 ‘Раннее чудо’ (Fr_hwunder) (Benary) (в кг)
100 см, очень ранний, обильно усеянный цветами сорт с изысканной игрой красок, VII–IX, ⚔



Corydalis lutea

Cosmos sulphureus Космос серножелтый ⊙

Применение:	обрамление клумб, групповые посадки, для горшков и контейнеров
Сроки продажи:	середина апреля - август
Форма посевного материала:	очищенные и отборные семена
Срок посева:	в горшок: с февраля до конца июля
Проращивание:	5-8 дней при 20 °C.
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 17-18 °C.
Температура:	15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C

‘Космик’(Cosmic)-серия (в кг)

30 см, ветвистый, компактный и шарообразный рост, очень обильное цветение полумахровых цветков, Ф-VIII

J 6710 ‘Космик желтый’

J 6740 ‘Космик оранжевый’

J 6730 ‘Космик красный’

J 6741 ‘Космик смесь’, смесь отдельных окрасок

‘Космик’(Cosmic)-серия отборных семян, высшее качество (штучно)

J 6710D ‘ Космик желтый’

J 6740D ‘ Космик оранжевый’

J 6730D ‘ Космик красный’

J 6741D ‘ Космик смесь’, смесь отдельных окрасок

Craspedia globosa (Pycnosorus globosa) Краспедия шаровидная ⊙ ⚔

Применение:	цветок на срезку и засушивания
Сроки продажи:	срезка: май-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	отдельными партиями с декабря по апрель
Проращивание:	7-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После развития первых листьев понижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температуры ниже 13 °C в течение длительного периода могут повлечь пожелтение листа и замедление роста. Краспедия не переносит заморозков, поэтому растения открытого грунта необходимо защищать от ночных заморозков.

J 7060 ‘Барабанные палочки’(Trommelstock) (штучно)
60 см, круглые, желтые головки цветов на длинных, неветвистых и непокрытых листьями стеблях, для свежих и сухих букетов, листья собраны в прикорневые розетки, VII–VIII



Cosmos ‘Космик смесь’



‘Космик желтый’



‘Космик оранжевый’



‘Космик красный’



Craspedia ‘Барабанные палочки’



Cosmos ‘Космик оранжевый’




Cuphea ignea

Cuphea ignea (Cuphea platycentra) Куфея огненно-красная ⊙

Применение:	растение для клумб, горшков, кашпо, балконных ящиков
Сроки продажи:	С середины апреля
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в горшок: с февраля по апрель, в кашпо: январь-март
Проращивание:	7-14 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы лишь слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате. При малом естественном освещении требуется дополнительный ассимиляционный свет.
Температура:	18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После укоренения растений понижают температуру до 16 °C. Переносит температуры в 10-14 °C , но от этого удлиняется период возделывания.

J 7900 Cuphea ignea (platycentra) (в гр)
30 см, гранатово-красный с черным, длительный период цветения, идеально для обрамления клумб и для горшка. V-IX



Dahlia ‘Садовый друг’®



Dahlia ‘Фигаро смесь’



Dahlia ‘Риголетто’

Cyperus alternifolius смотри Многолетние декоративные травы

Cyperus glaber смотри Однолетние декоративные травы

Cucurpita repo смотри Zierkuerbis

Dahlia variabilis Георгина изменчивая ⊙

Применение:	растение для клумб, балконов, горшка, как долго-цветущее групповое растения
Сроки продажи:	с середины мая по август
Форма посевного материала:	семена в оболочке (‘Садовый друг’®) и очищенные семена
Срок посева:	январь- июнь, в начале февраля для продажи в 1-2 декаду мая
Проращивание:	3-5 дней при 24-26 °C. Температура проращивания: желательно 18-26 °C. Более низкие температуры продлевают время проращивания (10-14 дней).
Условия проращивания:	в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами. Посев присыпают вермикулитом, субстратом или песком и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев медленно понижают температуру до 16-17 °C и сокращают влажность субстрата. Температуры ниже 10 °C ведут к индукции цветения и снижают ветвистость растения.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают при 12-13 °C. Цветущий товар никогда не культивируют при температурах ниже 13 °C. При температурах выше 21 °C в сочетании со световым днём более 16 часов цветы засыхают. При температурах выше 25 °C индукция цветения сильно ухудшается.

K 0200 ‘Садовый друг’® (Gartenfreude®) (Benary) (в кг)
30 см, равномерный, очень низкий рост, плотные полумахровые цветки прекрасной окраски. Благодаря раннему цветению хорошо подходят для создания клумб. Срок культивирования: 8-9 недель.

K 0200C ‘Садовый Друг®’(Gartenfreude®) (Benary) (штучно)
Этот покрытой оболочной посевной материал идеально подходит для машинного посева, так же желтая оболочка упрощает контроль за высевом.

K 0320 ‘Фигаро смесь’(Figaro Mix) (в кг)
35 см, полумахровые цветы, компактный, равномерный рост, смесь низкорослых растений разных окрасок

K 0640 ‘Риголетто’ (Rigoletto) (в кг)
35 см, смесь полумахровых низкорослых сортов

Delphinium consolida (Consolida regalis)
Дельфиниум полевой ☉ ⚔

Применение:	цветок на срезку для свежих и сухих букетов
Сроки продажи:	срезка: с начала апреля по октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в теплицу: февраль-август, непосредственный посев в открытый грунт: март-апрель; осенний посев с защитой зимой: с сентября по ноябрь
Проращивание:	18-25 дней при 10 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. Посевам ни в коем случае не дают пересыхать в открытом грунте. Для этого их укрывают фольгой в течение первых дней. Дельфиниум consolida вполне устойчив к переувлажнению, но не выносит застоя воды. В период проращивания температура не должна подниматься выше 15 °C.
Температура:	14-16 °C. Ко времени расцвета: 16 °C. Температура вентиляции: 18 °C

‘Превосходный’ (Exquisit) (в кг)

120 см, крепкие растения, разветвление от корня, очень длинные, обильные метелки махровых цветков, VII, ☉ ⚔

K 1490	‘Синий колокольчик’ (Blaue Glocke), голубой
K 1510	‘Синяя пирамида’ (Blaue Pyramide), тёмно-синий
K 1780	‘Карминовый король’(Karminkoenig), карминово-красный
K 1830	‘Розовая королева’ (Rosa Koenigin)
K 1900	‘Белый король’ (Weisser Koenig)



‘Benary Пасифик средне-синий с белым глазком’

‘Небесно-синий’

‘Розоватый тон’

Delphinium cultorum (Delphinium-Hybriden)
Дельфиниум садовый ♃

Применение:	солитер-многолетник, срезка
Сроки продажи:	апрель-октябрь, срезка: апрель-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в теплицу: декабрь-май; непосредственный посев в открытый грунт: март-апрель
Проращивание:	12-18 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. Посевам ни в коем случае не дают пересыхать в открытом грунте. Для этого их укрывают фольгой в течение первых дней. Дельфиниум cultorum устойчив к перевлажнению, но не выносит застоя воды. В период проращивания температура не должна подниматься выше 15 °C.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. D. cultorum цветет без вернализации. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 10-12 недель при температуре 15-18 °C.



‘Розово-лавандовый’

‘Benary Пасифик’(Benarys Pacific) (в гр) FastraX

180 см, особенно высокое качество культуры, культивируется как однолетник, VI–VIII, ♃ ⚔

K 2780	‘Benary Пасифик тёмно-фиолетовый’
K 2800	‘Benary Пасифик небесно-синий’
K 2830	‘Benary Пасифик средне-синий с белым глазком’
K 2950	‘Benary Пасифик белоснежный’
K 2880	‘Benary Пасифик розоватый тон’
K 2850	‘Benary Пасифик розово-лавандовый’
K 2990	‘Benary Пасифик смесь серии’



Delphinium ‘Benary Пасифик тёмно-фиолетовый’



Delphinium 'Синее зеркало'



Delphinium «Летние ночи»



«Летняя синь» ®



«Летние звёзды»

Delphinium grandiflorum (Delphinum chinense)
Дельфиниум крупноцветковый ♃

Применение:	обрамление клумб, как горшечное растение, для вазонов и создания ковров
Сроки продажи:	апрель-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	как однолетник: с декабря по май; как двулетник: с середины августа до середины сентября
Проращивание*:	стадия I: 14-18 дней при 20-22 °C Стадия II: 15-20 дней при 17-20 °C Стадия III-IV: 20-25 дней при 13-17 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена тонко присыпают субстратом или вермикулитом. Держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	13-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Вегетативному развитию способствует температура до 13 °C в сочетании с коротким световым днем и подавляется образование цветов. Температуры выше 30 °C опасны тем, что могут привести к деформации цветков. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте только с достаточной защитой и в сухом грунте. Выгонка за 8-10 недель при 15-20 °C

*Описание стадий смотреть во введении каталога.

K 3410 'Синее зеркало' (Blauer Spiegel) (в гр) FastraX
50 см, крупные, ровные, ультрамариновые цветы без шпорцев

Summer «Лето» - серия (Benary) (штучно) FastraX

30 см, сильно ветвистые, генетически компактные карликовые дельфиниумы с обильным цветением привлекательных оттенков. Трио 'Summer' цветет раньше и более устойчиво к жаре, чем другие сорта этого типа Дельфиниумов. Все 3 окраски не нуждаются в вернализации и могут культивироваться как однолетники. Идеально для посадки на клумбе и в вазонах.

K 3451 SummerBlues® «Летняя синь» ®
(Benary) небесно-синие метелки цветов

K 3580 SummerNights «Летние ночи»
лазурные метелки цветов, обильное цветение

K 3630 SummerStars «Летние звёзды»
белые метелки цветов

K 3640 SummerColours «Цвета лета»
Смесь из всех окрасок



Delphinium
«Цвета лета»

Delphinium nudicaule ♃
Дельфиниум голостебельный

Применение:	групповое растения для клумб, многолетник для горшка, медонос
Сроки продажи:	май-июль и август-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-март для цветения в июне-августе; июль-август для цветения в следующем году
Проращивание:	12-16 дней при 15-17 °C
Условия проращивания:	в темноте. Субстрат перед посевом против грибковых заболеваний обрабатывают фунгицидом. Посевы присыпают вермикулитом, субстратом или песком и держат в увлажненном состоянии. Обязательно избегают переувлажнения. Температуры выше 23 °C препятствуют прорастанию.
Температура:	15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте только с зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за 7-9 недель при температуре 12-16 °C. Для полноценного роста и хорошего ветвления необходимы температуры выше 10 °C.

K 3690 'Лис'(Fox) (Benary) (штучно) FastraX
25-30 см, значительно меньше чем 'Лаурин'®, 'Лис' обладает такой же хорошей разветвленностью и компактным ростом. Многочисленные, ярко-оранжевые цветы в сочетании с привлекательной блестящей, зеленой листвой. Культивируется как однолетник. VI-VIII, ♃

K 3670 'Лаурин'® (Laurin®) (Benary) (в гр) FastraX
40-45 см, светящиеся, интенсивно-оранжевые цветки, более ветвистый и компактный рост, чем у похожих простых сортов, более блестящая, зеленая листва. Культивируется как однолетник. VI-VII, ♃


Delphinium 'Лис'


Delphinium 'Лаурин'®

Delphinium semibarbatum
(Delphinium sulphureum, Delphinium zalil)
Дельфиниум полубородатый ♃


Применение:	многолетник-солитер, растение для контейнера и свежей срезки
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: июнь- июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-март для цветения в июле; в июне-августе для цветения в следующем году
Проращивание:	20-30 дней при 10-15 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посев присыпают вермикулитом, песком, субстратом и держат в увлажненном состоянии. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	15-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Дельфиниум Semibarbatum теплолюбивое растение, лучше всего размещать в теплых хорошо освещенных местах. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте только с достаточной зимней защитой и сухом грунте. Выгонка за 11-12 недель при 15-20 °C.

K 3890 Delphinium semibarbatum (в гр)
120-150 см, желтые кисти, элегантный цветок на срезку, может культивироваться как однолетник, теплолюбиво VII-IX, TF, ♃


Delphinium semibarbatum



Dianthus
‘Предвестник смесь’



‘Супер дюплекс смесь’

Dianthus barbatus Гвоздика турецкая ☉ ⚔

Применение:	растения для клумб, горшка и срезки
Сроки продажи:	рассада с земляным комом: август-октябрь; цветущие растения: апрель-август; срезка: январь (раннее культивирование) - октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	июль-сентябрь для цветения в январе-августе; май-июнь для не цветущего товара; с мая посев для открытого грунта
Проращивание:	7-14 дней при 15 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом против фузариоза обрабатывают фунгицидом. Посевы не присыпают и держат в постоянной влажности. Высокая относительная влажность воздуха (> 95%) необходима во время проращивания. После появления первых листьев сокращают влажность воздуха и влажность субстрата. Культивируют при максимально возможном освещении.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Прохладный период 6-9 недель (2-5 °C) требуется для индукции цветения с 8 листа. Выгонка в тепле за 7-9 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Раннее культивирование в открытом грунте возможно при укрытии, в плёночном парнике.

K 5180 ‘Супер дюплекс смесь’ (Super Duplex Mix) (в кг)
50 см, густомахровые цветки, прекрасная игра красок, специальная смесь для профессионального выращивания цветов на срезку, ⚔

K 5080 ‘Предвестник смесь’ (Vorl_ufer Mix’) (в кг)
50 см, цветет на 10 дней раньше, ⚔

Карликовая турецкая гвоздика

K 5330 ‘Индейский ковер’(Indianerteppich) (в кг)
25 см, смесь немахровых карликовых сортов

Dianthus
‘Индейский ковер’

Dianthus caryophyllus
Гвоздика садовая одно и двулетняя, махровая для сада, питомника ☉ ☉☉ ⚔ D

Применение: растение для горшка, вазона, клумбы, срезки
Сроки продажи: рассада с земляным комом: август-октябрь; цветущее растение: апрель-сентябрь; срезка: январь (раннее культивирование) - октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: 'Шабо крупная': возможно круглый год; в конце января в марте для цветения начиная с мая; начиная с мая для посева в открытый грунт
'Флористан'®: июль-август для цветения в январе-августе; март-май для не цветущего товара; начиная с мая для посева в открытый грунт
Проращивание: 7-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидом против грибковых заболеваний. Посевы не присыпают и держат в постоянной влажности. Высокая относительная влажность воздуха (> 95%) необходима во время проращивания. После появления первых листьев сокращают влажность воздуха и влажность субстрата и снижают температуру до 16 °C. Культивируют при максимально возможном освещении.
Температура: 13-16 °C дневная температура и 10 °C ночная. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грнте при температурах не ниже 3-5 °C или зимовка в открытом грунте. Требуется прохладный период для индукции цветения с 8 листа на 6-9 недель при 5 °C ('Флористан'®). Выгонка в тепле за 7-9 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Раннее культивирование в открытом грунте при укрытии в пленочном парнике. По возможности избегают сильных температурных колебаний (более 10 °C), так как это может привести к разрыву тканей в основании цветка.



Dianthus 'Флористан ® смесь'



'Флористан ® желтый'



'Флористан ® лососево-розовый'



'Флористан ® алый'



'Флористан ® белый'

'Флористан'® (Floristan®) (Benary) (в гр)

70 см, отдельные краски непревзойденной красоты, высокое качество цветов на срезку. Длинные, по-настоящему прочные стебли, зимостойкие сорта нуждаются в вернализации. Ї є

L 1410	'Флористан ® желтый'
L 1450	'Флористан ® лососево-розовый'
L 1490	'Флористан ® алый'
L 1510	'Флористан ® белый'
L 1550	'Флористан ® смесь' содержит все возможные оттенки

'Шабо крупная' (в гр)

50 см, длинные, очень прочные стебли и густомахровые, большие цветы, великолепная игра красок на срезку. Культивируется как однолетник. ☉ ⚔

K 7070 'Специально составленная смесь Benary'



Dianthus «Шабо крупная», 'Специально составленная смесь Benary'



Dianthus ‘Шарм волшебная смесь’



Dianthus ‘Супер Парфе малина’



Dianthus ‘Супер Парфе клубника’



Телстар Темно-красный’



‘Телстар пикоти’



‘Телстар розовый’



‘Телстар пурпурный’



‘Телстар пикоти’



‘Телстар алый’

Dianthus chinensis F_1-гибриды Гвоздика китайская ☉ ☉☉

Применение:	горшечное растение, для клумб и вазонов
Сроки продажи:	апрель - август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с января по май для цветения начиная с апреля; июль-сентябрь для цветения в следующем году
Проращивание:	2-4 дня при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом против фузариоза обрабатывают фунгицидом. Посевы слегка присыпают вермикулитом, держат в постоянной влажности и ставят под свет. Во время проращивания необходима высокая относительная влажность воздуха (> 95%). После появления первых листьев сокращают влажность воздуха и влажность субстрата, понижают температуру до 20 °C и культивируют при максимально возможном освещении.
Температура:	10-15 °C дневная температура и 8-10 °C ночная. Температура вентиляции: 18 °C, если это позволяют погодные условия. Культивируют при минимально возможных температурах, тепло приводит к вытягиванию листьев. Растения зимуют при 3-5 °C. Выгонка при температурах 13-18 °C, возможна также выгонка при температурах + 8+10 °C.

‘Шарм’ (Charm), F_1-гибриды (в гр)

20 см, сказочно красивые гвоздики, низкорослые, обильно и рано цветущие. Для клумб и горшка.

K 4290	‘Шарм Скарлет’ (Charm Scarlet), алый
K 4230	‘Шарм волшебная смесь’ (Charm Magic Mix), смесь серии из 6 светящихся окрасок

‘Супер Парфе’ (Super Parfait), F_1-гибриды (в гр)


15 см, очень компактный, равномерный рост, обильное раннее цветение (5 см ø), привлекательный двулетник, замечательно подходит для контейнеров и сада.

K 4180	‘Супер Парфе малина’ (Super Parfait Raspberry) большие, пурпурные цветы с бело-розовой каймой
K 4190	‘Супер Парфе клубника’ (Super Parfait Strawberry) алая середина цветов с белым краем

‘Телстар’(Telstar), F_1-гибриды (D. chinensis x D. barbatus) (в гр)

25-30 см, гвоздика для горшка и клумбы с мощным, средне-кустистым ростом и богатым, ранним цветением. Блестящая очень оригинальная селекция.

K 4380	‘Телстар Темно-красный’ (Telstar Crimson), карминовый, яркий
K 4390	‘Телстар пикоти’ (Telstar Picotee) карминовый с нежной белой каймой
K 4350	‘Телстар розовый’ (Telstar Pink), светло-розовый
K 4430	‘Телстар пурпурный’ (Telstar Purple), пурпурно-фиолетовый, редкая окраска
K 4560	Телстар пурпурный пикоти’ (Telstar Purple Picotee), пурпурный с белой каймой
K 4410	‘Телстар алый’ (Telstar Scarlet), алый
K 4520	‘Телстар белый’ (Telstar White), белый
K 4400	‘Телстар смесь’ (Telstar Mix) смесь насыщенных тонов: лососевого, красного и ярко-красного, некоторые с белым глазком



Dianthus ‘Telstar Mix’

Dianthus deltoides Гвоздика травянка 2

Применение:	почвопокровный многолетник для альпинариев, каменных садов, создания «ковра»
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	семена в оболочке
Срок посева:	март-июль
Проращивание*:	стадия I: 10-14 дней при 20-22 °C Стадия II: при 18-22 °C Стадия III: при 18-20 °C Стадия IV: при 16-18 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. Посевы не переносят ни переувлажнения, ни сухости. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	10-12 °C или соответственно выращивание в открытом грунте. Температура вентиляции: 15 °C. Зимовка при 3-5 °C. Для вернализации необходимо 8-10 недель прохлады. Выгонка за 7-8 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при естественных условиях (очень медленно, в зависимости от наружной температуры) для цветения в мае-июне. Для цветения необходима температура не ниже 15 °C.

*Описание стадий смотреть во введении каталога.



Dianthus 'Конфетти вишневый'

'Конфетти' (Confetti)-серия (штучно)

Высотой 15 см, почвопокровный многолетник с роскошно сверкающим, душистым ковром цветов, вечнозелёный. Унифицированный тип роста во всех 4 окрасках с одновременным цветением. V-X

L 2610C	'Конфетти карминово-розовый'
L 2620C	'Конфетти вишневый'
L 2640C	'Конфетти насыщенно-красный', брозново-красный лиственный покров
L 2670C	'Конфетти белый'
L 2680C	'Конфетти смесь серии'



'Конфетти карминово-розовый'



'Конфетти белый'



'Конфетти насыщенно-красный'





Dianthus
'Конфетти смесь серии'





Dianthus
'Крупноцветковая'



Dianthus 'Весеннее наслаждение'

Dianthus Гвоздика ♃

Применение:	почвопокровный многолетник для каменных садов, альпинариев, песчаных садов-степей, вазонов, создания «ковров»
Сроки продажи:	май-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-февраль для цветения начиная с мая; июль-август с зимовкой и цветением в следующем году
Проращивание:	7-14 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. Посевы не переносят ни переувлажнения, ни сухости. После появления первых листьев ставят под свет и снижают температуру до 18 °C.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C. Выгонка за 7-8 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при естественных условиях (очень медленно, в зависимости от наружной температуры) для цветения в мае-июне. Для цветения необходима температура не меньше 15 °C.

Dianthus gratianopolitanus (Dianthus caesius) Гвоздика серовато-голубая ♃ FastraX

L 3410 'Крупноцветковая' (Grandiflorus) (в гр)
20 см, розовые тона, газонообразующий рост, вечнозелёное, культивируется как однолетник V-VII

Dianthus hybridus FastraX

L 2240 'Оллвудии альпинус' (Allwoodii Alpinus) (в гр)
20 см, розовые тона, простая, словно покрытая инеем листва, вечнозелёное, культивируется как однолетник V-VII, D, △ ⁞

Dianthus plumarius Гвоздика перистая

L 3680 'Весеннее наслаждение'(Fr_hlingswonne) (в гр)
50 см, качественные полумахровые цветки, вечнозелёное, культивируется как однолетник VI–VII



Dianthus
'Оллвудии альпинус'

Dicentra (Diclytra) Дицентра, Разбитое сердце ♃

Применение:	образующий кустарник многолетник, идеально для обсаживания изгороди, как цветущее горшечное растение, лечебное растение, срезка
Сроки продажи:	март-октябрь; срезка: май-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для продажи нецветущих растений в мае-июле; май-июль для продажи цветущих растений начиная с мая следующего года
Проращивание:	7-14 дней при 15-18 °C; 21-28 дней при 0-4 °C; 7 дней при 10 °C; Затем при 12-15 °C
Условия проращивания:	в холоде. Семенам дают разбухнуть в воде 48 часов. Посевы присыпают вермикулитом, песком, субстратом, держат в постоянной влажности, соблюдая температурную схему, которая способствует проращиванию.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка начиная с середины января за 4-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C. Образование цветов ухудшается при температуре выше 25 °C днем/ночью. Чем прохладнее, тем более компактным будет строение растения.


L 4240 Dicentra eximia Дицентра исключительная(в гр)
40 см, пурпурно-розовый, V–IX, ◐

L 4300 Dicentra spectabilis Дицентра великолепная (в гр)
70 см, розовые сердцевидные цветы на длинных кистях, сине-зеленые листья, V–VI, T, ⚔ ⌒ ◐

L 4350 Dicentra spectabilis ‘Белое сердце’ (Weissherz) (in g)
80 см, белоснежные цветы на длинных кистях, V–VII, T, ⚔ ⌒ ◐



Dicentra eximia



Dicentra spectabilis ‘Белое сердце’



Dicentra spectabilis



Doronicum ‘Великолепие’



Doronicum ‘Изысканность’®



Doronicum ‘Маленький Лео’



Draba lasiocarpa

Doronicum orientale Дороникум восточный ⚲

Применение:	посадка в горшки, вазоны и на клумбах, срезка
Сроки продажи:	февраль-май, срезка: апрель-май
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	Отдельными партиями с середины февраля по июнь
Проращивание:	14-21 день при 15-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев посевы ставят на свет и в прохладу (15-16 °C). Посевы не должны пересыхать.
Температура:	10-12 °C. Температура вентиляции: 15-18 °C. Растения из горшков при пересадке в открытый грунт помещают в полутень. Зимовка при 1-5 °C или в открытом грунте. Перед сильными морозами растения защищают нетканым полотном. Раннее культивирование при прохладных условиях (с 51 недели): растения культивируют в открытом грунте 6-8 недель при 5°C. При более высокой температуре происходит вытягивание стеблей. Затем медленно повышают температуру до 8-10 °C. Растения, которые перезимовали, могут быть тотчас же перенесены для доращивания на 10-12 недель при 8-10 °C. Раннее культивирование в тепле (с 51 недели): перезимовавшие растения культивируются 7-8 недель при 15-18 °C.

L 6460 ‘Великолепие’(Magnificum) (в гр)
50 см, обильно усеянное желтыми цветами растение, ⚔ △

L 6490 ‘Изысканность’® (Finesse®) (Benary) (штучно)
50 см, желтые, большие изысканные светящиеся цветы на длинных стеблях, ⚔ △

L 6540 ‘Маленький Лео’ (Little Leo) (Benary) (штучно)
25 см, компактный, широкий, кустистый рост, цветы диаметром от 5 см, двойной венок лепестков, особенно интенсивная окраска, для открытого грунта и ранней посадки в горшки

Draba lasiocarpa (Draba aizoon) Крупка шершавоплодная (ворсистоплодная) ⚲

Применение:	почвопокровный многолетник для альпийской горки, образует «ковёр», для стыков камней
Сроки продажи:	март-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	август март
Проращивание:	14-21 день при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянное увлажнение. После появления всходов плавно понижают температуру до 16-18 °C и культивируют при пониженной влажности.
Температура:	12-15 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Для индукции цветения необходима вернализация. Выгонка при холодных условиях (с 51 недели) при 10-15 °C или при теплых условиях при 15-18 °C.

L 6730 Draba lasiocarpa (aizoon) (в гр)
8 см, желтый, маленькие, зеленые ковры, вечнозелёное, III–V, △



Doronicum
‘Маленький Лео’

Echeveria peacockii Эхеверия Пекокка, Толстянка



Echeveria peacockii


Применение:	медленно растущее, с толстыми листьями растение для горшка (комнатное растение), стелящихся клумб и посадки на кладбище
Сроки продажи:	апрель-ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель
Проращивание:	10-18 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена слегка прижимают и держат в постоянной влажности. Посевы не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	18-25 °C. Ночью снижают температуру до 15-18 °C, чем ниже температура, тем красивее окраска листьев. Температура вентиляции: 26 °C. При плохом освещении культивируют при 5-12 °C. Зимой при малом освещении температуры более 15 °C приводят к деформации листа. Не терпит заморозков.

L 7270 Echeveria peacockii (desmetiana) (штучно)
20 см, серебристо-пурпурный, мясистые сине-белого цвета розетки листьев

Echinacea purpurea (Rudbeckia purpurea) Эхинацея пурпурная

Применение:	многолетник для групп, клумб, горшка, срезки, засушивания, лечебное растение, медонос
Сроки продажи:	не цветущие растения: март-май, сентябрь-октябрь; Цветущие: с июня по сентябрь; срезка: январь-март и июль-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с января по июнь, ранние посевы цветут обильно, но несколько нерегулярно, поэтому рекомендуется вернализация
Проращивание*:	стадия I+II: 20-30 дней при 20 °C стадия III+IV: 16 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность, но не допускают переувлажнения, после появления всходов ставят в прохладу, сокращают влажность субстрата и начинают подкармливать комплексным удобрением из расчета 75-100 мг азота на литр.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения после зимовки имеют лучшее строение, а также более унифицированное цветение. Растения должны иметь минимум 4-5 листьев перед зимовкой. Выгонка за 10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при температуре 10-15 °C.

*Описание стадий смотреть во введении каталога




Echinacea «Насыщенно-розовый» и «Белый»


L 7431 'Примадонна ® насыщенно-розовый' (Primadonna®) (штучно)
80-90 см, большие 12-15 см насыщенно-розовые цветы-«солнышки» с широкими, развернутыми крепкими лепестками, прочные, прямые, красноватые стебли, высокая толерантность к жаре, медонос, VII-IX,

L 7451 'Примадонна® белый' (Primadonna®) (штучно)
70-80 см, чисто белые цветы из плотного венка горизонтально расположенных язычковых лепестков, VII-X,

L 7480 purpurea (в кг)
120 см, красный, VIII-IX,



Echinacea purpurea



Echinops ritro

Echinops ritro
Мордовник обыкновенный, Эхинопс ♃

Применение:	образующий кустарник многолетник-солитер, медонос, на срезку и засушивания
Сроки продажи:	апрель-август; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	как однолетник: январь-апрель; как двулетник: июнь-август
Проращивание:	14-20 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка прижимают и держат в постоянной влажности. Посев не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев понижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка возможна начиная с декабря за 14-16 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 8-15 °C.

L 7520 Echinops ritro (в кг)
150 см, фиолетовый, для отдельной плантации и в смеси, медонос, VII–VIII



Erigeron aurantiacus

Eragrostis abyssinica смотри
Benary · Однолетние декоративные травы
Erigeron Мелколепестник ♃

Применение:	для рабатки, альпинария, как почвопокровник, горшечное растение, медонос
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	E. aurantiacus: январь-март для цветения в июне; E. glaucus: март-апрель для цветения в июне Проращивание: E. aurantiacus: 14-20 дней при 18-24 °C; E. glaucus: 10-14 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Посевы не подвергают воздействию прямого солнечного света.
Температура:	12-18 °C дневная температура и 10-12 °C ночная. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте с зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за 8-10 недель при 12-18 °C. Чем теплее, тем короче период культивирования.

L 8110 Erigeron aurantiacus Эригерон золотистый (в гр)
40 см, медно-оранжевый цветок-«солнышко», культивируется как однолетник. VI–VIII

L 8120 Erigeron glaucus (в гр)
20 см, сине-фиолетовый окрас полумахровых цветов, интересный почвопокровник VII–IX



Erigeron glaucus

Erigeron karvinskianus
Мелколепестник остроконечный ♃

Применение: растение для кашпо, клумб, балкона, рабатки, альпинария, горшка
Сроки продажи: апрель - июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: ноябрь-март
Проращивание: 7 дней при 15-18 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы прижимают, ставят под свет и поддерживают постоянную влажность. Под прямой солнечный свет не ставят.
Температура: 10-15 °C. Через 2 недели после посадки в горшок прохладная фаза (5-10 °C) 6-8 недель для компактного строения растения. После этого снова повышают температуру до 12-15 °C. E. karvinskianus плохо переносит зимовку, но закаленные растения переносят температуры до -4 °C.

L 8140 'Цветущее море'(Bluetenmeer) (в гр) FastraX
20-30 см, белые, с розовым «напылением» и желтой сердцевиной цветки, похожие на маргаритки, обильное цветение, компактный, кустистый рост



Erigeron 'Лазурная фея'

Erigeron speciosus Мелколепестник красивый

Применение: для рабаток, горшков, срезки, медонос
Сроки продажи: май-октябрь, срезка: июнь-август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: март-апрель для высадки с конца мая по июль; в июле-августе для цветения в следующем году
Проращивание: 4-8 дней при 20-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Семена посевов не подвергают воздействию прямого солнечного света.
Температура: 12-18 °C дневная температура и 10-12 °C ночная температура. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте с зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за 7-9 недель при 12-18 °C, чем теплее, тем короче срок культивирования.

L 8180 'Лазурная фея' (Azurfee) (в гр)
50 см, полумахровые лавандовые цветы, VI-VIII, ⚔

L 8190 'Роза Джувель'(Rosa Juwel) (в гр)
70 см, лилово-розовый, VI-VIII, ⚔



Erigeron «Лилово-розовый»



Erigeron 'Цветущее море'



Eryngium planum



Eryngium ‘Супер бум’

Erinus Эринус ♃

Применение:	почвопокровный многолетник для альпийской горки, создания «ковра», горшка
Сроки продажи:	март-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-август
Проращивание:	20-25 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посев слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов температуру понижают до 16-18 °C и снижают влажность субстрата.
Температура:	12-15 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при достаточной защите от холода (укрытие нетканным полотном или мульчей). Для вернализации необходимо 8-10 недель. Выгонка в прохладе за 8-10 недель (с 51 недели) при 10-15 °C или в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

L 8330 alpinus (в гр)
15 см., обильное, фиолетово-красное цветение, необходимо укрывать на зиму, VI-VII

Eryngium Синеголовник ♃

Применение:	групповые посадки, лечебное растение, медонос, E. alpinum: срезка, засушивание
Сроки продажи:	апрель-октябрь; срезка: июнь-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	не цветущие растения: ноябрь-март; цветущие: июль-сентябрь для цветения в июне-июле
Проращивание:	1-2 недели при 18-24 °C; 4-5 недель при 0-5 °C; 1 неделя при 5-10 °C; далее культивируют при 15-18 °C
Условия проращивания:	в прохладе и темноте. Посев присыпают, обильно увлажняют и 1-2 недели семена разбухают в теплой среде, соблюдают приведенную температурную схему. Холодная фаза либо в открытом грунте, либо в прохладном помещении. Используют только свежий посевной материал.
Температура:	15-18 °C. Зимовка в закрытом грунте при темпаретрах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Для управления культивированием на срезку растения в контейнерах можно хранить также при −1 °C в прохладном помещении и получать допол нительные партии срезки в необходимое время. Выгонка при 12-18 °C или в прохладе в открытом грунте. Очень высокие температуры плохо переносятся растением.

L 8660 Eryngium alpinum ‘Супер бум’ (Superbum) (в гр)
80 см, множество голубых со стальным отливом цветов, VI–VIII, ⚔

L 8690 Eryngium bourgatii (в гр)
50 см, голубой со стальным отливом, светлая листва с прожилками, VII–VIII, △

Eryngium planum Синеголовник плосколистный ♃

Применение:	групповые посадки, лечебное растение, медонос, срезка, засушивание
Сроки продажи:	апрель-октябрь; срезка: июль-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	не цветущие растения: ноябрь-март; цветущие: июль-сентябрь для цветения в июне-июле
Проращивание:	14-20 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают субстратом, песком или вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность.
Температура:	15-18 °C. Зимовка в закрытом грунте при темературе не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Для регулирования культивирования на срезку растения в контейнерах можно разместить на хранение при −1 °C в прохладном помещении и получать допол нительные партии срезки в необходимое время. Выгонка в тепле при 12-18 °C или в прохладе в открытом грунте. Очень высокие температуры плохо переносятся растением.

L 8770 Eryngium planum (в гр)
120 см, васильковые, маленькие головки цветов, VII–IX, Bie, ⚔



Erynus alpinus

Erysimum suffruticosum (Cheiranthus suffruticosum, Cheiranthus cheiri, Erysimum cheiri) Лакфиоль полукустарниковый, Лакфиоль полукустарниковый, Желтофиоль садовая, Лакфиоль Шери, Хейрантус ☉


Применение:	горшечное растение и для клумб, создание «ковров»
Сроки времени продажи:	февраль-май
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-март для цветения в мае-июне; август для зимовки в открытом грунте, цветения начиная с марта; сентябрь для морозоустойчивой культуры, цветущей начиная с марта
Проращивание:	6-12 дней при 20-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и уменьшают влажность субстрата. Проростки не переносят переувлажнения.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 16 °C. Культивируют настолько холодно насколько возможно. Холод способствует хорошей ветвистости и равномерному цветению. Зимовка в закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка с 51 календарной недели возможна для E. Suffructicosum в тепле при 12-15 °C или прохладе при 8-10 °C за 10-14 недель. Температуры ниже 8 °C продлевают срок культивирования на 4-6 недель. E. suffructicosum хорошо реагирует на прохладу в утренние часы и перепады температур.

L 8890 'Золотая пыль' (Goldstaub) (в кг)
25 см, золотисто-желтый, вечнозелёный, V–VI, D, ...

Eucalyptus (Eucalyptus divaricata) Эвкалипт Ⓚ

Применение:	редкое растение-солитер пригодно для клумб, горшка, срезки
Сроки продажи:	горшечные растения: круглый год; срезка: круглый год
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март, возможно круглый год
Проращивание:	4-9 дней при 20-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посев прижимают и поддерживают постоянную влажность. Посевы ставят под наиболее сильное возможное освещение, но не под прямой солнечный свет. Большое количество света способствует проращиванию. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и снижают влажность субстрата.
Температура:	16-18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. В период роста не ниже 12 °C. Зимовка возможна при 3-5 °C. Переносит температуры до–15 °C.

L 9300 gunii 'Серебряные капли' (Silbertropfen) (в гр)
50 см, с круглым, серебристо-серым лиственным покровом, светло-рыжая кора, вечнозеленый, ⚔



Eucalyptus 'Серебряные капли'

Euphorbia marginata Молочай окаймленный ☉

Применение:	групповое растение и на срезку
Сроки продажи:	срезка: апрель-май и август-декабрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в теплицу: февраль-июль для цветения в мае-сентябре; июль-октябрь для цветения в октябре-декабре; в открытый грунт: апрель-май для цветения в июле-августе
Проращивание:	10-14 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держать в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C и снижают влажность в субстрате.
Температура:	15-18 °C. Не переносит заморозков.

L 9560 'Горный снег' (Bergschnee) (в кг)
110 см, белый, в крапинку процветный лист, VIII-X, ⚔

L 9600 'Ледяные сосульки' (Eiszapfen) (в кг)
75 см, длинные стебли, крупные прицветные листья, окраска ранняя и равномерно белая, хорошая зелёная срезка, ⚔



Erysimum 'Золотая пыль'

Euphorbia ' Ледяные сосульки'



Euphorbia polychrome



Exacum ‘Синий малыш’



Euphorbia myrsinites



Exacum ‘Белый малыш’

Euphorbia myrsinites Молочай миртолистный ♃

Применение: многолетник для альпинария, декоративнолиственное растение, экстенсивное озеленение
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-май для нецветущих растений; июнь-август для цветения в апреле-мае
Проращивание: 7-14 дней при 21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Семена прижимают и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C. Семена посевов не подвергают воздействию прямого солнечного света. При неравномерных всходах семена помещают на 4-5 недель в условия 0-5 °C (прохладное помещение), далее культивируют 1 неделю при 5-12 °C и затем при 15-22 °C. Посевной материал не подлежит хранению. Чем старее семена, тем сильнее они нуждаются в срочной криотерапии.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка при температуре 12-15 °C. Для хорошего роста и разветвления необходимы температуры выше 10 °C.

L 9690 Euphorbia myrsinites (в кг)
15-20 см, желто-зелёное цветение, мясистые, сине-зеленые листья, несколько свисающие и почти прямые ветви, привлекательное декоративнолиственное вечнозелёное растение, V–VI, ☌



Euphorbia myrsinites

Euphorbia polychroma (E. epithymoides) Молочай многоцветный ♃

Применение: подобный кустарнику многолетник для альпийской горки, горшка, срезки, экстенсивного озеленения
Сроки продажи: май-октябрь; срезка: январь-июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-май для не цветущих растений; июнь-август для цветения в апреле-мае
Проращивание: 1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C 1 неделю при 5-10 °C далее культивируют при 12-15 °C в прохладе и темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом, увлажняют и культивируют по температурной схеме. Холодную фазу осуществляют либо в ящиках в открытом грунте, либо в неотапливаемой теплице. После появления первых листьев по возможности культивируют при большем освещении. Всходы не подвергают воздействию прямого солнечного света. Посевной материал не хранят, используют только свежий. Возможны неравномерные всходы.
Условия проращивания:
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка при температуре 12-15 °C. Для хорошего роста и ветвления необходимы температуры выше 10 °C.

L 9710 Euphorbia polychroma (в кг)
40 см, большие, золотистые прицветные листья, очень оригинальная осенняя окраска, IV–V, ☌ ⚔

Exacum affine Экзакум родственный ☉

Применение: горшечное растение для украшения хорошо освещенных окон, для балкона, создания «ковров»
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-май, отдельными партиями
Проращивание: 8-12 дней при 21-23 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают против серой плесени (ботритис). Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. Посевам ни в коем случае не дают пересыхать и защищают от прямого солнечного света. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C.
Температура: 18-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимой ночные температуры могут опускаться до 15-16 °C. Рост приостанавливается при 10 °C.

L 9970 ‘Синий малыш’ (Zwerg Blau) (в гр)
15 см, лиловые цветки, компактный, шарообразный рост, VII-IX

L 9990 ‘Белый малыш’ (Zwerg Weiss) (в гр)
15 см, белые цветки, обильное цветение, шарообразный, сильно ветвистый рост, прекрасное растение

Festuca amethystina смотри Многолетние декоративные травы

Festuca glauca смотри Многолетние декоративные травы

Festuca valesiaca смотри Многолетние декоративные травы

Fragaria vesca смотри Корнеплоды и овощи

Gaillardia x grandiflora (G. aristata)
Гайлардия остистая ♃

Применение:	многолетник для групп, вазонов и срезки, с хорошим ростом, медонос
Сроки продажи:	июнь-октябрь; срезка: июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	'Сияние факела' и 'Гном': январь-март для нецветущего товара летом 'Сияние факела' и 'Гном': июль-август для цветущего на следующий год товара 'Солнце Аризоны': январь-февраль для цветения в мае-июне 'Солнце Аризоны': с середины апреля посев в открытый грунт для цветения в июле
Проращивание:	10-14 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена прижимают, поддерживают постоянную влажность и на свету, но избегают прямого солнечного света. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и культивируют более сухо. Всходы не переносят переувлажнения.
Температура:	12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Зимовка в закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном. Для вернализации требуется прохладная фаза минимум 10-15 недель. Выгонка за 7-8 недель в тепле при 18-20 °C дневной температуры и 16-18 °C ночной температуры. Чем в более теплых условиях культивируется растение, тем короче сам период культивирования. Растение перед зимовкой должно быть хорошо укоренено и должно иметь примерно 16 листьев. Растения перед продажей закаливают при 12-16 °C.

M 3520 ArizonaSun 'Солнце Аризоны' (штучно) FastraX
30 см, простой в выращивании, не требующий вернализации многолетник, подходит для солнечных, жарких мест. 'Солнце Аризоны' засверкает желто-красными цветами величиной 10 см. Сорт цветет раньше и дольше чем другие Гайлардии. Ее прекрасная садовая пригодность и унифицированность формы и роста отмечались в США на ALL AMERICA SELECTIONS и в Европе ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ FLEUROSELECT. V-IX

M 3420 'Сияние факела' (Fackelschein) (в кг)
75 см, пылающие, темно-красные цветки (10 см в диаметре) с широким желтым кружевом. Очень обильное цветение, ⚔

M 3490 'Гном' (Kobold) (Benary) (в кг)
35 см, желтый с красным, шарообразные кусты, ⁞ △

M 3690 'Смесь' (Mix) (в кг)
80 см, красная, желтая с красным, ржаво-красная окраска, VI-X, ⚔

Galium odoratum смотри
Benary · Пряные травы


Ассортимент FastraX


'Сияние факела'


'Гном'


Gaillardia
'Солнце Аризоны'



'Маленькая звёздочка ® мандариновый'



'Маленькая звёздочка ® желтый'



'Маленькая звёздочка ® белый'



'Талант ® желтый'



'Талант ® оранжевый'



'Талант ® смесь'

'Талант ® розовые тона'



'Талант ® красные тона'



'Талант ® белый'



Gazania rigens Газания жестковатая ⊙

Применение:	растение для групп, балконных ящиков, смешанных вазонов
Сроки продажи:	с середины апреля по конец июня
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	ноябрь-декабрь для цветения начиная с апреля; январь-март для цветения начиная с июня
Проращивание *:	стадия I: 10-12 дней при 21 °C Стадия II: 7-10 дней при 21 °C Стадия III+IV: 14-21 день при 15-18 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом. Поддерживают постоянную влажность. Молодые проростки не должны пересыхать, но необходимо избегать переувлажнения.
Температура:	12-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Культивирование в сильной прохладе затягивает период выращивания. Gazania не переносит заморозков.

*Описание стадий смотреть во введении каталога

'Маленькая звёздочка'® (Mini Star®) (Benary) (штучно)

20 см, богатое цветение, короткие стебли цветков собраны компактно, зеленый лиственный покров, лучшая и самая стойкая Газания для открытого грунта, с интенсивным окрасом цветов, каждый из которых очень долго цветёт. 'Маленькая звездочка® белый ' имеет чуть кремовый окрас. Темные штрихи создают привлекательное кольцо вокруг сердцевины. 'Маленькая звездочка ® смесь' состоит из белых, желтых, оранжевых, бронзовых, темно-красных и розовых окрасок.

M 3950 'Маленькая звёздочка ® желтый', солнечно-желтый

M 3910 'Маленькая звёздочка ® мандариновый', элегантные, светло-оранжевые цветы

M 3990 'Маленькая звёздочка ® белый' белый с темными пятнами у сердцевины. Чуть кремовый оттенок создаёт прекрасное цветовое сочетание.

M 4040 'Маленькая звёздочка ® смесь' уравновешенная игра красок: от белого до желтого, от оранжевого до розового и интенсивные коричневато-красные тона.

'Талант'® (Talent®) (Benary) (штучно)

20 см, компактные, изысканные растения с неповторимой очень привлекательной, серебристо-белой листвой, светящиеся цветы величиной 8 см сортов 'Талант'® образуют привлекательный контраст с необычным окрасом лиственного покрова, серия отличается ранним распусканием цветов и их длительным цветением.

M 4170 'Талант ® желтый' величиной 6 см цветы-маргаритки с ярко окрашенными нижними сторонами лепестков.

M 4090 'Талант ® оранжевый'

M 4110 'Талант ® розовые тона' интенсивно окрашены в розовый цвет

M 4120 'Талант ® красные тона', неповторимая игра красного цвета

M 4130 'Талант ® белый'

M 4180 'Талант ® смесь' из оттенков белого, желтого, оранжевого и от розового до коричневого цвета.

Gazania

M 4150 'Обильно цветущая прекрасная' (в гр)
30 см, в белом, кремовом, желтом, оранжевом и коричневато-красном цвете

Gazania 'Рассвет' (Daybreak), F_1-гибрид

M 4210 'Рассвет красные штрихи' (Daybreak Red Stripe) (штучно)
30 см, желтый с красными штрихами-лентами

Gentiana Горечавка ♃


Применение: многолетник для альпийской горки
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: не цветущие растения: декабрь-март, цветущие: июнь-июль
Проращивание: 1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C 1 неделю при 5-12 °C далее культивируют при 12-15 °C
Условия проращивания: в прохладе. Субстрат перед посевом обрабатывают против грибковых заболеваний фунгицидами. Семена слегка присыпают вермикулитом, песком или субстратом, поддерживают постоянную влажность, выращивают согласно приведенной температурной схеме. Холодная фаза либо в ящиках в открытом грунте (защищать от мышей), либо в не отапливаемой теплице. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура: 15-18 °C или открытый грунт. Зимовка в закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка при 10-15 °C. Раннее культивирование возможно примерно за 4 недели. Чем выше температуры культивирования, тем более "рыхлым" будет растение, поэтому обеспечивают максимально возможную прохладу.

M 4240 Gentiana acaulis (Kochiana) (в гр)
10 см, темно-синяя альпийская горечавка, V–VI, △ ▽ ⎓

Gentiana septemfida lagodechiana (Gentiana lagodechiana) Горечавка семираздельная лагодехская ♃

Применение: для могил и альпийской горки, срезки
Сроки продажи: май-октябрь, срезка: июль-август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-март для не цветущего товара; июнь-июль для цветения в следующем году
Проращивание: 1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C 1 неделю при 5-12 °C далее культивируют при 12-15 °C
Условия проращивания: в прохладе. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами против грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом, песком или субстратом, поддерживают постоянную влажность согласно приведенной температурной схеме. Холодная фаза либо в ящиках в открытом грунте (защищать от мышей), либо в не отапливаемой теплице. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура: 15-18 °C или открытый грунт. Зимовка в закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка при 10-15 °C. Ранее культивирование возможно в пленочном парнике примерно от 4 недель. Чем выше температуры культивирования, тем более "рыхлым" будет растение, поэтому обеспечивают максимально возможную прохладу.

M 4380 Gentiana septemfida lagodechiana (в гр)
25 см, темно-синий с белым горлышком, VII–IX , ⚔



Gazania F_1 'Рассвет красные штрихи'



Gentiana acaulis



Gentiana septemfida lagodechiana



Geranium ‘Взгляд ® фиолетовый’



Geranium ‘Взгляд ® светло-розовый’

Geranium sanguineum Герань кроваво-красная 2

Применение:	почвопокровник, для альпинария, рокария, экстенсивного озеленения, посадки в вазоны, медонос
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-SEED
Срок посева:	апрель-май для нецветущего товара; в июне-августе для цветения в следующем году
Проращивание:	10-14 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Субстрат заранее обрабатывают фунгицидами. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Посевной материал хранят при температуре 5 °C. Используют только свежий посевной материал.
Температура:	12-20 °C. Зимовка в закрытом грунте при температуре не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном. Для вернализации требуется прохладная фаза минимум 15 недель. Выгонка за 6-8 недель при 16-20 °C дневной температуры и 14-18 °C ночной. Чем теплее условия выгонки, тем короче срок культивирования, и тем более интенсивное освещение необходимо. Выращивание при коротком световом дне рекомендуется только в сочетании с низкими температурами (12-15 °C), так как иначе растения не имеют компактной структуры. Растения перед продажей закаливают при 12-15 °C.

Взгляд® (Vision®) (штучно)

25-40 см, прочный почвопокровник с устойчивым цветением с мая по август, цветки величиной 3 см, прекрасный контраст с насыщенно-зеленой листвой, которая осенью принимает прекрасную красную окраску, растение образует раскидистые, забивающие сорняк «ковры» независимо от освещенности места произрастания.


M 4601	‘Взгляд ® светло-розовый’ подобно перламутру, сверкающие цветы с красными прожилками, несколько компактнее чем ‘Взгляд ® фиолетовый’
M 4601C	‘Взгляд ® светло-розовый’ Benary ApeX SEED Для более быстрого проращивания и высокой всхожести. На 30% больше выход рассады.
M 4631	‘Взгляд ® фиолетовый’, пурпурный, V-VII
M 4631C	‘Взгляд ® фиолетовый’ Benary ApeX SEED Для более быстрого проращивания и высокой всхожести. На 30% больше выход рассады.



Geranium Взгляд® простой (л.) и ApeX посевной материал (п.)



Geranium Взгляд® простой (л.) и ApeX посевной материал с дополнительной оболочкой (п.)



Geranium ‘Взгляд ® светло-розовый’

Geum coccineum Гравилат ярко-красный ♃

Применение: цветущий многолетник для горшка, клумбы, рабатки и контейнера
Сроки продажи: май-август
Форма посевного материала: очищенные семена и семена в оболочке, ApeX
Срок посева: февраль-май для цветения начиная с мая; в июне-августе для цветения в следующем году
Проращивание: 20-30 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами. Посевы присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. При появлении первых листьев сокращают влажность и ставят посевы под свет.
Температура: 12-18 °C или открытый грунт. Вернализация необязательна для цветения. Однако, на второй год, после вернализации на растениях образуется больше цветоносов. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка при 12-15 °C.

M 4991 'Печенье' (Cooky) (штучно) FastraX
30 см высокий многолетник для горшка с унифицированным развитием и компактным ростом. Несколько прямых стеблей с крупными цветами (4 см) ярко-оранжевого окраса и плотная подушка из блестящей, круглой листвы.

M 4991C 'Печенье' (Cooky) (штучно) FastraX Benary ApeX Seed
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и высокой всхожести, на 20% больше молодых растений.



Geum 'Печенье'

Geum hybridum Гравилат гибридный ♃

Применение: цветущий многолетник для горшка, клумб и контейнера, срезки, медонос
Сроки продажи: март-октябрь; срезка: май-август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль-май для не цветущего товара; 'Огненный шар': февраль-май для цветения в мае-августе и июль-август для цветения в следующем году; 'Золотой шар': июль-август для цветения в следующем году
Проращивание: 20-30 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами. Посев слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. С появлением первых листьев сокращают влажность в субстрате и ставят посевы под свет.
Температура: 12-18 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 20 °C. Вернализация необходима для цветения сорта 'Золотой шар' и способствует обширному и унифицированному цветению сорта 'Огненный шар'. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 3-5 °C или в открытом грунте с достаточной зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за 8-10 недель при 10-18 °C. Чем более теплые условия культивирования, тем короче его время. При очень раннем выращивании в тепле (с 51 календарной недели) нуждаются в ассимиляционном досвечивании.

M 4940 'Огненный шар' (Feuerball) (в гр)
60 см, обильное цветение махровых, багровых цветков, VI–VIII, ⊙ ⚔

M 4950 'Золотой шар' (Goldball) (в гр)
60 см, обильное цветение махровых, золотистых цветков, VI–VIII, ⊙ ⚔



Geum 'Огненный шар' и 'Золотой шар'



«Искусство науки» - Презентация ApeX в 2005, Ганн-Мюнден



Gomphrena ‘Пурпурный’



‘Тёмно-розовый’



Лавандовый’





‘Приятель розовый’



‘Приятель белый’

Gomphrena ‘Приятель пурпурный’



Gypsophila ‘Белый’



Gypsophila ‘Розовый’

Gomphrena Гомфрена ⊙ ⚔

Применение: растение для рабаток, горшка, срезки, засушивания
Сроки продажи: горшечное и почвопокровное растение: май-июнь; срезка: май-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-июнь, посев отдельными партиями
Проращивание: 10-14 дней при 22-24 °C, G. haageana примерно на 5 дней дольше
Условия проращивания: подсвечивать. Посев слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной сильной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность. Избегают прямого солнечного света во время проращивания.
Температура: 20-24 °C дневная температура и 15 °C ночная температура. Избегают температуры ниже 10 °C. Защищают от поздних заморозков.

Gomphrena globosa (в гр)

30 см, для посадок на рабатках, получения высококачественной свежей срезки, так и для засушивания. ⚔

M 6330 ‘Тёмно-розовый’
M 6300 ‘Лавандовый’
M 6220 ‘Пурпурный’
M 6230 ‘Белый’

Gomphrena globosa ‘Приятель’ (Buddy) (в гр)

15 см, компактные, шарообразные кусты, VII–IX,

M 6200 ‘Приятель пурпурный’
M 6160 ‘Приятель розовый’
M 6170 ‘Приятель белый’

Gomphrena haageana (в гр)

40 см, обильное цветение, длинные стебли, головки цветков так же вытянуты как у G. globosa. Очень быстрый рост. Идеальная свежая срезка и как сухоцвет. ⚔

M 6290 ‘Светящаяся искра’ (Leuchtfunk)

Gypsophila repens Гипсофила ползучая, Качим ♃

Применение: многолетник для альпийской горки, рокария, экстенсивного озеленения, медонос
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль-март для цветения в мае-июне; март-май для цветения в августе-сентябре; июнь июль для цветения в следующем году
Проращивание: 5-10 дней при 21-26 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка прижимают и поддерживают постоянную влажность. Не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев опускают температуру до18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. G. repens не терпит переувлажнения.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 7-8 недель в тепле при 15-18 °C или прохладе при 7-12 °C. Чем прохладнее культивируется, тем компактнее и красивее получается строение растения.

M 7810 ‘Розовый’ (в кг) FastraX
15 см, светло-розовый, стелящийся рост, VI-IX, △

M 7720 ‘Белый’ (в кг) FastraX
15 см, для групп между камней, стелящийся рост, VI-IX,

Helenium autumnale (Helenium grandiflorum) Гелениум осенний ♃

Применение:	многолетник-солитер для рабаток, контейнера, срезки, медонос
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала:	семена в оболочке
Срок посева:	февраль-июнь, возможно круглый год
Проращивание:	8-12 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Семена посевов не подвергают воздействию прямого солнечного света.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для производства цветущих растений для контейнера за счёт низких температур (10-13 °C) можно получить растения с более короткими стеблями, так что нет необходимости в применении регуляторов роста, но период культивирования удлиняется приблизительно на 1-3 недели. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном. Выгонка за 12-14 недель при 15-18 °C.



Helenium ‘Елена смесь’

‘Елена’ (Helena) (Benary) (штучно) FastraX

120 см, 2 отдельные окраски позволяют создать тоновый букет без дорогостоящего разделения выращенного материала. Бесчисленное количество светящихся цветов на хорошо разветвленных, прямых стеблях, легко выращивать, хорошее прочное качество срезки, может расти на хорошо освещаемом солнцем месте. Культивируется как однолетник. ♃ ⚔

N 0021C	‘Елена золотой’
N 0041C	‘Елена красные тона’
N 0051C	‘Елена смесь’ богатый цветной спектр красных, желтых и бронзовых тонов.



‘Елена золотой’



‘Елена красные тона’

Helianthemum nummularium (Helianthemum chamaecistus) Солнцецвет монетолистный ♃

Применение:	многолетник для альпинария, песчаных садов-степей, экстенсивного озеленения, медонос
Сроки продажи:	март-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-май для не цветущего товара; июль-август для цветения в следующем году
Проращивание:	5-14 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов медленно понижают температуру до 16-18 °C и культивируют при пониженной влажности.
Температура:	10-18 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 3-5°C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка в тепле за 10-12 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Лучший рост достигается при колебании температур. Ночи должны быть по возможности более прохладными, а дни более теплыми.

N 0250 ‘Мутабиле’ (Mutabile) (в кг)
30 см, прекрасная смесь красок от белого и розового до красных оттенков, вечнозелёный, VI–VII, D



Helianthemum ‘Мутабиле’



- Самоопыляемый F_1 Подсолнечник для горшка ('Солита' F_1)
- Трио 'Пачино'® с идеально ветвистым ростом и тонким, соразмерным лиственным покровом
- Длительный период продажи, устойчивое цветение
- Разнообразные возможности для использования

Helianthus annuus карликовый подсолнечник для горки и клумб ⊙

Применение: для горшка и посадки на клумбе
Сроки продажи: июнь-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена и семена в оболочке (‘Солита’ и ‘Пачино’®)
Срок посева: с марта и до конца июня, посев отдельных партий
Проращивание*: стадия I: 5-10 дней при 21-24 °C
Стадия II: 5-8 дней при 18-20 °C
Стадия III+IV: 7-14 дней при 15-17 °C
Условия проращивания: в темноте. Высеянные семена присыпают землей, песком или вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате. Температуры ниже 12 °C удлиняют период получения всходов, снижают их качество, а также вызывают пожелтение края листа (недостаток Fe). Затемнение (световой день менее 13 часов) ведёт к компактному и равномерному ветвлению, унифицирует и предотвращает преждевременное цветение. При плохом освещении, в условиях короткого светового дня, необходима дополнительная подсветка ассимиляционными лампами. Так как Helianthus нуждаются в соответствии получаемого света и тепла для развития цветов.
Температура: 15-18 °C. Ниже 12 °C не культивируют.

*Описание стадий смотреть в введении каталога

N 0790 ‘Широкая улыбка’ (Big Smile) (в кг)
35 см, золотистые с темным диском цветы, по одному на стебел,

N 0810 ‘Капля солнца’ (Sunspot) (в кг)
40 см, золотистый, желтая середина цветка, диаметром до 15 см, величина цветов зависит от размера горшка. Не ветвистый рост,

N 0620 ‘Медвежонок’ (Teddybaer)(Dwarf Sungold) (в кг)
40 см, низкорослый, с махровыми, золотистыми цветами, групповое растение, слегка ветвистый рост, возможно появление нескольких не махровых цветков,

‘Пачино’® (Pacino®)-серия (Benary) (штучно)

30-40 см, отличный подсолнечник для горшка с мелкой, гладкой листвой. Все ‘Пачино’® отлично гармонируют по высоте относительно объема лиственного покрова и цветов. ‘Пачино® лимон ‘ и ‘Пачино® кола ‘ имеют более короткий срок культивирования и цветут на 7-10 дней раньше, чем известный ‘Пачино ® золотой’. Все ‘Пачино’® имеют длинное цветение и сильно ветвистый рост.

N 0840 ‘Пачино ® кола’
FLEUROSELECT QUALITY
золотисто-желтые лепестки и темная сердцевина

N 0830 ‘Пачино ® золотой’
золотисто-желтые лепестки и зеленая сердцевина

N 0850 ‘Пачино ® лимон’
лимонно-желтые лепестки и зеленая сердцевина

N 0861 ‘Пачино ® смесь’
смесь из вышеперечисленных окрасок

Посевной материал в оболочке:

Покрытые синей оболочкой (Thiram Metalaxyl) семена. Износостойкий и не пыльный. Широкий спектр преимуществ, в частности, против грибковых заболеваний. Особенно удобен для начинающих производителей.

N 0840C ‘Пачино ® кола’
FLEUROSELECT QUALITY

N 0830C ‘Пачино ® золотой’
N 0850C Пачино ® лимон’
N 0861C ‘Пачино ® смесь’





‘Широкая улыбка’

Helianthus ‘Медвежонок’



‘Капля солнца’



Helianthus ‘Пачино ® смесь’



‘Пачино ® лимон’



‘Пачино ® золотой’



Helianthus ‘Пачино ® кола’
FLEUROSELECT QUALITY



Helianthus F_1 'Solita'

Helianthus annuus F_1-гибриды карликовый подсолнечник для горок и клумб ⊙

N 0910 'Солита' (Solita) (штучно)
40 см, самоопыляемые цветки величиной 15-20 см из плотного, золотистого венка лепестков и зеленой сердцевины. Цветёт несколько раньше, чем 'Пачино ® золотой'

N 0910C 'Солита' (Solita) (штучно)
Покрытый Metalaxyl-Thiram посевной материал

Helianthus annuus карликовый подсолнечник на срезку ⊙

Применение:	посадка на клумбе и срезка
Сроки продажи:	срезка с июля по ноябрь при выращивании в теплице можно и раньше
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена с оболочкой против болезней ('Соня', ® 'Сорайя')
Срок посева:	открытый грунт: с середины апреля по июль, дополнительные партии не высеваются позже, теплица: с марта по август
Проращивание*:	теплица: стадия I: 7-10 дней при 21-24 °C Стадия II: 5-8 дней при 18-20 °C Стадия III+IV: 7-14 дней при 15-17 °C
Открытый грунт:	10-15 дней примерно при 15 °C
Условия проращивания:	в темнотег. Открытый грунт: посев на глубину 3-4 см, чтобы предотвратить склёвывание птицами и поедание улитками. Теплица: посевы присыпают землей, песком или вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате. Затемнение (световой день менее 13 часов) ведёт к компактному и равномерному ветвлению, унифицирует и предотвращает преждевременное цветение. При плохом освещении, тем не менее, сразу после посева, при соблюдении короткого светового дня, необходим дополнительный ассимиляционный свет. Так как Helianthus нуждаются в соответствии получаемого света и тепла для развития цветов. Температура ниже 12 °C ведут к замедленному и низкокачественному проращиванию, а также к пожелтению края листа (недостаток Fe).
Температура:	открытый грунт: возможно выращивание с середины апреля; теплица: 15-18 °C, но не ниже 12 °C

* Описание стадий смотреть в введении каталога



Helianthus 'Флоренца'



'Осенняя краса'



'Высокое золотое солнце'

Высокорослые подсолнечники

N 0680 'Осенняя краса' (Herbstschoenheit) (в кг)
200 см, среднерослая смесь окрасок от желтых и бронзовых до темно-красных тонов. Цветы средней величины, ⊙ ⚔

Махровые подсолнечники

N 0560 'Высокое золотое солнце' (Hohe Sonnengold) (в кг)
150 см, один побег, может получиться 10-15% простых и полумахровых цветков, ⊙ ⚔

Среднерослые сорта (в кг)

N 0900 'Флоренца' (Florenza) (Benary)
120 см, светло-желтые заостренные лепестки образуют привлекательный контраст с ярким, красно-коричневым кольцом, цветки величиной 12 см, маленькая листва и разветвленный рост, стебли на срезку длиной 50 см, ⊙ ⚔

N 0870 'Флористан'® (Floristan®) (Benary)
100 см, мощные боковые побеги на срезку, темный диск и красно-коричневые лепестки с желтым кружевом, ⊙ ⚔

N 0820 'Праздник'® (Holiday®) (Benary)
120 см, округлые кустики с многочисленными не ветвистыми боковыми стеблями длиной примерно 100 см, средние почки удаляют. Цветы от 15 см в диаметре, золотистые с темным диском, идеальный подсолнечник на срезку, ⊙ ⚔



'Праздник'®

Helianthus 'Флористан'®





Helianthus
'Огненное кольцо'



'Икарус'



'Золотой букет'®

Среднерослые сорта (в кг)

N 0540
'Икарус' (Ikarus) (Benary)
120 см, цветы 10-12 см ø, с лимонно-желтыми лепестками и темной сердцевиной. Неповторимый рост, ветвление от основного побега, ⊙ ⚔

N 0880
'Огненное кольцо' (Ring of Fire) (Benary)
120 см, пламенные золотистые и красно-коричневые лепестки образуют оживленное неявно очерченное кольцо темного тона у сердцевины цветка (13-15 см ø). Ветвящееся растение с длинными боковыми побегами, для срезки и клумб, ⊙ ⚔

N 0700
'Золотой букет'® (Schnittgold®) (Benary)
150 см, тонкий, золотистый венок с насыщенно-черным диском, один побег, ⊙ ⚔

N 0580
'Соня'® (Sonja®) (Benary)
100 см, золотисто-оранжевые цветы от 9 см ø, на длинных 60-80 см, не ветвистых боковых побегах. Высокие результаты и хорошее качество – отличительные признаки этого идеального для срезки сорта, ⊙ ⚔

N 0580C
'Соня'® (Sonja®) (Benary)
Посевной материал обработан покрытием из Thiram + Metalaxyl, а так же окрашен в синий цвет. Износостойкий и не пыльный. Широкий спектр действия, в частности, против грибковых заболеваний, ⊙ ⚔

N 0600
'Сорайя' (Soraya) (Benary)
180 см, старшая сестра сорта 'Соня'®, ветвящееся растение, золотисто-оранжевые цветы величиной 12-15 см с темной сердцевиной, идеальный сорт для срезки, ⊙ ⚔

N 0600C
'Сорайя' (Soraya) (Benary)
Посевной материал обработан покрытием из Thiram + Metalaxyl, а так же окрашен в синий цвет. Износостойкий и не пыльный. Широкий спектр действия, в частности, против грибковых заболеваний, ⊙ ⚔



'Соня'®



'Соня'®

'Сорайя'

www.Benary.de

Среднерослые сорта (в кг)

N 0610 'Богатство солнца лимонный' (Sunrich Lemon)
F_1 -гибрид, 80-120 см, самоопыляющийся, светло-желтый с темным диском, цветы средней величины, не ветвистый рост, не поворачивается в течение дня, ⊙ ⚔

N 0630 'Богатство солнца апельсиновый' (Sunrich Orange)
$F1_1$–гибрид, 80-120 см, самоопыляющийся, оранжевый партнер к сорту 'Богатство солнца лимонный', не поворачивается в течение дня, ⊙ ⚔

N 0530 'Валентин'® (Valentin®) (Benary)
150 см, ранний, серно-желтый с черной сердцевиной, диаметр цветов: 12-15 см, хорошо разветвленный рост, эффектный контраст. Хорошее качество срезки, ⊙ ⚔

Низкорослые подсолнечники

N 0780 'Музыкальная шкатулка' (Musicbox) (Benary) в кг)
75 см, смесь из светло-желтого, золотистого и коричневого оттенков. Цветы средней величины при невысокой высоте растения, ⊙ ⚔



Helianthus 'Валентин'®



'Богатство солнца апельсиновый' (л.) и 'Лимонный' (п.)



'Музыкальная шкатулка'

'Огненное кольцо'



Helianthus annuus
ассортимент растений

Особенности возделывания от Benary

Большое количество ассимиляционного света, особенно во время плохого естественного освещения, требуется для хорошего качества роста. Однако, создают затемнение, короткий световой день (не более 13 часов до того, как бутоны набрали цвет). Короткий световой день способствует компактному росту, унифицирует развитие цветов и предотвращает их преждевременное цветение.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0



Helichrysum ‘Бикини ® золотистый’



Helichrysum ‘Бикини ® хот’

Helichrysum bracteatum (Bracteantha bracteata) Гелихризум (цмин, бессмертник) прицветниковый ⊙

Применение:	Для клумб, вазонов, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	с середины апреля до августа
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с середины февраля по май для цветения с апреля по июль; с начала июля для цветения начиная с сентября
Проращивание:	7-10 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев опускают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность. Удобряют по 50 мг азота на литр комплексного сбалансированного удобрения. В течение первых 4 недель всходы очень чувствительны к высокой концентрации соли.
Температура:	16-18 °C. Температуру после укоренения опускают до 13-16 °C, чтобы получить качественное образование цветков и их развитие. Чем ниже температура культивирования, тем компактнее и аккуратнее будет строение растения, но, время культивирования удлинится приблизительно на 1-2 недели. Горшечные растения закаливают перед ранней продажей при 10-12 °C.

‘Бикини’® (Bikini®) (Benary) (в кг) Карликовый гелихризум

30 см, наиболее низкорослые сорта, шарообразные кусты, очень богатое цветение, светящиеся краски. Идеально для цветников, рабаток, альпинария.

N 1390	‘Бикини ® кримсон’, тёмно-красный
N 1430	‘Бикини ® золотистый’, светящийся желтый
N 1450	‘Бикини ® хот’, огненно-красный
N 1500	‘Бикини ® розовый’
N 1510	‘Бикини ® белый’
N 1550	‘Бикини ® смесь серии’ контрастная смесь серии из вышеперечисленных и дополнительных окрасок



Helichrysum ‘Бикини ® смесь серии’

Heliopsis scabra
(Heliopsis helianthoides var. scabra)
Гелиопсис шероховатый ♃

Применение:	многолетник-солитер, для рабаток, контейнера, срезки, медонос
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-март для цветения начиная с июля
Проращивание:	8-10 дней при 20-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посев слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность. Семена посевов не подвергают воздействию прямого солнечного света.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температуры ниже 13 °C в течение длительного срока могут привести к пожелтению листьев. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном. Выгонка за 8-10 недель при 15-18 °C.

N 2350 'Летнее солнце' (Sommersonne) (в кг) FastraX
120 см, яркий золотистый окрас, богатое и длительное цветение густомахровыми цветками, VII–X



Heliopsis 'Летнее солнце'



Heliotropium 'Mope'

Heliotropium arborescens
(Heliotropium peruvianum)
Гелиотроп древовидный ⊙

Применение:	балконные ящики, вазоны, как летнее горшечное растение, как маленький кустарник, для групповых посадок, как солитер, для клумб
Сроки продажи:	с середины апреля по август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения в апреле-июне; май-июнь для цветения в июле-августе
Проращивание:	5-10 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. Избегают прямого солнечного света. После развития первых листьев опускают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и удобряют 75 мг азота на литр комплексного сбалансированного удобрения.
Температура:	16-18 °C. При хорошем (ассимиляционном) освещении возможны более высокие температуры без потерь качества растений. Более высокие температуры сокращают время культивирования, но при этом, возможно, будет необходимо использование регуляторов роста. Растения выдерживают температуры ниже 10 C, но непродолжительное время, при этом замедляется рост и проявляются симптомы, указывающие на снижение потребления железа. Растения перед продажей закаливают при 12-15 °C.

N 2750 'Mope' (Marine) (Benary) (в гр)
50 см, специальный сорт Benary с унифицированным низким ростом, крупные темно-синие колокольчики, ценный тёмнолиственный сорт для групп, аромат похож на запах ванили, VII–X, D, Bie, ○



Helleborus niger

Helleborus niger Морозник черный ♃

Применение:	многолетник для альпинария, лечебное растение, зимняя срезка
Сроки продажи:	в горшке: март-апрель и август-октябрь; цветущее растение: октябрь-март; срезка: ноябрь-март
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	ноябрь-март для не цветущего товара; июнь-июль для цветения в декабре-феврале
Проращивание:	6-7 недель при 18-22 °C; 6-8 недель при 0-5 °C; 1 неделя при 5-10 °C; Далее культивируют при 10-15 °C
Условия проращивания:	в прохладе и темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом, постоянно увлажняют и культивируют по указанной температурной схеме. Холодную фазу проводят либо в ящике в открытом грунте, либо в не отапливаемой теплице. Колебание температур при прохладной фазе ускоряет процесс проращивания. Посевы ни в коем случае не должны пересыхать.
Температура:	10-13 °C. Температура вентиляции: с 15 °C. Зимовка возможна при 0-3 °C или в открытом грунте. Для вернализации Helleborus нуждается в прохладной фазе от 3-5 недель при 3-5 °C. Для цветения в ноябре-декабре: температуру снижают на 3-6 недель до 0-5 °C с конца сентября. Начиная с ноября повышают температуру до 6-8 °C или 8-12 °C. В основном цветы могут появляться через 2-4 недели после охлаждения. Возможно выращивание к определённому сроку (Рождество) температуру повышают до 15-18 °C, но стебли цветов будут слабее, а сами цветы меньше.

N 3350 Helleborus niger (в кг)
35 см, белый или красноватый, XII–III, T




Hemerocallis
'Новинка -
смесь'



Heuchera
'Брессингем гибрид'



Heuchera
'Рубиновые колокола'



Hemerocallis-Hybriden Лилейник гибридный ♃

Применение:	растение для контейнера, клумбы, срезки
Сроки продажи:	готовая к высадке рассада: март-октябрь; цветущие растения: апрель-август; срезка: апрель-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель
Проращивание:	20-30 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком, или субстратом и поддерживают постоянную влажность. Высокая относительная влажность воздуха (> 95%) необходима во время проращивания. После появления первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность воздуха и влажность субстрата. Культивируют при максимально возможном освещении. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте с зимней защитой. Выгонка в теплых условиях при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Раннее выращивание возможно в открытом грунте при укрытии пленкой или в пленочном парнике. Молодые растения лилейника более восприимчивы к заморозкам. Лилейник устойчив к жаре.

N 3510 'Миниатюрный гибрид' (Miniatur Hybriden) (в гр)
60 см, многочисленные цветы на прочных стеблях. Оригинальный цветок на срезку с великолепной окраской V–VIII, ⚔

N 3460 'Новинка - смесь' (Neuheiten-Mix) (в гр)
80 см, привлекательные желтые, оранжево-желтые и коричневые цветы-лилии, V–VIII, T, ⚔

Heuchera sanguinea (Heuchera brizoides) Гейхера кроваво-красная (Гейхера трясунковидная) ♃

Применение:	многолетник для альпинария, посадки на клумбы, в горшок и контейнер, декоративнолиственное растение на срезку, медонос
Сроки продажи:	июль-ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-апрель; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание:	10-20 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают, не присыпают, и держат во влажном состоянии, но не допускают сырости. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Для вернализации требуется прохладная фаза минимум 8-12 недель. Выгонка за 9-12 недель при 10-18 °C. Чем выше температура, тем короче период культивирования. При раннем выращивании в тепле (с 51 календарной недели) необходим дополнительный ассимиляционный свет.

N 4110 'Светлячок' (Leuchtkaefer) (Benary) (в гр)
60 см, тёмно-алый специально выведенный сорт от Benary, вечнозеленый, V–VIII

N 4160 'Брессингем гибрид' (Bressingham Hybriden) (в гр)
60 см, специально составленная красивая, воздушная смесь, богатая цветовая гамма от белого до темно-красного, вечнозеленые, V–VIII

N 4090 'Рубиновые колокола' (Ruby Bells) (Benary) (штучно)
40 см. многолетник для клумб и альпинариев с неповторимой по насыщенности окраской и очень длительным цветением, привлекательный контраст темно-красных цветков, собранных в плотные, компактные, тугие, прямые метелки и вечнозелёный лиственный покров. V–VIII

Heuchera
'Рубиновые колокола'

Hordeum jubatum смотри Benary · однолетние декоративные травы

Hymenostemma paludosum смотри Chrysanthemum paludosum

Hypericum Зверобой ♃

Применение: образующий кустарник многолетник для альпинария, почвопокровник, медонос
Сроки продажи: март-октябрь; цветущие растения: июнь-август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-июнь; февраль-март для цветения в июне; середина июля -конец августа для цветения растений начиная с конца февраля
Проращивание: 14-28 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Посев не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или возможно в открытом грунте только при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка начиная с декабря за 9-11 недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C.

N 4970 polyphyllum 'Грандифлорум' (Grandiflorum) (в гр)
25 см, золотистые цветочные «ковры», вечнозелёный лиственный покров, VI–VIII, △


Hypericum 'Грандифлорум'


Iberis 'Снежинка'


Impatiens 'Танго'

Hyssopus officinalis смотри Benary · Пряные травы

Iberis sempervirens Иберис вечнозеленый ♃

Применение: многолетник в форме «ковра» для альпинариев, почвопокровник
Сроки продажи: март-октябрь; цветущие растения: март-май
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: май-июнь для цветения в следующем году
Проращивание: 14-21 день при 15-18 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы прижимают и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате. Посев не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте только при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка начиная с декабря за 6-7 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C.

N 5730 'Снежинка' (Schneeflocke) (в кг)
30 см, плотные, вечнозелёные кусты с белыми цветами, морозоустойчиво IV-V


Impatiens 'Ява смесь'

Impatiens Neu-Guinea-Hybriden Бальзамин, недотрога новогвинейский гибрид ▽

Применение: для вазонов, ящиков, ампельных горшков и клумб
Сроки продажи: с начала апреля
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: в середине января для цветения начиная с середины апреля; в середине февраля для цветения с начала до середины мая; в начале марта для цветения начиная с конца мая
Проращивание: 6-8 дней при 22-25 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посев слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев опускают температуру до 21-22 °C и сокращают влажность. Ограничение света до 3000-5000 lx, чтобы побеги не были "рыхлыми" и вытянутыми.
Температура: 20-24 °C дневная температура и 18-20 °C ночная. Температура вентиляции: 25 °C. Растения перед продажей закаливают. Impatiens Neu-Guinea не переносит температуры ниже 12 °C. При температурах ниже 18 °C рост сильно замедляется и даже приостанавливается.

N 6360 'Ява смесь' (Java Mixture) (штучно)
F_1-гибриды, 20 см, привлекательная, разнообразная смесь из зеленолиственных белых и лососевых сортов и тёмнолиственных сортов сочных тонов (нежно-розовый с глазком, насыщенно-розовый, карминовый, кристальный, красный), а также 3 двуцветных сорта (коралловый, лососево-оранжевый, фиолетовый). Компактный, плотный рост.

N 6290 'Танго' (Tango) (танго)
F_1-гибриды, 20 см, улучшенное качество, очень крупные, ярко оранжевые цветы на контрастном темном лиственном покрове. Для теплого местоположения под открытым небом, идеально как горшечное растение.





Impatiens
'Викторианская роза'

Impatiens walleriana
Бальзамин Уоллера ⊙

Применение:	для вазонов, ящиков, ампельных горшков и клумб
Сроки продажи:	с начала апреля
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	в начале февраля для цветения с середины апреля; в начале марта для цветения с начала до середины мая; в конце марта для цветения с конца мая
Проращивание*:	стадия I+II: 10-14 дней при температуре в среднем 22-24 °C и относительной влажности воздуха 95% и выше. Стадия III: 12-18 дней при температуре 20-22 °C. Относительную влажность воздуха медленно снижают. Стадия IV: примерно 7 дней при температуре 17-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. Качество всходов зависит от освещения. Освещение при естественной нехватке света от 108 Lx оптимально на стадии I для создания 10 часового светового дня. На стадии II освещение можно увеличить до 3500-4000 Lx. Если есть оборудование, то создают туман. Обязательно избегают переувлажнения субстрата на стадии II. Переувлажнение приводит к грибковым заболеваниям и подгниванию основания корня, а также пожелтению листвы. Температуры выше 24 °C и слабая освещенность ведут к вытягиванию основного стебля, а температуры ниже 20 °C негативно влияют на равномерность прироста молодых растений. Обязательно избегают ночного отсыревания листьев. Добавление CO2 по 1000 ppm стимулирует рост и улучшает качество молодых растений.
Температура:	18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После образования почек опускают температуру на 16-18 °C и за 1 неделю до продажи закаливают растения при 10-13 °C.

*описание стадий смотреть в введении каталога

Махровые F_1-гибриды

N 6450	'Беллиззи ® Пестрые шары' (Bellizzy® Bunte Baelle) (в гр) 25 см, богатый спектр окрасок, высокий процент махровых цветов
N 6510	'Викторианская роза' (Victorian Rose) (штучно) 20 см, розово-красные, полумахровые и махровые цветы создают контраст с тёмно-зелёным лиственным покровом



Impatiens
'Беллиззи ® Пестрые шары'

‘Candy’®


‘Конфетка ®
яблоневый цвет’


Impatiens ‘Конфетка’® (Candy®)-серия (штучно)
Benary-F_1-гибриды

Поражающее качество всходов и унифицированное развитие молодых растений, раннее цветение, плотные цветущие «ячейки» всех 16 красок, длительный срок годности, отлично подходит для сада, устойчиво к погодным условиям. Высокое качество посевного материала, минимальный выход используемых растений составляет 95%.

N 6381	‘Конфетка ® яблоневый цвет’
N 6140	‘Конфетка ® Корал Би’ яркий коралловый окрас с глазком, компактнее чем другие окраски серии ‘Конфетка®’
N 6190	‘Конфетка ® тёмно-лососевый’
N 6160	‘Конфетка ® карминовый’
N 6370	‘Конфетка ® коралловый’
N 6151	‘Конфетка ® лавандовый’
N 6170	‘Конфетка ® неоново-розовый’, блестящий сочный розовый
N 6230	‘Конфетка ® оранжевый’
N 6270	‘Конфетка ® розовый’
N 6220	‘Конфетка ® розовый со звёздочкой’, рисунок проявляется на всех цветках
N 6280	‘Конфетка ® красный’
N 6210	‘Конфетка ® алый’ пламенная окраска между ‘ Конфетка® красный’ и ‘ Конфетка ® оранжевый’. Несколько компактнее, чем свои сорта-сестры
N 6320	‘Конфетка ® фиолетовый’
N 6330	‘Конфетка ® фиолетовый со звездочкой’
N 6340	‘Конфетка ® белый’ качественная зеленая листва и белоснеж ное цветение
N 6380	‘Конфетка ® нежно-розовый с глазком’
N 6400	‘Конфетка ® смесь’ богатая смесь из вышеперечисленных окрасок


‘Конфетка’®
очищенные
семена


‘Конфетка ® лавандовый’


‘Конфетка ® Корал Би’


‘Конфетка ® тёмно-лососевый’


‘Конфетка ® карминовый’


‘Конфетка ® коралловый’


‘Конфетка ® неоново-розовый’


‘Конфетка ® оранжевый’


‘Конфетка ® розовый’


‘Конфетка ® розовый со звездочкой’


‘Конфетка ® алый’


‘Конфетка ®
фиолетовый’



‘Конфетка ®
фиолетовый со
звездочкой’


‘Конфетка ® нежно-
розовый с глазком’


‘Конфетка ® красный’

‘Конфетка ® белый’

www.Benary.de



Inula ensifolia



Incarvillea delavayi

Incarvillea delavayi
Инкарвиллея Делавея ♃

Применение:	образующий кустарник многолетник для альпинария, рабатки
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: май-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для продажи не цветущих растений в марте-октябре; в июне-августе для продажи цветущих растений в феврале-мае
Проращивание:	4-8 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 18 °C. Посев не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном или толстым слоем мульчи. Выгонка за 12-13 недель при 14-15 °C или в прохладе при 7-12 °C. Зимнее укрытие в первую очередь должно защищать корни от высушивания, растение переносит температуры до −15 °C.

N 7310 Incarvillea delavayi (в гр)
30-45 см, напоминающие глоксинию цветки 5-7 см, пурпурно-розовый с желтым горлышком. Темно-зеленый лиственный покров, который в основном появляется после окончания цветения, VI–VII, ○ ⚔ ⌒

Inula Девясил ♃

Применение:	для посадки в горшок, на клумбу, в вазоны, для альпинария и экстенсивного озеленения, медонос
Сроки продажи:	март-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-март для цветения начиная с июля; июль-август для цветения в следующем году
Проращивание:	20-30 дней при 20-25 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посев присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев ставят посевы на свет, создают прохладные условия (18 °C) и сокращают влажность субстрата. Всходы не переносят переувлажнения.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18-20 °C. Растения в горшках переносят в открытый грунт после окончания заморозков. Зимовка возможна при 1-5 °C или в открытом грунте с зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за 10 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C.

N 7450 Inula ensifolia (в гр) FastraX
30 см, золотистый, образующий кустарник многолетник, культивируется как однолетник VII–IX, △ ⫶



Incarvillea delavayi

Jasione laevis (Jasione perennis)
Букашник гладкий

Применение:	как горшечное растение, многолетник для альпинариев и песчаных садов-степей, медонос, срезка
Сроки продажи:	апрель-октябрь; срезка: май-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель для не цветущих горшечных растений; июнь-август для цветения в следующем году; февраль-апрель для срезки
Проращивание:	14-21 день при 18-22 °C
Условия	подсвечивать, посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев опускают температуру до 17-18 °C и сокращают влажность субстрата. Jasione не терпит никакого переувлажнения.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Прохладная температура после появления всходов (10-12 °C) содействуют лучшему строению растений. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка в тепле за 8-9 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Чем более высокая температура культивирования, тем короче его срок. При выращивании в тепле необходимо дополнительное рассеянное подсвечивание. При раннем культивировании в неотапливаемом плёночном парнике цветение возможно через 2-3 недели.

N 8430 ‘Синее свечение’® (Blaulicht®) (Benary) (в гр)
50 см, ярко синие, шарообразные цветы, идеально для альпинариев, песчаных садов-степей и срезки, медонос
VI–VIII

Kalanchoe blossfeldiana Каланхое Блоссфельда

Применение:	миниатюрное горшечные растения, создание «ковров»
Сроки продажи:	круглый год
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-апрель для цветения в январе-апреле следующего года, возможно круглогодично
Проращивание:	10-12 дней при 20-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают, ставят на свет и поддерживают постоянную влажность. Не подвергают воздействию прямого солнечного света. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	20-25 °C дневная температура и 18-20 °C ночная идеальны для вегетативного роста летом. Температура вентиляции: 26 °C. Зимой опускают температуру до 16-20 °C. При температурах ниже 16 °C рост приостанавливается. Для образования цветов нуждаются в температурах от 18-20 °C. При температурах ниже 15 °C и выше 28 °C сильно затормаживается образование цветов. Для развития цветов приподнимают температуру летом до 20-25 °C и зимой до 20 °C. В конце культивирования для улучшения окраски цветков и закаливания растений медленно снижают температуру до 15 °C. Высокие температуры и слабая освещенность ведут к слабой, неяркой окраске цветов. Температуры выше 30 °C и ниже 5 °C приводят к слабому развитию цветков или их полному отсутствию. Температурные стратегии как, например, прохладные утренние температуры или перепады температур. не применяют, так как из-за этого сильно ухудшается качество растений.

N 9190 ‘Тетра вулкан’ (Tetra Vulkan) (в гр)
15 см, оранжево-алый, особенно обильное цветение



Kalanchoe ‘Тетра вулкан’



Jasione ‘Синее свечение’®



Kniphofia ‘Фламенко’



Lathyrus ‘Смесь’

Kniphofia ‘Фламенко’



Kniphofia uvaria Книфофия ягодная ♃

Применение:	растение-солитер и для клумбы, многолетник для срезки с длительным периодом цветения
Сроки продажи:	с апреля по июль; срезка: май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-май для цветения летом; июль-август для цветения в следующем году
Проращивание:	14-20 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посев слегка присыпают вермикулитом . Kniphofia прорастают несколько неоднородно. Поддерживают постоянную влажность, но не переувлажняют. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и опускают температуру до 15-18 °C.
Температура:	15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Начиная с января при 12-15 °C возможна выгонка. При выращивании в открытом грунте лучше всего размещать на хорошо освещенных, теплых местах. Вечнозеленые растения зимой связывают и укрывают слоем соломы (примерно 20 см).

N 9380 ‘Фламенко’ (Flamenco) (Benary) (в гр) FastraX
80 см, пламенно живые различные тона желтого, оранжевого и красного представляют этот многолетник, культивируемый как однолетник. Великолепные колосья цветков как на срезку, так и для клумб, как экзотическая прелесть. Культивируется как однолетник. VII-X, ♃ ⚔

N 9410 ‘Смесь’ (в гр)
100 см, ярко-красный, оранжевый, желтый, и кремовый оттенки цвета, культивируется как однолетник. VIII–X, ♃ ⚔

Koeleria glauca смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Lagenaria siceraria смотри Декоративная тыква

Lagurus ovatus смотри Benary · Однолетние декоративные травы

Lathyrus latifolius Горошек широколистный ♃

Применение:	вьющийся многолетник для срезки, создания ширм, медонос
Сроки продажи:	срезка (открытый грунт): июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	начало ноября-март для не цветущего товара; апрель-июль для получения срезки в открытом грунте
Проращивание:	10-15 дней при 15 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевному материалу дают разбухать 24 часа в тёплой воде 22 °C или стратифицируют. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают и держат в постоянной влажности. Избегают пересыхания. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура:	8-15 °C и зимой 8-12 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимой листья и стебли сохраняются при тепличных условиях, при тёплых температурах и недостатке света они мельчают и становятся короче соответственно. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Для вернализации требуется прохладная фаза минимум от 8-12 недель. Выгонка при 10-18 °C. Чем теплее культивирование, тем короче его срок.

O 0140 ‘Смесь’ (Mix) (в кг)
180 см, из пурпурных, нежно-розовых и белых тонов, VI–X

Lathyrus odoratus Душистый горошек ⊙

Применение:	вьющееся растение на срезку из открытого грунта и продажи самих растений
Сроки продажи:	Срезка (теплица): январь-декабрь, выращивание отдельными партиями; срезка (открытый грунт): июнь-сентябрь, выращивание отдельными партиями
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	возможно круглый год для получения срезки в закрытом грунте; с начала ноября по март для получения срезки в теплице; апрель-июль для получения срезки в открытом грунте
Проращивание:	7-10 дней при 22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевному материалу дают разбухать, 24 часа в тёплой воде 22 °C. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. Избегают пересыхания. После появления первых листьев опускают температуру до 15-18 °C и влажность в субстрате.
Температура:	8-15 °C и зимой 8-12 °C. Зимой листья и стебли сохраняются при тепличных условиях, при тёплых температурах и недостатке света они мельчают и становятся короче соответственно. Температурных колебаний избегают, так как они ведут опаданию почек. Культуры открытого грунта защищают от поздних заморозков.



Lathyrus 'Маммут розовый'



'Маммут средне-синий'



'Маммут алый'

'Маммут' (Mammut) (в кг)

Длинные прочные стебли, высокое качество цветов: очень крупные цветки и самое раннее цветение в своём классе. Лучшая серия для выращивания в открытом грунте.

O 1810	'Маммут тёмно-синий'
O 1850	'Маммут вишнево-розовый'
O 1900	'Маммут лавандовый'
O 1920	'Маммут средне-синий'
O 1950	'Маммут розовый'
O 1990	'Маммут алый'
O 2000	'Маммут насыщенно-розовый'
O 2010	'Маммут белый'
O 2020	'Маммут смесь'

'Королевский' (Royal) (в кг)

Раннее цветение, группа для открытого грунта с длинными, прочными стеблями и огромными цветами. Великолепные цветы на срезку.

O 6820	'Королевский кроваво-красный'
O 6950	'Королевский тёмно-синий'
O 6890	'Королевский свеже-розовый'
O 6910	'Королевский лавандовый'
O 6920	'Королевский средне-синий'
O 6940	'Королевский насыщенно-алый'
O 6960	'Королевский белый'
O 7000	'Королевский смесь'



'Королевский кроваво-красный'



'Королевский свеже-розовый'

'Зимняя Элегантность' (Winter Elegance) (в кг)

Для выгонки в теплице при коротком световом дне. Очень большие цветки, тип мультифлора (многоцветковый). Почки не опадают при температурных колебаниях. Предпочитает глинистые почвы.

O 1010	'Зимняя Элегантность насыщенно-розовый' (Winter Elegance Deep Rose)
O 1070	'Зимняя Элегантность лавандовый'(Winter Elegance Lavender)
O 1100	'Зимняя Элегантность розовая Диана'(Winter Elegance Pink Diana), светло-розовый
O 1120	'Зимняя Элегантность розовый'(Winter Elegance Rose)
O 1140	'Зимняя Элегантность кремовый лососево-розовый' (Winter Elegance Salmon Cream Pink)
O 1170	'Зимняя Элегантность алый'(Winter Elegance Scarlet), вишнево-красный
O 1220	'Зимняя Элегантность белый'(Winter Elegance White)



Зимняя Элегантность кремовый лососево-розовый'

'Зимняя Элегантность насыщенно-розовый'





Lavandula
'Настоящая
лаванда'



'Хидкот Синий'



'Munstead разнообразие'

Lavandula
'Хидкот Синий'



Lavandula angustifolia смотри Benary · Пряные травы

Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis, Lavandula spica, Lavandula vera) Лаванда лекарственная ♃

Применение:	ароматное, пряное, лекарственое, растение для экстенсивного озеленения, посадки в вазоны, медонос
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	семена в оболочке, ApeX-SEED
Срок посева:	январь-март для не цветущего готового товара; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание:	10-14 дней при 22-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат заранее обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности, ставят под свет. После появления первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не подвергают воздействию прямого солнечного света. Обязательно избегают переувлажнения.
Температура:	12-21 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте хорошо укрывают зимней защитой (нетканое полотно). Для вернализации требуется прохладная фаза минимум от 15 недель. Выгонка за 6-8 недель при температуре 18-21 °C или в прохладе при 12-15 °C. Чем выше температура выгонки, тем короче срок культивирования и тем большее освещение необходимо. Выращивание в прохладе обеспечивает компактный рост, но продлевает период культивирования приблизительно на 3-4 недели.

Z 8440 'Настоящая лаванда' ('Echter Lavendel') (в кг)
45 см, для окантовки дорожек и клумб, вечнозеленое растение VII-IX, D

Z 8440T 'Настоящая лаванда' ('Echter Lavendel') (штучно)
Для лучшего проращивания, идеальная основа для оптимизированного выращивания рассады.

O 9970 'Хидкот Синий' (Hidcote Blue) (штучно)
30 см, темно-синее цветение и серо-зеленый лиственный покров, вечнозеленый, образующий кустарник многолетник, VII–IX, D,

O 9970T 'Хидкот Синий' (Hidcote Blue) (штучно)
Для лучшего проращивания, идеальная основа для оптимизированного выращивания рассады.

O 9990 'Munstead разнообразие' (Munstead Varietaet) (штучно)
40 см, тёмный, сине-лавандовый окрас, компактный рост, вечнозеленый, образующий кустарник многолетник VI-VIII

O 9990T 'Munstead разнообразие' (Munstead Varietaet) (штучно)
Для лучшего проращивания, идеальная основа для оптимизированного выращивания рассады.



Lavandula 'Хидкот Синий' ApeX
посевной материал (л.) и простой (п.)

Lavatera trimestris Лаватера трехмесячная ⚲

Применение: растение для клумб, контейнера, срезки
Сроки продажи: май-октябрь, срезка: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с марта для культивирования в горшке, апрель для посева в открытый грунт
Проращивание: 4-6 дней при 21-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность. L. trimestris не переносит никакого переувлажнения.
Температура: 8-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C

R 0020 'Мон Блан' (Mont Blanc) (в кг)
50 см, белоснежный, компактный VII–IX
R 0050 'Рубиновый Королевский' (Ruby Regis) (в кг)
55 см, розовый с интенсивными красными прожилками, карминовый эффект, VII–IX
R 0030 'Серебряный кубок' (Silberpokal) (в кг)
60 см, розовый с нежного тона прожилками, обильное цветение, компактный рост, VII–IX


Lavatera 'Серебряный кубок'

Leontopodium alpinum Эдельвейс альпийский ⚲

Применение: многолетник для альпинария, рокария, луговых (смешанных) газонов, лечебное растение
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-март для продажи в июне-октябре не цветущего товара; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание: 5-10 дней при 20-22 °C
Условия проращивания: п одсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 10 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

R 0280 Leontopodium alpinum (в гр)
15 см, альпийский эдельвейс, образующий «подушку» многолетник, VI–VIII


Leontopodium alpinum

Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum vulgare, Chrysanthemum leucanthemum) Ромашка, хризантема ⚲

Применение: медонос, полудикое растение для естественных посадок и крестьянских садов, пряное и лечебное растение
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для цветения с мая; июнь-август для цветения в следующем году; в открытый грунт: март-апрель
Проращивание: 9-12 дней при 16-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно снижают температуру медленно до 16-18 °C и сокращают влажность. Во время проращивания избегают прямого солнечного света и переувлажнения. Возможно несколько неравномерное прорастание. Температуры выше 25 °C тормозят проращивание.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температуры выше 20 °C ведут к ухудшению строения растения и повышают предрасположен ность к болезням. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 8-10 недель в тепле при 13-18 °C при длинном световом дне. Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже должна быть температура культивирования, чтобы получить хорошее качество побегов.

R 0650 'Маргаритка лугов' (Wiesenmargerite) (в кг)
60-70 см, белое с желтой сердцевиной, дикое растение, съедобно, молодые побеги и листья могут использоваться в салат, также используют корни растения, V-VI, ⚔


Lavatera
'Мон Блан'



Lewisia 'Специальная смесь'
ApeX - посевной материал

Leucanthemum x superbum (Chrysanthemum maximum, Chrysanthemum superbum, Leucanthemum maximum) Нивяник махровый, Ромашка садовая (хризантема) ♃

Применение: для рабаток, горшка, срезки, медонос, 'Серебряная принцесса': для альпинариев и создания «ковров»
Сроки продажи: не цветущий товар: май-октябрь, цветущий: апрель-июль; срезка: апрель-август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для посадки в открытый грунт в мае без цветения на 1-й год; июнь-август для цветения в следующем году; июнь-август в теплицу, по возможности в прохладу
Проращивание: 9-12 дней при 16-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Во время проращивания избегают прямого солнечного света и переувлажнения. Возможно несколько неравномерное прорастание. Температуры выше 25 °C тормозят проращивание.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температуры выше 20 °C ведут к ухудшению строения растения и повышают предрасположенность к болезням. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Для вернализации рекомендуются температуры 3-5 °C в течение 10-12 недель. Выгонка за 8-10 недель ('Серебряная принцесса') и соответственно 5-7 недель ('Крейзи дэйзи' и 'Поларис'®) при 13-18 °C при длинном световом дне. Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже должна быть температура культивирования, чтобы получить хорошее качество побегов.

R 0450 'Крейзи дэйзи' или «Сумасшедшая ромашка» (Crazy Daisy) (в кг)
60-70 см, кремово-белый с желтой сердцевиной, раннее обильное цветение полумахровых и махровых цветов величиной 6-7 см, особенно привлекательно для клумбы многолетников и выращивания на рабатке, прямые сильные стебли на срезку, VI-VII, ⚔

R 0490 'Поларис'® (Polaris®) (Benary) (в кг)
120 см, огромные, белоснежные до 17 см ø цветки на неразветвленных стеблях, VI-VII, ⚔

R 0530 'Серебряная принцесса' FastraX (Silberprinzess) (в кг)
40 см, белый, компактные кусты, предназначено для альпинариев и рокариев, VII-VIII

Levisticum officinale смотри Benary · Пряные травы

Lewisia cotyledon Левизия котиледон ♃

Применение: вечнозеленый многолетник для альпинария, горшечное растение
Сроки продажи: не цветущий товар: март-октябрь; цветущий: март-июнь
Форма посевного материала: очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
Срок посева: январь-март для продажи в марте-июле не цветущих растений; июль-август для продажи в марте-мае цветущих растений
Проращивание: 3-6 недель при 15-18 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и понижают температуру до 15 °C.
Температура: 12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 4-8 недель при 12-14 °C или в прохладе при 7-12 °C.

R 0410 'Специальная смесь' (Spezial Mix) (в гр)
15 см, величиной 3-4 см цветки на длинном стебле 15 см. Белые, розовые, оранжевые и красные оттенки окраса, как правило, полосатый, вечнозеленый лиственный покров, собран в розетки, зимостойкий V-VI

R 0410C 'Специальная смесь' (Spezial Mix) (в гр) Benary ApeX-Seed
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и высокой всхожести. На 15% больше выход растений.



Leucanthemum 'Поларис'®



Leucanthemum 'Крейзи дэйзи'

Liatris spicata Лиатрис колосковый ♃

Применение:	многолетник-солитер, растение для контейнера, срезки в свежие букеты
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: круглый год
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-март для цветения в следующем году
Проращивание:	20-30 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность. Не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	10-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 0-2 °C или в открытом грунте. Для образования цветков требуется прохладный период для клубней минимально 10-15 недель при 0-2 °C. Часть криотерапии может заменяться обработкой составами, содержащими гиберрилиновые кислоты. Клубни могут храниться также несколько месяцев в прохладном помещении при температуре – 2 °C. Клубни перед прорастанием хранят минимум 2 недели при 7 °C. Выгонка за 2-3 недели при 13-15 °C и коротком световом дне, далее 5 недель при длинном световом дне (14-16 часов) при 16-20 °C. Проращивание клубней отдельными партиями возможно круглогодично, управление культивированием возможно в теплице.

R 0870 ‘Флористан® фиолетовый’ (Floristan®) (Benary) (в кг)
90 см, длинные колосья цветков на срезку, образующий клубни, VII-IX, ⚔

R 0880 ‘Флористан® белый’ (Floristan®) (Benary) (в кг)
90 см, для декораций и цветочных композиций, образующий клубни, VII-IX, ⚔

R 0800 ‘Гном’ (Kobold) (в кг)
50 см, ярко-фиолетовые колосья цветов, образующий клубни, цветет несколько раньше, чем Флористан, VII–IX, △ ⚔



Liatris ‘Флористан® фиолетовый’




Liatris ‘Флористан® белый’



Liatris ‘Гном’



Limonium latifolium



Limonium tataricum

Limonium
Лимониум Кермек, Статице ♃ ⚔

Применение:	посадка на клумбах, в контейнеры, на срезку и засушивания, медонос, L. tataricum: для экстенсивного озеленения, альпийских горок
Сроки продажи:	горшечное растение: май-июль; срезка: в течение всего года
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-апрель для высадки в открытый грунт в мае без цветения на 1-й год; июнь-август для цветения в следующем году; возможен круглогодичный посев в теплице
Проращивание:	10-20 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Избегают прямого солнечного света во время проращивания.
Температура:	16-18 °C температура дневная и 13-16 °C ночная. Температура вентиляции: 20 °C. Температуры выше 25 °C ведут к плохому образованию цветов и повышают предрасположенность к заболеваниям. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже0-3 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Температура 10-12 °C в течение 4-6 недель содействуют индукции цветения. Выгонка за 8-10 недель при 13-18 °C. Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже должна быть температура культивирования, чтобы получить хорошее качество побегов.

R 1680 L. latifolium (L. platyphyllum) (в гр)
75 см, синего цвета, подобные розеткам листья, образующий куст вечнозеленый многолетник VI–IX

R 1830 L. tataricum (Goniolimon tataricum) (в гр)
40 см, белый, подобные розеткам листья, образующий зелёный куст только летом многолетник, цветы очень хорошо сохраняют окраску при засушивании. VII-VIII



Limonium perezii

Limonium perezii (Statice perezii)
Статице перези ⊙ ⚔

Применение:	посадка на клумбе, медонос, срезка и как сухоцвет Срок культивирования (рассада): 8-10 недель Цветение: 12-14 недель, при круглогодичном культивировании 10-12 месяцев с зимовкой, обильное цветение Срезка (срок использования): 1-2 года, в зависимости от периода цветения и сезона
Сроки продажи:	горшечное растение: июнь-октябрь; срезка: в течение всего года
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения в теплице с мая; январь-апрель для цветения в открытом грунте с конца июня; июль-октябрь для цветения с марта следующего года
Проращивание:	5-14 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают воздействия прямого солнечного света во время проращивания.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для индукции цветения понижают температуру до 5-10°C на период в 4-6 недель. За счёт этого образуется большее количество соцветий, и само цветение будет более унифицированным. Температуры выше 25 °C ведут к плохому образованию цветов и повышают предрасположенность к болезням. Зимовка возможна только при отсутствии заморозков при 5-8 °C. L. perezii не зимостойкий. Выгонка за 8-10 недель при 12-15 °C. Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже должна быть температура культивирования, чтобы получить хорошее качество стеблей.

R 1630 L. perezii (в гр)
60 см, раскидистые, ярко синие цветы, идеально для получения срезки и как сухоцвет, культивируется как однолетник, VII-X, ⚔



Limonium 'Элегантность'

Limonium sinense (Limonium tetragonium)
Статице ⊙ ⚔

Применение:	посадка на клумбе, в горшки, медонос, на срезку и как сухоцвет
Сроки продажи:	горшечное растение: июнь-сентябрь; среза: июнь-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения в теплице с мая; в январе-апреле для цветения в открытом грунте с конца июня; в июле-октябре для цветения начиная с марта следующего года
Проращивание:	5-14 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев медленно понижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают воздействия прямого солнечного света во время проращивания.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для индукции цветения понижают температуру до 10-12°C на период в 4-6 недель. Температуры выше 25 °C ведут к плохому образованию цветов и повышают предрасположенность к болезням. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже1-3 °C. Выгонка за 8-10 недель при 12-15 °C. Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже должна быть температура культивирования, чтобы получить хорошее качество стеблей.

R 1960 'Элегантность' (Elegant) (в гр)
70 см, бело-желтый, свободно разветвленные стебли цветов, используется во флористике для создания свежих и сухих букетов, VII-IX

Limonium Лимониум, Кемек, Статице ⊙ ⚔

Применение:	посадка на клумбе, в горшки, медонос, на срезку и как сухоцвет
	Срок культивирования (рассада): 8-12 недель
	Цветение: 16 недель для горшечных растений, необходима вернализация
	Срезка (срок использования): 5-8 месяцев, в зависимости от периода цветения и сезона
Сроки продажи:	горшечное растение: май-сентябрь; срезка: L. sinuatum в течение всего года, L. suworoii: май-сентябрь Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения в теплице с мая; январь-апрель для цветения в открытом грунте с конца июня; июль-октябрь для цветения с марта следующего года
Проращивание:	5-14 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают воздействия прямого солнечного света во время проращивания.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для индукции цветения понижают температуру до 5-10°C на период в 4-6 недель. За счёт этого образуется большее количество цветов, и само цветение будет более унифицированным. Температуры выше 25 °C ведут к плохому образованию цветов и повышают предрасположенность к болезням. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже1-3 °C. Выгонка за 8-10 недель при 12-15 °C. Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже должна быть температура культивирования, чтобы получить хорошее качество стеблей.



Limonium ‘Компинди ® голубой’



‘Компинди ® розовый’



‘Компинди ® белый’

Limonium sinuatum ‘Компинди®’ (Compindi®) (Benary) (в кг)

50 см, специально отобранные сорта с прочными стеблями и крупными отдельными цветками, собранными в плотные метелки, для свежей срезки и засушивания, раннее, очень унифицированное цветение.

R 2160	‘Компинди ® голубой’,
R 2200	‘Компинди ® розовый’ насыщенный кармино-розовый, лучший розовый сорт
R 2190	‘Компинди ® насыщенно-синий’ хороший рост, лучший сорт для засушивания
R 2210	‘Компинди ® белый’, свежий чистый окрас

Limonium sinuatum ‘Пасифик’ (Pacific) (в кг)

R 2220	‘Американская красота’ (American Beauty), 60 см, розово-красный, VII-X
R 2330	‘Абрикос’ (Aprikose), 60 см, светлый желто-розовый, оригинальная окраска
R 2380	‘Айсберг’ (Eisberg), 75 см, белый
R 2410	‘Золотой берег’ (Goldk_ste), 75 см, улучшенные желтый сорт типа sinuatum
R 2390	‘Небесно-голубой’, 75 см
R 2420	‘Лавандовый’, 80 см, оригинальная, модная окраска
R 2400	‘Темно-синий ’, 90 см, яркий темно-синий, длительное использование
R 2480	‘Розовое мерцание’ (Rosenschimmer), карминно-розовый
R 2670	‘Пасифик смесь’ 60-75 см, смесь из вышеперечисленных окрасок

Limonium suworowii (Psylliostachys suworowii)

R 1820	‘Розово-красный’ (в кг) 75 см, длинные метелки, для свежих и сухих букетов, VII-IX



‘Американская красота’



‘Абрикос’



‘Айсберг’



‘Небесно-голубой’



‘Розовое мерцание’



‘Темно-синий ’



Linum
'Компанктум'



'Голубая лагуна'



'Белый дворец'



'Синий дворец с глазком'





'Ривьера синее небо'

Lobelia 'Ривьера розовый'



'Ривьера лиловый'



Lobelia 'Ривьера синяя полночь'

Linum flavum Лён желтый ♃

Применение:	многолетник для альпинария, стыков камней, медонос
Сроки продажи:	март-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель для не цветущей культуры горшка; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание:	5-10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления всходов опускают влажность в субстрате и более сухо культивируют.
Температура:	12-18 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка в тепле и при длинном световом дне за 7-8 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C.

R 2720 'Компактум' (Compactum) (в кг)
40 см, золотисто-желтый, VI–VIII

Lobelia erinus Лобелия эринус ⊙

Применение:	растение для клумб, балкона, создания групп, 'Pendula': ампельных горшков
Сроки продажи:	апрель-июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена или в гранулах
Срок посева:	январь-март для цветения с середины апреля по май; декабрь-февраль для кашпо
Проращивание:	4-7 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семена и гранулы прижимают, держат в небольшой влажности и ставят под свет. При длине светового дня 12-14 часов во время проращивания возможно последующее преждевременное цветение. После появления первых листьев опускают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и начинаются удобрять комплексными удобрениями с 50-75 мг азота на литр воды. Лобелии восприимчивы к солям в стадии рассады. Посев не ставят под прямой солнечный свет. Температура: В период укоренения в горшке культивируется при температуре 12-15 °C, затем медленно опускают до 10-12 °C и позже уже снижают до 6-8 °C.

Ранние сорта (в гр)

R 2860 'Голубая лагуна' (Blue Lagoon)
10 см, ярко-синее раннее цветение, компактная, закрытая структура растения, зеленый лиственный покров

R 2750 'Синий дворец с глазком' (Palace Blue with Eye)
8 см, темно-синий с большим белым глазком, очень раннее цветение, зеленая листва, компактный, нераскидистый, очень равномерный рост.

R 2770 'Белый дворец' (Palace White)
8 см, белый партнер к сорту 'Синий дворец с белым г лазком', возможно небольшое появление синих цветов

Ривьера (Riviera)-серия (в гр)

10 см, кармино-розовый, компактный шарообразный рост с очень ранним цветением и отличным качеством внешнего вида. Широкий спектр окрасок

R 2990 'Ривьера лиловый' (Riviera Lilac) лилово-розовый, зелёная листва, для выращивания в открытом грунте

R 2900 'Ривьера синяя полночь' (Riviera Midnight Blue) темно-синий, тёмный лиственный покров

R 2940 'Ривьера розовый' (Riviera Rose) кармино-розовый, зелёная листва

R 2870 'Ривьера синее небо' (Riviera Sky Blue), голубой, самый ранний сорт с подобной окраской, зёленая листва

Lobelia erinus Лобелия эринус ⊙

Стандартные сорта (в гр)

R 2920 ‘Кайзер Вильгельм’ (Kaiser Wilhelm)
10 см, васильковый с белым глазком, зелёная листва
R 2950 ‘Кристальный дворец’ (Kristallpalast) (Benary)
10 см, темно-синий, тёмный лиственный покров,
R 2980 ‘Примула Шпленденс’ (Pumila Splendens)
10 см, темно-синий с белым глазком, зелёная листва,

Ампельные сорта (в гр)

R 3050 ‘Каскад смесь’ (Cascade Mix)
Ампельная лобелия для кашпо и балконных ящиков, богатые красками смеси из голубых, кармазиновых, нежно лиловых оттенков, фиолетовых и белых, обширный рост,
R 3070 ‘Сапфир’ (Saphir) (Benary)
темно-синие цветы с белым глазком, множество свисающих побегов,



Lobelia ‘Примула Шпленденс’



‘Кайзер Вильгельм’



‘Кристальный дворец’

Lobelia erinus Лобелия эринус ⊙

Посевной материал в гранулах (штучно)

Гранулы примерно с 7 семенами для посева с интервалом в горшках или в ящиках, фасовка по 1000 Гранул.

R 2860G ‘Голубая лагуна’ (Blue Lagoon)
R 2920G ‘Кайзер Вильгельм’ (Kaiser Wilhelm)
R 2950G ‘Кристальный дворец’ (Kristallpalast)
R 2750G ‘Синий дворец с глазком’ (Palace Blue with Eye)
R 2770G ‘Белый дворец’ (Palace White)
R 2980G ‘Примула Шпленденс’ (Pumila Splendens)
R 2900G ‘Ривьера синяя полночь’ (Riviera Midnight Blue)

R 2870G ‘Ривьера синее небо’ (Riviera Sky Blue)

R 3070G ‘Сапфир’ (Saphir)



Lobelia ‘Сапфир’

Lobelia fulgens (Lobelia splendens) Лобелия многолетняя ♃ ⚔

Применение:	прочный цветок на срезку, клумб, рабаток, вазонов и как цветущее летнее горшечное растение
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с января по март для цветения с июля до середины августа; в начале июня-августе для цветения в следующем году; апрель-май для двулетней культуры на срезку
Проращивание:	10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев опускают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	Первоначально 15-18 °C, позже опускают до 10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте с достаточной зимней защитой. Выгонка начиная с января в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C

R 3240 ‘Королева Виктория’ FastraX
(Koenigin Victoria) (в гр)
75 см, ярко-красный цвет, тёмный лиственный покров, для клумб и рабаток, культивируется как однолетник VI-IX, ⚔



Lobelia ‘Королева Виктория’



Lobelia ‘Белый дворец’



'Веселье ® синий'



'Веселье ® винно-красный'



'Веселье ® лососевый'



'Веселье ® насыщенно-розовый'



'Веселье ® алый'

Lobelia speciosa Лобелия прекрасная ♀ ✕

Применение:	прочный цветок на срезку, клумб, рабаток, вазонов и как цветущее летнее горшечное растение
Сроки продажи:	май-сентябрь; срезка: июль-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена в гранулах ('Веселье'®)
Срок посева:	с январь по март для цветения с июля до середины августа; в начале октября для цветения в конце апреля; апрель-май для двулетней культуры на срезку
Проращивание:	10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы не присыпают и не прижимают. Субстрат держат равномерно влажным. Посев не ставят под прямой солнечный свет. После появления первых листьев сокращают влажность и опускают температуру до 15-18 °C.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка с января за 9-10 недель в тепле при 15-18 °C при ассимиляционном свете (16 часов) или в прохладе при 10-12 °C.

'Веселье'® (Fan®) (штучно) FastraX Benary-F_1-гибриды

50-70 см, равномерный рост, богатое ветвление. Грациозные, длинные кисти, плотно усеянные цветками величиной 2-3 см, не нуждающийся в вернализации многолетник, хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, для клумб, рабаток, вазонов и как летнее горшечное растение, VII-IX, ♀ ✕

R 3140	'Веселье ® синий'
	70 см, с бесчисленными, неповторимыми, синими кистями.
R 3150	'Веселье ® винно-красный'
	60 см сочный винно-красный с зеленой листвой, на 1-2 недели раньше, чем сорта-сестры.
R 3170	'Веселье ® лососевый'
	светящийся оттенок цвета. Прекрасный контраст к бронзовому лиственному покрову.
R 3110	'Веселье ® алый'
	60 см, пламенно-багровый с темным лиственным покровом, наилучшая пригодность на срезку и клумб.
R 3220	'Веселье ® насыщенно-розовый'
	50 см, лучший партнер к сорту 'Веселье® алый', так же с темной листвой.

Посевной материал в гранулах (штучно в гранулах)

R 3140P	'Веселье ® синий'
R 3150P	'Веселье ® винно-красный'
R 3170P	'Веселье ® лососевый'
R 3110P	'Веселье ® алый'
R 3220P	'Веселье ® насыщенно-розовый'

Культурные указания от Benary

Этот привлекательный FastraX-многолетник может выращиваться отдельными партиями для различных отрезков времени продажи в конце апреля, а также к середине июля - августе.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0

'Веселье ® лососевый' в композиции

‘Комплимент’® FastraX (Kompliment®) (штучно) Benary-F_1-гибриды

75 см, замечательные цветы на срезку, долго стоят в вазе. Длинные, плотно собранные в кисти цветки величиной 3-4 см. Элегантный внешний вид. Не нуждающийся в вернализации многолетник. При однолетнем культивировании получают один побег, при двулетнем - много побегов, VII–IX

R 3330 ‘Комплимент ® алый’ очень яркая, искрящаяся окраска цветов

R 3390 ‘Комплимент ® насыщенно-красный’

R 3380 ‘Комплимент ® смесь’ богатая смесь из синего, тёмно-розового, темно-фиолетового, светло-розового, розового, ярко и темно-красного оттенков



‘Комплимент ® насыщенно-красный’



‘Комплимент ® алый’

Lobelia tenuior (Lobelia ramosa) ⊙

Применение: растение для клумбы и балкона, как групповое и для кашпо
Сроки продажи: апрель-июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с середины декабря по март для цветения с начала апреля по май; декабрь-февраль для кашпо
Проращивание: 10-14 дней при 22-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы и гранулы прижимают, держат в постоянной увлажненности и ставят под свет. Длина светового дня больше 12-14 часов во время проращивания приводит к преждевременному цветению. После появления первых листьев опускают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и начинают удобрять низкоконцентрированными удобрениями (50-75 мг N/литр). Лобелии восприимчивы к солям на стадии молодых растений. Посев не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: В период укоренения в горшке температуре от 18-20 °C. После полного укоренения медленно снижают температуру на 4-5 недель до 5-10 °C. Эта прохладная фаза способствует хорошей индукции цветения и раннему появлению цветов. После прохладной фазы снова повышают температуру до 15-18 °C.



‘Комплимент ® смесь’


R 3430 ‘Синие крылья’ (Blue Wings) (в гр)
25 см, крупные светящиеся синие цветки с маленьким белым глазком, длинные, хорошо разветвленные побеги, особенно хороший сорт для посадки в ампельные горшки. V-IX



Lobelia ‘Синие крылья’



www.Benary.de



Lobularia ‘Кристаллы снега’



‘Пасхальная Шляпка насыщенно-розовый’



‘Пасхальная Шляпка тёмно-розовый’

‘Пасхальная Шляпка фиолетовый’

‘Пасхальная Шляпка белый’

Lobularia maritima (Alyssum maritimum, Koniga maritima, Clypeola maritime) Лобулярия приморская (Алиссум) ⊙

Применение:	Для групповых посадок и обрамления, почвопокровник
Сроки продажи:	апрель-июнь, сентябрь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-август в открытый грунта с апреля (после заморозков); в конце июля для цветения с сентября
Проращивание:	2-3 дня при 25-27 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов медленно понижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Алиссум очень восприимчив к переувлажнению. Посевы не ставят под прямой солнечный свет. Температуры проращивания ниже 18 °C замедляют процесс появления всходов до 3 недель.
Температура:	13-15 °C дневная температура и 10-12 °C ночная. Температура вентиляции: 16 °C. Температуры выше 16 °C ведут к быстрому увеличению побегов. Алиссум переносит температуры до −2 °C.

R 3760 ‘Королевский ковёр’ (Koenigsteppich) (в кг)
10 см, глубоко-фиолетовый, раскидистые «ковры»

R 3860 ‘Кристаллы снега’ (Snow Crystals) (в кг)
10 см, белоснежный, тетраплоид, очень обильное равномерное и раннее цветение, очень душистый

Ранние сорта

'Пасхальная Шляпка' (Easter Bonnet)-серия (в кг)

6 см, ранний, неприхотливый, очень унифицированный, плотный рост, не нуждается ни в каких регуляторах роста.

R 3890 ‘Пасхальная Шляпка насыщенно-розовый’ (Easter Bonnet Deep Pink),

R 3870 ‘Пасхальная Шляпка тёмно-розовый’ (Easter Bonnet Deep Rose),

R 3880 ‘Пасхальная Шляпка лавандовый’ (Easter Bonnet Lavender), светящийся лавандовый

R 3910 ‘Пасхальная Шляпка фиолетовый’ (Easter Bonnet Violet), непревзойденный темный фиолетовый

R 3920 ‘Пасхальная Шляпка белый’ (Easter Bonnet White),



Lobularia
‘Пасхальная Шляпка лавандовый’

Lupinus polyphyllus
Люпин многолистный ♃

Применение:	многолетник-солитер, на срезку, 'Садовый гном': растение для контейнера
Сроки продажи:	апрель-октябрь; срезка: июнь-август Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева:	декабрь-май для не цветущих посадок или продажи с мая; непосредственный посев в открытый грунт: март-июнь для цветения в следующем году; как культура контейнера: июль-август для цветения в следующем году
Проращивание:	5-12 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Очищенные семена можно поливать горячей водой 24 °C, чтобы они смогли разбухнуть. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сильно сокращают влажность в субстрате.
Температура:	13-16 °C дневная и 10-13 °C ночная температура. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте с достаточной зимней защитой (укрытии нетканым полотном или соломой). Выгонка за 9-10 недель в тепле при температуре 15-18 °C или в прохладе при 10-13 °C при длинном световом дне.


R 4310 'Садовый гном' (Gartenzwerg) (в кг)
60 см, невысокий, прочный рост, устойчиво, красочные кисти цветов VI-VIII, ⚔

'Русселя' (Russell) (в кг)

100 см, большие цветы с широким язычком в плотных кистях, часто двуцветные, VI-VIII, ⚔

R 4400 'Юная хозяйка замка' (Burgfr_ulein), кремовый
R 4290 'Пажи' (Edelknaben), кармино-красный тон
R 4380 'Кастелян' (Kastellan), цвета морской волны с белым язычком
R 4390 'Люстра' (Kronleuchter), светящийся желтый
R 4450 'Мой замок' (Mein Schloss), сочные красные краски
R 4510 'Хозяйка замка' (Schlossfrau), розовый с белым язычком
R 4740 'Русселя смесь серии'
очень богатая смесь, контрастная игра красок в большинстве случаев двуцветных, сильных соцветий - свечей. Специально отобранные сорта.


Lupinus 'Русселя смесь серии'


'Юная хозяйка замка'


'Люстра'


'Пажи'


'Мой замок'


'Хозяйка замка'

Luzula nivea смотри
Benary · Многолетние декоративные травы

Lychnis alpina смотри Viscaria alpina


Lupinus
'Кастелян'



'Люмина' – ассортимент



'Люмина красный темно-лиственный'



Люмина лососевые тона'

'Люмина оранжевый'

Lychnis x haageana (Silene banksia 'Haageana')
Лихнис хаагена ♃

Применение:	посадка на клумбе, в горшок и контейнер Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения с июня; июль-август с зимовкой для цветения в следующем году
Проращивание:	5-10 дней при 20-23 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом, держат в постоянной влажности. После появления первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте только с достаточной зимней защитой (укрытии нетканым полотном). Выгонка за 10-12 недель при 10-15 °C при длинном световом дне.

'Люмина' (Lumina)-серия (штучно) FastraX

30 см, круглые цветы величиной 5-7 см, которые светят своими привлекательными красками. Унифицированный и компактный рост. Не нуждается в вернализации и превосходно подходит как летнее горшечное растение. VI

R 4890	'Люмина красный темно-лиственный', тёмно-зелёный лиственный покров
R 4880	'Люмина лососевые тона', светло-зелёный лиственный покров
R 4860	'Люмина оранжевый', светло-зеленая листва, самый быстро растущий сорт

Lycopersicon esculentum смотри
Корнеплоды и овощи

Matricaria chamomilla смотри
Benary · Пряные травы

Matricaria eximia смотри Tanacetum parthenium



'Люмина красный темно-лиственный'



'Оранжевый'

'Лососевые тона'

'Красный темно-лиственный'

'Люмина оранжевый'

Matthiola incana Маттиола седой. Левкой седой ⊙

Применение:	как культура горшка: 'Золушка', на срезку 'Золотой букет®'
Сроки продажи:	апрель-июль; срезка: в течение всего года
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с ноября для цветения в апреле-мае, срок культивирования: 130 дней (без дополнительного рассеянного света), с марта для цветения в июне-июле, срок культивирования: 90 дней
Проращивание:*	стадия I: 7-14 дней при 18-21 °C Стадия II: 8 дней при 15-17 °C Стадия III: криотерапия: 8 дней при 4-8 °C Стадия IV: 8 дней при 12-15 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Высеянные семена только слегка прижимают, а не присыпают субстратом. На стадии I требуется влажность воздуха 95-100%, со стадии II влажность воздуха и влажность субстрата должна медленно сокращаться. Как только зародышевые листки полностью развернутся (стадия III), посевы устанавливают в прохладу, свет или полутень при коротком световом дне (7 часов). После этого Левкой может быть отсортирован на махровую (проростки со светлой листвой) и немахровую формы (проростки с тёмной листвой).
Температура:	14-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Для развития цветов снова опускают температуру до 10-12 °C. Слишком низкие температуры ведут к предрасположенности к грибку. Плёночные парники должны быть с возможностью регулировать температуру, так как температуры (> 18 °C) тормозят цветение.

* Описание стадий смотреть во введении каталога



Matthiola 'Золушка желтый'



'Яблоневый цвет'



'Золушка синий'

Левкой для горшка 'Золушка' (Cinderella) (в гр)

25 см, слегка ветвистый рост, сильные метелки, махровые цветки 4-5 см в диаметре. Унифицировано в росте и раннем периоде цветения. Срок культивирования примерно 90 дней. Отборные сорта для культуры горшка и продажи весной



'Золушка розовый'



'Золушка пурпурный'



'Золушка белый'

R 5700	'Золушка яблоневый цвет' (Cinderella Appleblossom)
R 5710	'Золушка синий' (Cinderella Blue), фиолетово-синий
R 5740	'Золушка лавандовый' (Cinderella Lavender)
R 5800	'Золушка розовый' (Cinderella Pink), пастельно-розовый
R 5810	'Золушка пурпурный' (Cinderella Purple)
R 5860	'Золушка красный' (Cinderella Red), насыщенно-красный
R 5910	'Золушка серебристо-синий' (Cinderella Silvery Blue),
R 5980	'Золушка белый' (Cinderella White)
R 5990	'Золушка желтый' (Cinderella Yellow)



'Золотой букет ® тёмно-синий'



'Золотой букет ® желтый'



'Золотой букет ® розовый'

'Золотой букет'® (Schnittgold®)-Левкой (Benary) (в кг)

75 см, очень крупные цветки в мощных метелках, не разветвленные прочные стебли. Время начала цветения отдельных сортов варьирует. Сортируются на махровые и простые.

R 7550	'Золотой букет ® тёмно-синий', цветение на 5 дней раньше
R 7580	'Золотой букет ® желтый'
R 7590	'Золотой букет ® светло-синий'
R 7630	'Золотой букет ® розовый'
R 7640	'Золотой букет ® розово-красный'
R 7680	'Золотой букет ® рубиновый', улучшенный красный
R 7700	'Золотой букет ® белый'
R 7730	'Золотой букет ® смесь'



'Золотой букет ® светло-синий' и 'Рубиновый'



'Золотой букет ® белый'



'Золотой букет ® розово-красный'



Melampodium ‘Звезда шоу’ ®



Melampodium ‘Дерби’ ®

Melampodium paludosum
Меламподиум болотный ⊙

Применение: растение для клумб и рабаток, альпинариев, балконных ящиков, как летнее горшечное растение
Сроки продажи: середина апреля - август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с февраля по май
Проращивание*: стадия I: 7-10 дней при 20 °C
Стадия II-IV: 21 день при 15-17 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом. Субстрат держат равномерно влажным и не позволяют пересыхать.
Температура: 16–18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Melampodium нуждается в тепле, низкие температуры продлевают время культивирования. Незадолго до продажи растения закаливают. Не переносит температуры ниже 10 °C.


* Описание стадий смотреть во введении каталога

R 9110 ‘Дерби’® (Derby®) (Benary) (штучно)
20 см, компактнее чем ‘Звезда шоу’®, интенсивный светящийся золотистый, цветы величиной 4 см, мелкий лиственный покров, идеально как культура горшка с февраля по май, V–IX, ○

R 9130 ‘Звезда шоу’® (Showstar ®) (Benary) (штучно)
25 см, глубокий желтые окрас цветков диаметра от 4 см, богатое и устойчивое цветение, стелющийся рост, идеально для клумб и рабаток. V–IX, ○

Melica transsilvanica смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Mimulus ‘Волшебная смесь’



Mimosa pudica

Melinis (Rhynchelytrum) nerviglumis смотри Benary · Однолетние декоративные травы

Melinis (Rynchelytrum) repens смотри Benary · Однолетние декоративные травы

Melissa officinalis смотри Benary · Пряные травы

Mentha piperita смотри Benary · Пряные травы

Mimosa Мимоза Ⓦ

Применение: растение для горшков и вазонов
Сроки продажи: с середины апреля по октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель
Проращивание: 12-15 дней при 20-26 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Семена перед посевом поливают теплой водой и дают им разбухнуть за ночь. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев опускают температуру до 20 °C и сокращают влажность. Полученные всходы не подвергают воздействию прямого солнечного света
Температура: 18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После укоренения опускают температуру до 18 °C. Чем ниже температуры, тем компактнее будет строение растения. Рост приостанавливается при температурах ниже 15 °C. При температуре ниже 5 °C M. pudica может погибнуть.

S 0320 Mimosa pudica (в кг)
60 см, ‘недотрога’, бледно-розовый, очень тонкие перистые листья, которые закрываются от прикосновения, вечнозеленое растение, VII–VIII

Mimulus Губастик, Мимулюс

Применение: растение для клумб, горшка, вазонов, создания «ковров»
Сроки продажи: с середины апреля по июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль - апрель
Проращивание: 5-7 дней при 15-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Высеянные семена слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 15 °C и сокращают влажность. Полученные всходы не подвергают воздействию прямого солнечного света.
Температура: 10-15 °C дневная и 5-7 °C ночная температура, температура вентиляции: 16 °C, температуры выше 16 °C ведут к излишнему вытягиванию побегов. Чем ниже температура, тем компактнее будет строения растения. Температуры ниже 4 °C могут вызывать гибель Мимулюса.

F_1-гибриды

S 0460 ‘Волшебная смесь’ (Magic Mix) (штучно)
25 см, смесь из ярких, ясных окрасок и пастельных тонов: кремово-белого, золотистого, оранжевого, красного и бордового. Быстро растущее горшечное растение для не отапливаемых теплиц с цветением к середине мая или просто для клумб и балконов. После срезки появляется второе цветение.

Moluccella laevis Молюцелла гладкая ☉ ⚔

Применение: растение для клумб, рабаток, срезки и как сухоцвет
Сроки продажи: апрель-июнь; срезка: круглый год
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: срезка в теплице: круглый год, отдельными партиями; срезка в открытом грунте: февраль-апрель, отдельными партиями
Проращивание: 21 день при 3 °C; 14 дней при 12-18 °C
Условия проращивания: в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом, песком или землей и поддерживают постоянную влажность и прохладе (неотапливаемые теплицы, парники). Позже повышают температуру до 12 °C и после появления первых листьев снижают влажность субстрата. При непосредственном посеве в открытом грунте по возможности высевают редко и держат землю влажной.
Температура: 10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C.

S 0660 'Колокол Ирландии' (Irlandglocke) (в кг)
70 см, колосовидные соцветия в зеленоватых чашелистиках, для свежих и сухих букетов, VII–VIII

Monarda didyma Монарда двойчатая ♃ ⚔

Применение: образующий кустарник солитер-многолетник, медонос, лечебное растение, для контейнеров и срезки
Сроки продажи: горшечное растение и для клумб: май-октябрь; срезка: с конца апреля по сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: март-май для посадок в открытый грунт в мае без цветения в первый год; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание: 5-8 дней при 21-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно понижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают прямого солнечного света во время проращивания.
Температура: 12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже0-3 °C или в открытом грунте. Выгонка за 10 недель при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C. Чем меньше освещенность, тем ниже должна быть температура культивирования, что бы получить хорошее качество стеблей.

'Панорама'® (Panorama®) (Benary) (в гр)

80-100 см, светящиеся высокие листы, на растение примерно 20 длинных стеблей с цветками, душистое растение, идеально для рабаток и срезки.
VII-IX Bie, ⚔


S 0710 'Панорама® красные тона'
110 см, светящийся багровый
S 0730 'Панорама® смесь'
Специальная смесь с различными оттенками красного и алого



Monarda 'Панорама® смесь'



Monarda 'Панорама® красные тона'



Moluccella 'Колокол Ирландии'



Monarda 'Панорама® красные тона'





Musa ensete

Myosotis ‘Компинди’®



Myosotis ‘Темно-синяя башня’



Myosotis ‘Миро’

Musa ensete (Abyssinian banana, Ensete ventricosum, Ethiopian banana) Абиссинский банан

Применение:	медленно растущее декоративнолиственное растение для вазонов, хорошо освещенных и прогреваемых участков, зимних садов
Сроки продажи:	апрель-ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	круглый год
Проращивание:	3-6 месяцев при 24-30 °C
Условия проращивания:	в темноте. Полученные всходы помещают не меньше, чем на 24 часа в теплую воду для разбухания. По возможности используют стерильный субстрат или обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают песком, субстратом или вермикулитом и поддерживают постоянную влажность и тепло. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и ставят растения на свет. Прорастание очень медленное и неравномерное.
Температура:	20-27 °C. Температура вентиляции: 30 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже5-13 °C. Не переносит заморозки.

S 0930 Musa ensete (Ensete ventricosum) (штучно)
до 3 м, крупное растение, огромные листья, самый прекрасный вид бананов



Myosotis ‘Росилва’



‘Блусилва’



‘Сноусилва’

Myosotis sylvatica (Myosotis alpestris) Незабудка лесная

Применение:	горшечное растение, для создания «ковров», обрамление клумб
Сроки продажи:	с начала марта по май
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	открытый грунт: середина июня - конец августа, в зависимости от местных условий; как горшечное растение, не цветущее: февраль-март для продажи в мае; цветущее: середина августа - начало сентября
Проращивание*:	стадия I: 10-14 дней при 20-22 °C Стадия II: 9-10 дней при 16-20 °C Стадия III+IV: 7-9 дней при 15-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. Свет содействует проращиванию. Со стадии II растения приучают непосредственно к свету и сокращают влажность в субстрате, но посевы не должны пересыхать.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Зимовка без заморозков: температура вентиляции: 6 °C; местоположение: без заморозков в теплице или пленочном парнике, при свете, воздухе, прохладе, не позволяют укореняться в временный субстрат, так как иначе весной невозможно будет контролировать рост побегов. При холодной зимовке растениям для большей устойчивости к морозу позволяют укореняться и весной перед началом периода роста освобождают молодые корни от временного субстрата.

* Описание стадий смотреть в введении каталога

S 1720 ‘Компинди’® (Compindi®) (Benary) (в гр)
15 см, очень темный синий окрас, неповторимая интенсивность и равномерность роста, идеально для клумб и горшечной культуры.

S 1650 ‘Темно-синяя башня’ (Dunkelblauer Turm) (Benary) (в гр)
25 см, утонченный, крепкий, прямой и унифицированный рост, очень обильное не ослабевающее цветение темно-синих цветков. Идеально для маленьких букетиков или в саду, длительный период цветения,

S 1840 ‘Миро’ (Miro) (Roggli) (в гр)
15 см, стелящийся, унифицированный рост, средне-синяя стойкая окраска, рано цветущий сорт

‘Силва’ (Sylva)-серия (Roggli) (в гр)

S 1850 ‘Блусилва’ (Bluesylva)
20 см, несколько компактнее, чем сорт-сестра, ‘Росилва’. Богатое цветение средне-синих цветков. Очень хорошо для выращивания в горшке

S 1870 ‘Росилва’ (Rosylva)
20 см, интенсивный розовый окрас, очень сильный рост

S 1890 ‘Сноусилва’ (Snowsylva)
20 см, белоснежный, компактный рост, идеальная пригодность для горшка, зимостойкий сорт

Myosotis ‘Сноусилва’, ‘Блусилва’ и ‘Росилва’

Nassella (Stipa) tenuissima смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Nemesia strumosa Немезия зобовидная ⊙

Применение: растение для клумб и балкона, горшечное растение, создание «ковров»
Сроки продажи: с середины апреля по июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль-апрель; открытый грунт: апрель-май (без заморозков)
Проращивание: 10-14 дней при 15-18 °C
Условия проращивания: в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев опускают температуру до 15 °C и сокращают влажность. Излишняя сырость субстрата тормозит рост растения и температуры выше 18 °C препятствуют прорастанию.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Температуры выше 16 °C ведут к излишнему вытягиванию побегов. Чем ниже температуры, тем компактнее и аккуратнее будет структура растения. Перед продажей растения закаливают при 8-10 °C. Температуры ниже 4 °C могут вызывать гибель Немезии.

S 2520 'Карнавал' (Karneval) (в гр)
25 см, веселая, пестрая игра красок, большие цветы с тонкой каймой, невысокий рост, для пестрых клумб, VI-IX, ⁞

S 2490 'Капли солнца смесь' (Sundrops Mix) (штучно)
25 см, великолепная яркая смесь из 5 светящихся окрасок для посадки в группах, в горшки и как почвопокровник, равномерный и компактный рост



Nassella 'Карнавал'



Nassella 'Капли солнца смесь'

Nepeta faassenii (Nepeta mussinii hort.) Котовник Фассена 2↓

Применение: многолетник для альпинария, почвопокровник, для экстенсивного озеленения, вазонов, медонос, для создания композиции с розами
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для не цветущего товара; февраль-март для цветения в июне-июле (культивирование при длинном световом дне); август-октябрь для цветения в следующем году
Проращивание: 10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет. Обязательно избегают переувлажнения.
Температура: 12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте с достаточной зимней защитой (нетканое полотно). Выгонка в тепле за 4-8 недель при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C. Чем теплее выгонка, тем короче срок культивирования и тем интенсивнее должно быть освещение. Культивирование в прохладе делает рост компактным, но период выращивания продлевается приблизительно на 3-4 недели.

S 2920 Nepeta faassenii (mussinii hortensis) (в кг) FastraX
30 см, голубой, ароматные листья и цветы, почвопокровник, идеальный «аккомпанемент» для клумб с розами. V–IX, ⁞



Nepeta faassenii



Nepeta faassenii



Nigella ‘Экзотик’



Nigella ‘Трансформер’



Nigella ‘Персидские сокровища’



Oenothera macrocarpa

Nigella Нигелла, чернушка

Применение:	растение для групп и рабаток, срезки и как сухоцвет
Сроки продажи:	июнь-сентябрь; срезка: июнь-сентябрь, засушенные цветы: весь год
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-июнь; открытый грунт: с середины марта по апрель, высевать отдельными партиями
Проращивание:	7-14 дней при 18-21 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов ставят посев в прохладу (15-18 °C) и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	12-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Нигелла не переносит ночные заморозки.

S 3400 Nigella damascena ‘Персидские сокровища’ (Persische Juwelen) (в кг)
40 см, улучшенная смесь с розовым, яркие в полоску коробочки семян интересны для создания сухих букетов VII–VIII, ⚔

S 3540 Nigella hispanica ‘Экзотик’ (Exotic) (в кг)
40 см, интенсивно-синие цветы со своеобразной формой черно-коричневой сердцевины, оригинальные завязи семян для флористики, VII–VIII, ⚔

S 3490 Nigella orientalis ‘Трансформер’ (Transformer) (в кг)
40 см, неприметные желтые цветки, интересны коробочки с семенами в форме когтей как флористический аксессуар, VII–VIII, ⚔

Ocinum basilicum смотри Benary · Пряные травы

Oenothera macrocarpa (Oenothera missouriensis) Энотера миссурийская ♃

Применение:	многолетник для альпинария, почвопокровник, медонос, для создания естественного и дикого сада
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения с июля (культивирование при длинном световом дне); август-октябрь для цветения в следующем году
Проращивание:	8-14 дней при 22-26 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев опускают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет. Непременно избегают переувлажнения.
Температура:	15-18 °C дневная температура и 10 °C ночная. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте. Растениям в открытом грунте необходима достаточная зимняя защита (нетканое полотно). Выгонка в тепле за 9-11 недель при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C. Чем выше температура выгонки, тем короче срок культивирования и тем интенсивнее должно быть освещение. Культивирование в прохладе делает рост компактным, но период выращивания продлевается приблизительно на 2-4 недели.

S 3920 Oenothera macrocapra (missouriensis) (в кг) FastraX
30 см, нежно-желтые крупные цветки, очень обильное цветение VII–X, △

Origanum majorana смотри Benary · Пряные травы

Origanum vulgare смотри Benary · Пряные травы

Panicum violaceum смотри
Benary · Однолетние декоративные травы

Papaver Мак


Применение:	растения для клумб, горшка и контейнера, медонос, 'P. nudicaule': срезка, 'P. alpinum': многолетник для альпийской горки
Сроки продажи:	апрель-июль; срезка: с января по сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-июль для цветущего товара; июль-август для двулетней культуры; открытый грунт (без заморозков): с конца апреля по июнь; теплица (срезка)): с октября по июль
Проращивание:	'P. alpinum' и 'P. miyabeanum': 14-21 день при 15-21 °C 'P. nudicaule': 7-12 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Под прямой солнечный свет не ставят. Обязательно избегают переувлажнения. При разведении в лотках с ячейками не позволяют укореняться во временный субстрат, так как Papaver образует корневища и они повреждаются при вынимании из ячеек, что может привести к задержке роста.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температур выше 25 °C избегают. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 0-3 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка с декабря за 8-9 недель при температуре 13-15 °C или в прохладе при 5-10 °C. Чем выше температура выгонки, тем короче срок культивирования и тем интенсивнее должно быть освещение. Культивирование в прохладе делает рост компактным, но период выращивания продлевается приблизительно на 2-4 недели.

S 4220 Papaver alpinum 'Альпийский мак смесь' FastraX
(Alpenmohn Mix) (в гр)
(Papaver nudicaule var. pseudocorylatifolium)
25 см, смесь окрасок альпийского мака: желтая, оранжевая и розовая, вечнозелёный, VI–VII, △

S 4320 Papaver miyabeanum 'Пачино'® (Pacino®) (в гр) FastraX
(Papaver nudicaule subsp. xanthopetatum)
15-20 см, карликовый мак, светло-желтые цветы диаметром 4-5 см стоят на стеблях длиной 15 см, вполне округлый, закрытый, подобный чехлу рост, сине-зеленая листва, вечнозелёный, идеально как горшечное растение, VI-IX



Papaver 'Альпийский мак смесь'



Papaver 'Пачино'®



Papaver 'Садовый малыш'



Papaver 'Матадор'®



Papaver 'Весёлая вечеринка'®

Papaver nudicaule Islandmohn ⚲ ⚔ FastraX

S 4360 'Садовый малыш' (Gartenzwerg) (Benary) (в гр)
30 см, средне-рослая устойчивая смесь, обильное цветение, богатые краски, сине-зеленая листва, вечнозелёная, V–VIII, △

S 4590 'Матадор'® (Matador®) (Benary) (в гр)
50 см, очень богатое цветение, светящийся ярко-красный цвет, вечнозелёный, VI-VIII

S 4540 'Весёлая вечеринка'® (Partyfun®) (Benary) (в гр)
40 см, очень большие, грациозные цветы, самая богатая игра пастельных окрасок, двуцветных и ярких, чистых окрасок, очень высокая прочность, при раннем посеве богатое цветение осенью того же года, сине-зеленая листва, вечнозелёная, V–IX, ⊙

Papaver orientale (Papaver bracteatum)
Мак восточный ⚲

Применение:	многолетник-солитер, медонос, для контейнера, срезки
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: май-июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-июль для не цветущего товара; июль-август для цветения в следующем году; открытый грунт (без заморозков): с конца апреля по июнь
Прорастание:	7-12 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Под прямой солнечный свет не ставят. Обязательно избегают переувлажнения. При выращивании в кассетах не позволяют укореняться во временный субстрат, так как мак образует корневища и они повреждаются при вынимании из ячеек.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Температур выше 25 °C избегают. Зимовка в закрытом грунте возможна при температуре не ниже 0-3 °C или в открытом грунте. Выгонка за 10-12 недель при температуре 10-15 °C или в прохладе при 5 °C. Чем теплее выгонка, тем короче срок культивирования и тем интенсивнее должно быть освещение. Культивирование в прохладе делает рост компактным, но период выращивания продлевается приблизительно на 2-4 недели.

S 4960 'Особая смесь Benary' (Benarys Sonder Mix) (в кг)
80 см, из 7 отдельных сортов: белого, лососевого, кроваво-красного, оранжевого, красного, пастельного, розового; вечнозелёный, V-VI, ⚔

S 4730 'Бриллиант' (Brillant) (в кг)
80 см, живой огненно-красный оттенок с черными пятнами, вечнозелёный, V-VI, ⚔

Papaver 'Весёлая вечеринка'®



Pelargonium ⊙

Применение: балконные ящики, вазоны, как летнее горшечное растение, для кашпо, пирамид, групповых посадок и отдельных групп на клумбе
Сроки продажи: с начала апреля по июль
Форма посевного материала: обработанные семена
Срок посева: январь-март для цветения в апреле-июне; май-июнь для цветения в июле августе; в начале ноября для ампельных форм
Проращивание: 5-10 дней при 21-25 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевные площади дезинфицируют, субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом, поддерживают равномерную влажность и ставят на свет. Избегают прямого солнечного света. После развития первых листьев снижают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и удобряют раствором сбалансированного комплексного удобрения с содержанием азота 75-100 мг. на литр воды.
Температура: 18-20 °C. Температура вентиляции: 21 °C. Средняя дневная температура должна быть 18 °C, перепад дневной и ночной температуры должен быть не более чем 4 °C. Слишком низкие средние дневные температуры (ниже 16 °C) и дневные температуры ниже 15 °C продлевают время культивирования. При температре ниже 10 °C листья окрашиваются в красный и желтый. Температуры выше 21 °C практически не влияют на срок культивирования, а температуры выше 30 °C могут вызывать хлороз. Перед продажей растения постепенно в течение 14 дней закаливают, но избегают температур ниже 10 °C. Pelargonium положительно реагирует на повышение ночных температур относительно дневных.


Pelargonium 'Летние дожди'


'Мультицвет светло-розовый'


'Мультицвет розовый'


'Мультицвет лососевый'


'Мультицвет алый'


'Мультицвет алый с глазком'


'Мультицвет белый'

F_1-Peltatum-гибриды (Efeu-Pelargonie) (штучно)

S 7200 'Летние дожди' (Summer Showers)
40-60 см, первая полученная в семенах Peltatum-гибрид, хорошо разветвленный рост, раннее цветение, светящееся смешение красок ярко-красных, розовых, белых, лиловых, и фиолетовых, цветки величиной 8-10 см, блестящая зеленая листва, напоминающий лимон аромат, устойчиво к вирусам свободно от вируса

F_1-Зональные-гибриды (штучно)

S 7520 'Красная элита' (Red Elite)
30 см, крупные ранние цветки, низкий, хорошо разветвленный рост, устойчиво к вирусам

'Мультицвет' (Multibloom) F_1-гибриды (штучно)

25 см, самый ранний из размножаемых семенами сорт, очень низкий, хорошо разветвленный с непоникающими ветвями, многочисленные соцветия за счет неодновременности зацветания создают продолжительное обильное цветение, устойчиво к вирусам
S 8200 'Мультицвет светло-розовый' (Multibloom Bright Rose), карминовый

S 8220 'Мультицвет розовый' (Multibloom Pink), свежий розовый
S 8230 'Мультицвет лососевый' (Multibloom Salmon)
S 8240 'Мультицвет алый' (Multibloom Scarlet)
S 8340 'Мультицвет алый с глазком' (Multibloom Scarlet Eye), алый с белым глазком
S 8350 'Мультицвет белый' (Multibloom White)

Pennisetum setaceum (rueppelii) смотри Benary · Однолетние декоративные травы

Pennisetum villosum (longisstylum hort.) смотри Benary · Однолетние декоративные травы


Penstemon 'Рондо'


Penstemon 'Мистика'

Penstemon barbatus Пенстемон бородатый ♃ Bie

Применение: образующий кустарник многолетник-солитер, для посадки на клумбе, в контейнер, медонос
Сроки продажи: как горшечное растение и для клумб: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для цветения с июля; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание: 14-21 день при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев медленно понижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают воздействия прямого солнечного света во время проращивания. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура: 12-18 °C температура дня и 10-13 °C ночная. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 0-3 °C или в открытом грунте только с достаточной зимней защитой (нетканое полотно или присыпание мульчей). Выгонка в тепле за 11-12 недель при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C.

S 9210 'Рондо' (Rondo) (в кг) FastraX
40 см, прекрасное яркое растение для альпинария, красные и синие оттенки цвета, цветки похожи на гиацинтовые, образующий кустарник многолетник, вечнозелёный, VI-IX



Penstemon 'Мистика' посевной материал ApeX (л.) и простой (п.)

Penstemon digitalis Пенстемон наперстянковидный ♃ ⚔

Применение: для контейнера, вазона (монокультурная посадка), клумб, срезки, медонос
Сроки продажи: апрель-июнь, срезка: апрель-июль
Форма посевного материала: семена в оболочке, ApeX
Срок посева: январь-март для цветения с июня; июль-август с зимовкой и цветением в следующем году
Проращивание*: стадия I-II: 14-20 дней при 20-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно понижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают воздействия прямого солнечного света во время проращивания. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура: 13-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 2-4 °C или возможно в открытом грунте с зимней защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка при 13-18 °C.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

S 9230C 'Мистика' (Mystica) (штучно) Benary ApeX SEED
70-80 см, темно-красная листва в контрасте с лавандовыми, нежными метелками цветков, вечнозелёный сорт, очень высокая всхожесть посевного материала ApeX.

Penstemon hartwegii Пенстемон глоксиниевидный ☉ ⚔

Применение: посадки на рабатке, в контейнер, на срезку, медонос
Сроки продажи: горшечное растение и для клумб: май-август; срезка: июнь-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для цветения с июля; открытый грунт: с марта, защищая от поздних заморозков
Проращивание: 7-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Избегают воздействия прямого солнечного света во время проращивания. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура: 12-18 °C дневная и 10-13 °C ночная температура. Температура вентиляции: 20 °C. P. hatwegii не переносит заморозков.

S 9470 'Гигантеус смесь' (Giganteus Mix) (в кг)
75 см, очень обильное цветение, великолепные краски: от красного и розового до лилового, множество с двуцветной окраской, VI-X
S 9500 'Алая королева' (Scharlachk_nigin) (в кг)
75 см, огненно-красный с высветленным горлышком, VI-X, ◐


'Алая королева'


'Гигантеус смесь'

Pentas lanceolata Пентас продолговатый

Применение:	посадка на клумбах, рабатках, в контейнеры, как комнатное растение
Сроки продажи:	май-октябрь
Форма посевного материала:	семена в гранулах
Срок посева:	с января по май
Проращивание*:	стадия I: 10-14 дней при 23-26 °C Стадия II: 7-10 дней при 20-22 °C Стадия III-IV: 14-21 день при 18-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы не присыпают, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. Избегают прямого солнечного света и переувлажнения. Холодной водой не поливают. Пентас нуждается в высокой интенсивности света для равномерного и быстрого роста, при плохом естественном освещении необходим дополнительный свет. При температурах ниже 16 °C рост прекращается. Уровень ph субстрата должен быть выше 6,3.
Температура:	17-19 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Температуры ниже 16 °C вызывают неравномерное развитие цветов и препятствуют росту.

* Описание стадий смотреть во введении каталога



'Граффити® светло-красный'

GRAFFITI Граффити-серия (в гранулах) Benary-F_1-гибриды

30 см, большие зонтики цветков, богато разветвленный, кустистый компактный рост, 4 привлекательные окраски, не требует применения регуляторов роста. Их плотные цветущие кустики и унифицированный, компактный рост делает 'Graffiti' ® идеально подходящей серией для гарантированного получения товара. Длительный период цветения порадует любого клиента. Идеально для посадки в вазоны, на клумбе и на балконе. Предпочтительно размещать в теплых хорошщо освещенных местах.

S 9830P 'Граффити® светло-розовый'
S 9840P 'Граффити® светло-красный'
S 9890P 'Граффити® фиолетовый'
S 9900P 'Граффити® белый'
S 9930P 'Граффити® смесь'



'Граффити® светло-розовый'



'Граффити® фиолетовый'



'Граффити® белый'



'Граффити® смесь'



'Калейдоскоп насыщенно-красный'



'Калейдоскоп яблоневый цвет'



'Калейдоскоп лиловый'



'Калейдоскоп карминно-красный'

Pentas lanceolata (Pentas carnea) Пентас продолговатый

KALEIDOSCOPE Калейдоскоп-серия (в гранулах)

Benary-F_1-гибриды

45-50 см, раннее и обильное цветение интенсивно окрашенных зонтиков цветков, сильный, хорошо разветвленный рост, высокое качество посевного материала. Идеально для смешанных посадок в контейнерах и очень хорошо подходит для сада для теплых, солнечных мест.

S 9290P 'Калейдоскоп яблоневый цвет'
S 9340P 'Калейдоскоп карминно-красный'
S 9380P 'Калейдоскоп лиловый'
S 9400P 'Калейдоскоп насыщенно-красный'

'Новый взгляд'® (New Look®) серия (в гранулах)

20-25 см, величиной 6-8 см, плотные ложные зонтики, привлекательная, темно-зеленая листва, компактный, хорошо разветвленный рост, круглогодичное цветение, культивируется без стимуляции развития.

S 9600P 'Новый взгляд ® светло-розовый'
S 9620P 'Новый взгляд ® светло-красный'
S 9550P 'Новый взгляд ® розовый'
S 9670P 'Новый взгляд ® фиолетовый', прорастает слабее других
S 9680P 'Новый взгляд ® белый', благородный, белоснежный окрас
S 9690P 'Новый взгляд ® смесь'

Пентас рекомендуется к выращиванию в южных регионах России, в Украине, в Молдавии, в республиках Средней Азии и Кавказа.



'Новый взгляд ® светло-розовый'



'Новый взгляд ® светло-красный'



'Новый взгляд ® розовый'



'Новый взгляд ® фиолетовый'



'Новый взгляд ® белый'



Pentas F_1 'Калейдоскоп' ассортимент

Культурные указания от Benary-для Pentas 'Граффити' и 'Калейдоскоп'

Хорошее развитие молодых растений Пентас можно получить за счёт повышения температуры в фазе зародыша до 25 °C. Производители молодых растений могут достигать более высокой нормы всходов, укорачивая критическую фазу проращивания и получая более сильные и более унифицированные молодые растения.

По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0

Perilla frutescens (Perilla nankinensis, Perilla crispa, Perilla arguta) Перилла кустарниковая ⊙

Применение:	декоративнолиственное растение для клумб, вазонов, балконных ящиков, кашпо и горшков, лечебное растения, экстракт из листьев может использоваться для окрашивания.
Сроки продажи:	с середины апреля по август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с января по март для горшечных растений; февраль-март для клумб и балконов
Проращивание:	5-10 дней при 20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность, ставят на свет. После развития первых листьев сокращают влажность субстрата. После каждого полива необходимо подсушивать субстрат. Непременно избегают переувлажнения. Посевной материал не хранят.
Температура:	18-20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают. Перилла плохо переносит температуры ниже 10 °C, поэтому растения обязательно защищают от холодных ночей.

S 9790 'Нанкинесис' (Nankinensis) (в кг)
60 см, блестящая, пурпурная листва, особенно эффектна как задний план для яркоокрашенных цветов. Привлекательное декоративнолиственное растение с розовыми цветами.


Perilla 'Нанкинесис'

Petunia Петуния ⊙

Применение:	групповое растение для горшка, балкона и клумбы
Сроки продажи:	с середины апреля по конец июня
Форма посевного материала:	очищенные семена
Aussaattermin:	февраль-март
Проращивание*:	стадия I: 3-5 дней при 22-24 °C Стадия II+III: 25-30 дней при 18-20 °C Стадия IV: 7-10 дней при 16-18 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. Дополнительный свет 100-500 Lx улучшает качество. Посевы при дополнительном освещении получаются более компактными и равномерными, чем при стандартном освещении. Влажность воздуха медленно сокращают со стадии II.
Температура:	14-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Растения перед продажей закаливают при 10-12 °C. Температуры <10 °C ведут к нарушениям роста.

* Описание стадий смотреть во введении каталога


Petunia 'Папа синий'


Petunia 'Папа орхидея'


Petunia 'Папа мята'


Petunia 'Папа красный'

Petunia 'Папа' (Daddy) (в гр и штучно) F_1-гибриды крупноцветковые

30 см, цветки с ярко выраженными темными прожилками на более светлом фоне, хорошая устойчивость к погодным условиям. Раннее и обильное цветение крупных цветков.

T 4100	'Папа синий' (Daddy Blue), лазурный с темно-синими прожилками
T 4200	'Папа орхидея' (Daddy Orchid) пурпурно-розовые прожилки на беловатом фоне.
T 4120	'Папы мята' (Daddy Peppermint) нежно-розовый с насыщенно-розовыми прожилками, особенно раннее и богатое цветение
T 4230	'Папа красный' (Daddy Red) оловянно-розовый с кирпичными прожилками, особенная окраска из всего ассортимента
T 4480	'Папа сахар' (Daddy Sugar) светло-фиолетовый с пурпурным прожилками, интенсивно окрашенная горловина
T 2680	'Папа смесь' (Daddy Mix) очень рано и обильно цветущая смесь серии в нежной гамме окрасок

Petunia 'Папа смесь'





Petunia F_1 ‘Фантазия смесь’



Petunia F_1 ‘Фантазия красный кристалл’

Petunia Петуния ⊙

‘Фантазия’ (Fantasy) (штучно)
F_1-гибриды многоцветковые
20 см, обильное цветение улучшенных сортов небольших цветков (4 см). Очень компактное строение растений. Превосходит по раннему качеству все остальные виды петуний. Унифицированный ассортимент для горшков, садовых вазонов, кашпо, балконных ящиков, клумб и рабаток. Хорошее прочное качество продукции на готовой к продаже стадии.

T 0740	‘Фантазия синий’ (Fantasy Blue) , темно-синий, несколько более крупный
T 0770	‘Фантазия красный кристалл’ (Fantasy Crystal Red) , светло-красный с темными прожилками
T 0800	‘Фантазия розовый’ (Fantasy Pink)
T 0850	‘Фантазия розовое утро’ (Fantasy Pink Morn) , светло-розовый с белой горловиной
T 0880	‘Фантазия красный’ (Fantasy Red) , светящийся красный со светлой горловиной
T 0870	‘Фантазия лососевый’ (Fantasy Salmon) светлый лососево-розовый
T 0890	‘Фантазия смесь’ (Fantasy Mix)



Petunia F_1 ‘Хит парад ® синий’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® карминово-белый’

‘Хит парад’® (Hit Parade®) (в гр, штучно и в гранулах) F_1-гибриды крупноцветковые

25 см, очень раннее начало цветения, ампельные мелколиственные растения. Крупные, благородные цветы, светящиеся окраски. Унифицированное раннее качество ассортимента.

T 1690	‘Хит парад ® синий’, насыщенно-синий
T 1680	‘Хит парад ® синяя звезда’, темно-синий с белой звездой
T 1810	‘Хит парад ® карминово-белый’ светящийся карминовый с белой звездой
T 1700	‘Хит парад ® лососевый’, светящийся, интенсивный
T 1720	‘Хит парад ® розовый’, светящийся
T 1800	‘Хит парад ® розово-красный’, светящийся карминово-красный
T 1780	‘Хит парад ® красный’, алый
T 1820	‘Хит парад ® красно-белый’, алый с белой звездой
T 1760	‘Хит парад ® винно-красный’
T 1880	‘Хит парад ® белый’, крупные цветы
T 1890	‘Хит парад ® винно-белый’ белая звезда на винно-красном фоне
T 1910	‘Хит парад ® смесь’ ранняя крупноцветковая смесь серии



Petunia F_1 ‘Хит парад ® лососевый’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® розовый’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® розово-красный’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® красный’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® красно-белый’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® винно-красный’

Petunia F_1 ‘Хит парад ® синяя звезда’





Petunia F_1 ‘Хит парад ® винно-белый’



Petunia F_1 ‘Хит парад ® белый’

Petunia Петуния ⊙

‘Пикоти’ (Picotee) (в гр или штучно)
F_1-гибриды крупноцветковые

25 см, крупные цветы, белый окрас с каймой или «рваной» линией. Хорошая светящаяся окраска и яркость

T 2420	‘Пикоти синий’ (Picotee Blue) темно-синий с «рваным» белым краем
T 4400	‘Пикоти красный’ (Picotee Red) алый окрас с белым краем, слегка гофрированный
T 2470	‘Пикоти розовый’ (Picotee Rose), светящийся карминовый с белой каймой
T 4880	‘Пикоти смесь’ (Picotee Mix) смесь из розового, красного, фиолетового и синего, все с «рваным» белым краем
T 2650	‘Халахуп розовый’ (Hulahoop Rose) светящийся карминовый с белой каймой, особенно раннее цветение
T 4380	‘Красное утро’ (Red Morn) светло-красный с большой кремовой горловиной, раннее цветение, компактный рост



Petunia F_1 ‘Пикотее смесь’



‘Халахуп розовый’



‘Пикоти синий’



‘Пикоти красный’



‘Пикоти розовый’



‘Красное утро’

‘Соня’® (Sonja®) (в гр, штучно и в пилюлях)
F_1-гибриды floribunda

25 см. Устойчивость к атмосферным воздействиям и обширное цветение как у сортов многоцветкового типа и величина цветков почти как у крупноцветкового типа. В открытом грунте ‘Соня’® устойчива и способна к быстрой регенерации из-за плохих погодных условий, чем превосходит большинство крупноцветковых сортов. Идеально для посадки в садах и для городского озеленения.

T 1120	‘Соня® синий’
T 1130	‘Соня® бриллиантовый розовый’, со светящимся прожилками
T 1300	‘Соня® бургундский’, винно-красный
T 1250	‘Соня® бургундский со звездой’ белая звезда на винно-красном фоне
T 1110	‘Соня® ледяная вода’, голубой с темно-синими прожилками
T 1220	‘Соня® орхидея’
T 1290	‘Соня® румянец’ багровый с «рваным» белым краем
T 1160	‘Соня® розовый’
T 1380	‘Соня® розовый со звездой’, малиново-розовый
T 1170	‘Соня® красный’
T 1230	‘Соня® белый’
T 1330	‘Соня® смесь’



‘Соня® синий’



‘Соня® бриллиантовый розовый’



‘Соня® бургундский’



‘Соня® ледяная вода’



‘Соня® орхидея’



‘Соня® румянец’



‘Соня® розовый’



‘Соня® розовый со звездой’




‘Соня® красный’



Petunia F_1 ‘Соня® бургундский со звездой’



Petunia F_1 ‘Соня® белый’



Petunia F_1 'Солнечное сияние'



Petunia F_1 'Лавандовый шторм'

Petunia Петуния ⊙

различные оригинальные окраски (в гр и штучно)
F_1-гибриды крупноцветковые

T 4330 'Лавандовый шторм'(Lavender Storm)
30 см, лавандовый, обильное цветение, средне-крупные цветки, компактный рост, очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям

T 4340 'Солнечное сияние' (Prism Sunshine)
25 см, светло-желтый с темными прожилками, не бледнеет, крупные цветки, обильное цветение, стремительный рост

Махровые Петунии (в гр и штучно)
F_1-гибриды многоцветковые


T 9410 'Удача смесь махровых' (Bonanza Gef_llte Mix)
30 см, богатая смесь различных окрасок, множество махровых цветков

Allgefuellte Petunien Махровая петуния (в гр и штучно)
F_1-гибриды крупноцветковые

T 9900 'Карликовая смесь махровых' (Allgefüllte Zwerg)
25 см, низкорослые петунии для горшка в прекрасной смеси. Крупные, благородные, гофрированные цветы. Раннее начало цветения, лидирующая селекция

Phalaris canariensis смотри
Benary · Однолетние декоративные травы

Phlox drummondii
Флокс Друммонда ⊙ Bie



Phlox 'Красота смесь'

Применение:	для рабаток, вазонов, балконных ящиков, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	с середины апреля по июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с середины января по май; открытый грунт: с апреля (после заморозков)
Прорастание:	10-14 дней при 15-18 °C
Условия прорастания:	в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев ставят на свет, сокращают влажность субстрата и удобряют с 75 мг азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. В течение первых 4 недель проростки восприимчивы к высокой концентрации соли.
Температура:	15-17 °C дневную температуру и 13-15 °C ночную температуру. Температура вентиляции: 20 °C. Растение переносит температуры ниже 10 °C, но это замедляет рост.

U 0470 'Красота смесь' (Beauty Mix) (в кг)
20 см, крупные цветки, разнообразные чистые светящиеся краски, VI-X

U 0600 'Колдовство звезд' (Sternenzauber) (в кг)
15 см, смесь из цветов-звёздочек, VI-X

Phlox paniculata
Флокс метельчатый ♃ ⚔ F

Применение:	образующий куст многолетник, медонос, на срезку
Сроки продажи:	октябрь - март, май - декабрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для продажи цветущих растений с августа; апрель-июль для продажи цветущего товара с мая следующего года; январь-март на срезку
Проращивание:	7-14 дней при 15-18 °C; 14-24 дня при 0-4 °C; 7 дней при 10 °C; Затем при 12-18 °C
Условия проращивания:	в темноте и прохладе. Посевы присыпают вермикулитом, песком, субстратом, поддерживают постоянную влажность и следуют температурной схеме. Изменения температуры содействуют процессу проращивания. Всходы могут появляться неравномерно.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Для зимовки в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено и у него должно быть 8-12 листьев. Вернализация необязательна для индукции цветения, но 10-15 недель при 5 °C обеспечивают роскошное, равномерное цветение, а также прекрасные длинные стебли. Выгонка при 18-21 °C или в прохладе при 10-12 °C. Для обеспечения многократного цветения необходимы высокие температуры и длительный световой день.

U 0950 'Новые гибриды смесь' (Neue Hybriden Mix) (в кг)
90 см, самая прекрасная смесь с улучшенным цветовым спектром, от белых, лососевых, желтовато-розовых, лососево-красных до насыщенно-розовых, лиловых, фиолетовых, бордо и карминовых, богатое цветение, при посеве в начале января цветение в августе того же года, VII-IX, ⚔



Phlox 'Новые гибриды смесь'

Physalis alkekengi
(Physalis alkekengi var. franchetii, Physalis bunyardii) Физалис франшетти ♃ ⚔

Применение:	многолетник для рабаток, контейнера, декоративные плоды для получения срезки и засушивания
Сроки продажи:	май-октябрь; срезка: август-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-май для цветения с июля; август-сентябрь для цветения в следующем году
Проращивание:	7-14 дней при 15-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру на 15-18 °C и сокращают влажность.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Чем ниже температура культивирования, тем компактнее растения. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 8-9 недель при 12-18 °C.

U 1050 Physalis alkekengi (в кг)
90 см, привлекательное растение с декоративными плодами, белесые неприметные цветы, ярко оранжевые «фонарики» (сомкнутые чашелистики) с красными плодами на срезку и засушивания, культивируется как однолетник, VIII–IX, ♧



Physalis alkekengi



Physostegia ‘Снежная крона’®



Physostegia ‘Розовая королева’

Physostegia virginiana Физостегия виргинская ♃ ⚔

Применение:	сильно-растущий многолетник для групп и срезки, посадки в вазоны, медонос
Сроки продажи:	июнь-октябрь; срезка: январь-март и июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	‘Розовая королева’: январь-март для не цветущего товара летом; ‘Снежная крона’ ®: декабрь-февраль для цветения с мая - июня; ‘Розовая королева’ и ‘Снежная крона’ ®: июль-август для цветущего товара в следующем году
Проращивание:	7-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом или песком и поддерживают постоянную влажность. Избегают прямого солнечного света. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C, сокращают влажность в субстрате и далее культивируют при пониженной влажности. Всходы не переносят переувлажнения.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Вернализация необязательна для индукции цветения, но она способствует равномерному и обширному цветению. Выгонка за 10-12 недель (‘Снежная крона’ ®) и соответственно 12-15 недель (‘Розовая королева’) в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-13 °C. Чем теплее культивирование, тем короче его срок. При зимовке растение должно быть хорошо укоренено.

U 1140 ‘Розовая королева’ (Rose Queen) (в гр)
75 см, розовые колосовидные соцветия, VI-IX, ⚔

U 1180 ‘Снежная крона’® (Schneekrone®) FastraX (Benary) (в гр)
75 см, белые колосовидные соцветия, обширное цветение, хорошо культивируется как однолетник, VII–IX, ⚔

Polygonum capitatum (Persicaria capitata) Горец ⊙

Применение:	как горшечное растение, для клумб и создания «ковров», медонос
Сроки продажи:	горшечное растение и для клумб: май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-май для цветения с июля; июнь-июль для цветения с августа
Проращивание:	5-10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно понижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Избегают прямого солнечного света во время проращивания.
Температура:	12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью. Температура вентиляции: 20 °C. Прохладные температуры обеспечивают прекрасное компактное строение растений, но продлевают время культивирования на 1-2 недели.

U 1250 ‘Афганец’ (Afghan) (в гр)
15 см, светло-розовые колосья цветов над зелено-коричневым ковром листвы, VII–IX

Polypogon monspeliensis смотри Benary · Однолетние декоративные травы



Polygonum ‘Афганец’

Potentilla nepalensis Лапчатка непальская ♃

Применение: почвопокровник, для альпинариев, рабатки, медонос
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для не цветущего товара; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание: 5-10 дней при 20-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка в тепле за 8-10 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Чем выше температура культивирования, тем короче его срок.

U 1830 'Мисс Виллмотт' (Miss Willmott) (в гр)
50 см, светящийся кармино-розовый с темным глазком, обильное, продолжительное цветение, VI–VIII, ○–◐


Potentilla 'Мисс Виллмотт'

Primula auricula смотри Primula x pubescens

Primula denticulata Примула, первоцвет мелкозубчатый ♃

Применение: многолетник для альпинария, привлекательное весеннее горшечное растение
Сроки продажи: февраль-май
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: середина апреля – середина мая для цветения с февраля
Проращивание: 10-15 дней при 15-20 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. Для хороших всходов требуется высокая влажность воздуха. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата, но обращают внимание на равномерную влажность субстрата. Молодые зародыши не должны ни в коем случае высыхать или быть переувлажненными. Посевы не ставят под прямой солнечный свет. Без дополнительного удобрения растения очень медленно растут, поэтому со стадии II начинают еженедельно удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного сложного удобрения.
P. denticulata восприимчива к солям.
Температура: 13-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка с 50-й недели за 6-8 недель в прохладе при температуре от 8-10 °C или в тепле за 4-6 недель при 20 °C дневной и 5 °C ночной температуры (самое быстрое развитие цветов). Криотерапия может заменяться стимуляторами корнеобразования, содержащими гиббереллиновые кислоты.

U 3850 'Светло-лиловый' (Helllila) (в гр)
30 см, шарообразные цветы, IV–V
U 3910 'Ронсдорфер гибриды' (Ronsdorfer Hybriden') (в гр)
30 см, крупные цветки, различные окраски, шарообразные цветы, IV–V
U 3980 'Рубин' (Rubin) (в гр)
30 см, пурпурно-красный, селекция Benary, IV–V
U 3880 'Снежок' (Schneeball) (в гр)
30 см, белые, большие цветы, IV–V


Primula 'Снежок'


Primula 'Ронсдорфер гибриды'


Primula 'Светло-лиловый'


Primula 'Рубин'



Primula ‘Крещендо® смесь серии’



‘Крещендо® прекрасный розовый’




‘Крещендо® синие тона’



‘Крещендо® золотисто-желтый’



‘Крещендо® огненно-красный’



‘Крещендо® примульно-желтый’



‘Крещендо® белоснежный’



‘Крещендо® розовые тона’

Primula elatior Примула высокая ♃

Применение:	горшечное растение, для клумб и создания «ковров», срезка
Сроки продажи:	март-май
Форма посевного материала:	очищенные семена Срок посева: май-июнь для цветения с марта с зимовкой без заморозков (не отапливаемая теплица); март-май с зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
Проращивание:	20-30 дней при 18 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, сильно увлажняют и предварительно дают семенам набухнуть 8-10 дней в не отапливаемой теплице при 14 °C (более равномерное и ускоренное проращивание). Самый поздний срок установки посевов в теплице при 18 °C с десятого дня, медленно приучают к свету. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и при интенсивном солнечном освещении притеняют.
Температура:	10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике, при укрытии нетканым полотном. Розетка листьев должна быть хорошо сформирована перед зимовкой. Температурные перепады (10-12 °C дневная температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель значительно содействуют образованию почек при зимовке. Выгонка с 45-й недели за 12-15 недель при температуре 10-14 °C. Более высокие температуры уменьшают качество цветов и побегов и способствуют росту лиственного покрова. Для производства срезки выращивают отдельными партиями в не отапливаемой теплице при 10-12 °C. Цветущие растения могут хорошо храниться при температуре 0,5-2 °C (до 4-х недель).

‘Крещендо’® (Crescendo®) (штучно) Benary-F_1-гибриды

30 см, абсолютно зимостойкий, идеально для продажи молодых растений. Крупные цветы, сочные, популярные краски и очень богатое цветение. Один из лучших для выращивания цветов на срезку и поздних продаж примул в горшке.

U 4000	‘Крещендо® прекрасный розовый’ оживленные розовые тона с лососевым отливом
U 4040	‘Крещендо® синие тона’
U 4100	‘Крещендо® золотисто-желтый’, очень интенсивный
U 4140	‘Крещендо® огненно-красный’
U 4220	‘Крещендо® примульно-желтый’
U 4180	‘Крещендо® белоснежный’
U 4160	‘Крещендо® розовые тона’
U 4290	‘Крещендо® смесь серии’, из вышеперечисленных окрасок

Primula malacoides Примула мягковатая

Применение:	горшечное растение, для клумб
Сроки продажи:	декабрь-апрель
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	июнь-начало июля для цветения с декабря; с середины по конец июля для цветения с января; в начале августа для цветения ко Дню Святого Валентина
Проращивание:	10-15 дней при 15-18 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и сильно увлажняют. Избегают прямого солнечного света. Для хороших всходов необходима высокая влажность воздуха. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата, но обращают внимание на равномерную увлажненность субстрата. Всходы не должны ни в коем случае пересыхать. Без дополнительного удобрения растения очень медленно растут. Поэтому со стадии II* начинают еженедельно удобрять по 50 мг азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. Примула Malacoides восприимчива к содержанию солей. Посевной материал не хранят.
Температура:	15-20 °C летом для выращивания молодых растений. Температура вентиляции: 20 °C. Осенью снижают температуру до 10-15 °C и зимой до 8-10 °C. Для образования цветов нуждается в 30-40 коротких световых днях с температурой 10 °C. Идеальная температура для развития цветов: 12-15 °C, к концу культивирования должна опускаться до 10-12 °C для лучшей окраски цветков. При более высоких температурах ослабевает окрас цветов. Температуры ниже 6 °C приводят к задержке роста и хлорозу. Температуры выше 20 °C приводят к снижению тургора листьев и вытягиванию стеблей цветов. Летом культивируют при минимально возможных температурах и своевременно проветривают.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

U 6220 'Специальная смесь' (Spezial Mix) (в гр)
20 см, смесь из розовых, карминовых, красных, лиловых, белых и двуцветных окрасок. Много бутонов на стеблях расцветают одновременно и образуют раскидистый, пирамидального типа роста компактный куст.


Primula 'Красный агат'


Primula 'Королева рынка'


Primula 'Яблоневый цвет'


Primula 'Белый великан'

Primula obconica
Примула обратноконическая

Применение:	горшечное растение и как культура для холодного выращивания
Сроки продажи:	круглый год, основная партия: март-май и сентябрь-ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	июль для продажи с марта-апреля; март для продажи с сентября-октября; май-июнь для продажи с декабря-января
Проращивание:	10-20 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную повышенную влажность. Избегают прямого солнечного света. Для хороших всходов необходима высокая влажность воздуха. Кратковременное пересыхание субстрата более чем на 30 мин. или температура выше 25 °C могут препятствовать проращиванию. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата, но обращают внимание на равномерное увлажнение почвы. Молодые растения не должны ни в коем случае пересыхать. Без дополнительного удобрения растения очень медленно растут. Поэтому со стадии II* начинают еженедельно удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. P. obconica восприимчива к концентрации солей.
Температура:	16-18 °C дневная и 12-15 °C ночная температура. Температура вентиляции: 18 °C. Идеальная температура для развития цветов: 12-15 °C. Температуры ниже 10 °C ведут к замедлению роста, а ниже 8 °C к хлорозу. Температуры выше 18 °C приводят к потере тургора листьев и вытягиванию стеблей цветов.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

U 6320 'Яблоневый цвет' (Apfelbl_te) (в гр)
25 см, распускается в нежных тонах, позже темнеет до лососево-розового компактный рост
U 6500 'Тёмно-синий' (Dunkelblau) (в гр), 25 см, хорошая окраска
U 6460 'Королева рынка' (Marktkoenigin) (в гр)
25 см, темно-красный, очень крупные цветы, раннее цветение
U 6480 'Красный агат' (Roter Achat) (в гр)
25 см, двуцветная окраска красный и белый, ранний
U 6310 'Белый великан' (Weisse Riesen) (в гр), 25 см, крупные цветки
U 6680 'Смесь' (Mix) (в гр)
25 см, смесь из вышеперечисленных окрасок.


Primula 'Яблоневый цвет'



Primula ‘Аурикула смесь’

Primula x pubescens (Primula Hortensis-Hybriden, Primula Auricula-Hybriden) Примула ушковая гибридная ♀

Применение: горшечные растения, для клумб и альпинариев, рокариев
Срок продажи: март-май
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: ноябрь-март для цветения с марта с зимовкой без заморозков (не отапливаемая теплица); март-май с зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
Проращивание: 14-21 день при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, сильно увлажняют и предварительно дают семенам разбухнуть 8-10 дней в неотапливаемой теплице при 14 °C (более равномерное и ускоренное проращивание). Через 10 дней (не позднее) посевы помещают в теплицу при температуре 18-22 °C, медленно приучают к свету. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и при сильном солнечном освещении притеняют. Возможно неравномерное прорастание.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике. Растение при зимовке с заморозками укрывают нетканым полотном. Розетка листьев должна быть хорошо сформирована перед зимовкой. Температурные перепады (10-12 °C дневная температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель значительно содействуют образованию почек при зимовке. Выгонка с 51-й недели за 12-15 недель при температуре 10-14 °C. Более высокие температуры снижают качество цветов и побегов и способствуют росту лиственного покрова.

U 5070 ‘Аурикула смесь’ (Aurikel-Mix) (в гр)
20 см, бархатные, богатые краски, ароматная, IV–V

Primula rosea Примула розовая ♀

Применение: горшечные растения, для клумб и создания «ковров», посадки на влажных зонах у водоёмов
Сроки продажи: февраль-апрель
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: май-июнь для цветения с марта с зимовкой без заморозков (не отапливаемая теплица); январь-март с зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
Проращивание: 20-30 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, сильно увлажняют и предварительно дают семенам разбухнуть 8-10 дней в неотапливаемой теплице при 14 °C (более равномерное и ускоренное проращивание). Через 10 дней (не позднее) посевы помещают в теплицу при температуре 18-22 °C, медленно приучают к свету. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и при сильном солнечном освещении притеняют. Возможно неравномерное прорастание. Используют только свежий посевной материал. Если посевы не взошли, снижают температуру на 3-4 недели до 5 °C, чтобы заставить зародыш проснуться. Затем снова повышают температуру до 18-22 °C.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике. Растения при зимовке с заморозками укрывают нетканым полотном. Розетка листьев должна быть хорошо сформирована перед зимовкой. Температурные перепады (10-12 °C дневная температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель содействуют образованию почек при зимовке. Выгонка при температуре 10-14 °C. Более высокие температуры снижают качество цветов и побегов и способствуют росту лиственного покрова.

U 2670 ‘Гигас’ (Gigas) (‘Крупноцветковая’) (в гр)
20 см, большие, яркие карминово-розовые цветы, длинные стебли. Листья собраны в розетку. Прекрасное растение для создания «ковров», III–IV



Primula ‘Гигас’

Посев
Открытый грунт
Теплица/ящик без заморозков, культивирование в прохладе и свежем воздухе
Отапливаемая теплица 3–5 °C, при солнечном свете не более 10 °C
Дальнейшее выращивание
*1 Выращивание на срезку цветов
*2 Выращивание более устойчивых растений с посевом в феврале-марте
Цветение

СХЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИМУЛ ИЗ АССОРТИМЕНТА BENARY

Сорт	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Дек	Янв	Фев	Март	Апр
‘Крещендо’®	*2							*1		
Primula denticulata										
Primula rosea ‘Гигас’										

Primula vialii (Primula littonia) Примула Виаля ♃

Применение: растения для горшка, клумб, создания «ковров», посадки на влажных зонах у водоёмов, срезки
Сроки продажи: май-июль, срезка: май-июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: май-июнь для цветения с марта при зимовке без заморозков (не отапливаемая теплица); январь-март с зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
Проращивание: 20-30 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, сильно увлажняют и предварительно дают семенам разбухнуть 8-10 дней в не отапливаемой теплице при 14 °C (более равномерное и ускоренное проращивание). Самый поздний срок установки посевов в теплице при 18-22 °C с десятого дня, медленно приучают к свету. После появления первых листьев снижают влажность субстрата и при сильном солнечном воздействии притеняют. Возможно неравномерное прорастание. Используют только свежий посевной материал. Если посевы не взошли, снижают температуру на 3-4 недели до 5 °C, чтобы заставить зародыш проснуться. Затем снова повышают температуру до 18-22 °C.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике. Растения при зимовке в открытом грунте с заморозками укрывают нетканым полотном. Розетка листьев должна быть хорошо сформирована перед зимовкой. Температурные перепады (10 -12 °C дневная температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель значительно содействуют образованию почек при зимовке. Выгонка при температуре 10-14 °C. Более высокие температуры снижают качество цветов и побегов и способствуют росту лиственного покрова.

U 2820 Primula vialii (в гр)
60 см, светящийся карминово-пурпурные, вытянутые колосья цветков с отдельными светло-розовыми цветками. Идеально для культивирования в неотапливаемых теплицах и открытом грунте. ⚔



Primula vialii



Primula vialii

Prunella grandiflora
Черноголовка крупноцветковая ♃

Применение: растение для горшка и альпинария, рабатки, почвопокровник, для посадки в вазоны, медонос
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль-март для цветения с июня; июнь-июль для цветущего товара в следующем году
Проращивание: 14-21 день при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. Во время проращивания необходима 100% влажность субстрата. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 18 °C. Далее культивируют сохраняя постоянную влажность. Используют только свежие семена.
Температура: 15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После укоренения снижают температуру до 12-15 °C или высаживают растения в открытый грунт. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом грунте укрывают нетканым полотном от воздействия прямого солнечного света. Выгонка в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 12-15 °C. Чем прохладнее растение культивируется, тем компактнее будет рост и тем выше будет качество растения.

U 7140 'Белла насыщенно-розовый' FastraX
(Bella Tiefrosa) (Benary) (штучно)
15-20 см, не требующий вернализации многолетник с интенсивно розовыми цветами, богатое цветение, компактный рост, VI-VIII



Prunella 'Белла насыщенно-розовый'



Prunella 'Белла насыщенно-розовый' в композиции



Pulsatilla vulgaris

Pulsatilla vulgaris (Anemone pulsatilla)
Прострел обыкновенный ♃

Применение:	многолетник для альпинариев и песчаных садов-степей, а также для обрамления лесных посадок, медонос, экстенсивное озеленение
Сроки продажи:	не цветущие растения: сентябрь-октябрь; цветущие: февраль-апрель
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева: для	январь-апрель для не цветущего товара; май-июль цветущего в следующем году товара
Проращивание:	7-14 дней при 3-5 °C, затем 12-18 дней при 17-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и держат при постоянной влажности. Всходы не подвергают воздействию прямого солнечного света. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и снижают температуру до 15 °C. Используют только свежие семена. Возможно неравномерное прорастание.
Температура:	12-15 °C и соответственно выращивание в открытом грунте. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения не должны быть слишком маленькие перед зимовкой. В противном случае они не смогут развить достаточное количество цветов весной. Выгонка начиная с середины декабря (50-я неделя) при температуре 12-15 °C.

A 6060 Pulsatilla vulgaris (в гр)
20 см, большие, фиолетовые цветы с выделяющимися желтыми сердцевинами с пыльцой, прекрасные декоративные плоды, III-IV

Rhodochiton Родохитон ⊙

Применение:	вьюн для балконных ящиков, кашпо, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	с середины апреля по июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	ноябрь-март для цветения с мая - июня
Проращивание:	5-10 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают, держат при равномерной влажности и ставят под свет. Избегают прямого солнечного света. После развития первых листьев удобряют по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения и сокращают влажность в субстрате. В течение первых 4 недель всходы очень восприимчивы к высоким концентрациям солей.
Температура:	20-25 °C дневная температура и 15 °C ночная. Растения в течение короткого периода выдерживают снижение температуры ниже 15 °C, но это сильно сдерживает рост. Незадолго до продажи растения закаливают при 12-15 °C. Rhodochiton не морозоустойчив. Зимовка возможна при 5-10 °C.

U 7990 Rhodochiton atrosanguineus (штучно)
300 см, фиолетово-красный, темно-фиолетовые цветы опадают очень быстро, светло-фиолетовые чашелистики очень долго остаются на растении. Привлекательный вьюн, замечательно подходит для посадки в кашпо. VII-X,



Rhodochiton atrosanguineus

Ricinus communis Клещевина обыкновенная

Применение:	привлекательное растение-солитер для клумб и больших вазонов, декоративнолиственное растение, ядовитое, лечебное растение
Сроки продажи:	в середины апреля по июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль для продажи с апреля; март-апрель для продажи с мая; во второй половине июня для продажи с августа
Проращивание:	6-12 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семенам дают разбухнуть в тёплой воде 24 часа. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. Избегают прямого солнечного света. После развития первых листьев удобряют по 1000 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения, сокращают влажность в субстрате и снижают температуру до 16-18 °C.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Растение переносит температуры ниже 10 °C, но они сильно замедляют рост. Незадолго до продажи растения закаливают при 10-12 °C. Ricinus не морозоустойчив.

U 8070 'Карменчита® розовый' (Carmencita®) (Benary) (в кг)
150 см, темно-зеленая листва, красноватые стебли, лососево-розовые кисти плодов, привлекательное декоративнолиственное растение.

U 8050 'Карменчита® красный' (Carmencita®) (Benary) (в кг)
150 см, интенсивно окрашенные темно-коричневые листья, ярко красные бутоны и кисти плодов, которые появляются очень рано.

U 8120 'Сангвинеус' (Sanguineus) (в кг)
200 см, зелёный лиственный покров с красными прожилками и стволом. Кроваво-красные кисти с плодами. Высокодекоративный.

U 8230 'Занзибарская смесь' (Zanzibarensis Gemischt) (в кг)
200 см, огромные листья, пестрые, декоративные и крупные плоды.





Ricinus 'Санвинеус'



Ricinus 'Карменчита® красный'

Rosa chinensis Роза китайская

Применение:	почвопокровник, горшечное растение
Сроки продажи:	февраль-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	круглый год; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание:	20-30 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. Обращают внимание на высокую влажность воздуха. После появления первых листьев снижают температуру до 16 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	17-20 °C. Избегают температуры ниже 14 °C во время фазы роста. При низких температурах сильно замедляется образование цветков и образуются пустые побеги. Зимовка возможна при 3-5 °C. Выгонка за 6-8 недель в тепле при 18-20 °C. Положительные дневные и ночные температуры обеспечивают образование побегов и обильное цветение. Колебание температур обеспечивает компактность роста. Хранение готовых к продаже роз возможно при 5 °C.

U 8330 'Цветы ангела' (Engelroeschen) (Benary) (в кг)
40 см, улучшенная селекция в белых и розовых тонах, махровые цветы, а также полумахровые и простые. Выращенные из семян растения цветут уже через 5-6 месяцев, VI-X



Rosa 'Цветы ангела'



Ricinus 'Карменчита® розовый'



Rudbeckia 'Золотой шторм' посевной материал ApeX

Rosmarinus officinalis смотри Benary · Пряные травы


Rudbeckia Рудбекия ♃ ⚔

Применение:	многолетник для групп, клумб, горшка, медонос, 'R. speciosa': цветок на срезку и как сухоцвет
Сроки продажи:	не цветущие растения: март-октябрь; цветущие: с июня по сентябрь; срезка: август-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена, 'Золотой шторм': в ApeX-Seed
Срок посева:	с января по июнь, ранние посевы цветут обильно, но несколько нерегулярно, поэтому рекомендуется вернализация; июнь-август с цветением в следующем году
Проращивание:	7-15 дней при 20-22 °C или 7 дней при 30-31 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность, но не в сырости, после появления первых листьев снижают температуру до 18 °C, сокращают влажность субстрата и начинают удобрять (50-75 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения). Rudbeckia чувствительна к концентрации солей в стадии проростка. Возможно неравномерное прорастание. При низкой всхожести семена R. fulgida помещают в прохладу 0-4 °C на 4-6 недель. Затем на 1 неделю при 10 °C и далее культивируют, снова повысив температуру до 12-15 °C.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения после зимовки имеют лучшее строение, а также более унифицированное цветение. Перед зимовкой растения должны сформировать минимум 8-10 листьев. Выгонка за 10-12 недель (R. speciosa) и соответственно 12-14 недели ('Золотой шторм') в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C.

U 9460 Rudbeckia fulgida 'Золотой шторм' (Goldsturm) (в кг)
(R. sullivantii 'Золотой шторм')
70 см, золотистые с темной сердцевиной цветки, длительное и массивное цветение, VII–X

U 9460T Rudbeckia fulgida 'Золотой шторм' (штучно) Benary APEX SEED
(R. sullivantii 'Золотой шторм')
70 см, ApeX для более быстрого проращивания и более высокой всхожести, на 25% больше выход молодых растений.

U 9820 Rudbeckia speciosa (в кг)
(R. newmanii, R. fulgida var. speciosa)
60 см, желтый с черной сердцевиной, идеально на срезку, VIII-IX, ⚔



Rudbeckia 'Золотой шторм' ApeX(л.) и простые семена (п.)

RUDBECKIA

Die Saisonverlängerer

- Управление культивированием за счёт освещения и температур
- Отличная приспосабливаемость, устойчивое цветение
- Светящиеся окраски и импозантный внешний вид
- Длинный сезон продажи с мая по сентябрь
- Разнообразие типов роста, различные варианты использования
- Стимулирование сбыта за счёт Point-of-Sale материалов



Rudbeckia ‘Toto®
смесь’



‘Toto® золотистый’



‘Toto® лимонный’



‘Toto® простой’



‘Кордоба’



Rudbeckia hirta Рудбекия мохнатая

Применение:	для посадки в группах и на клумбах, как горшечное растение, срезка
Сроки продажи:	апрель - конец сентября
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена в оболочке
Срок посева:	ноябрь: «Солнце прерий» для продажи с апреля; январь: 'Toto' ®, ‘Сонора’, 'Майя' для продажи с апреля; апрель: 'Toto ®, ‘Сонора’, 'Майя', «Солнце прерий» для продажи с июня-июля
Проращивание*:	Стадия I+II: 14-21 день при 20-22 °C Стадия III+IV: 10-14 дней при 18-20 °C.
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают и поддерживают постоянную влажность
Температура:	18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. R. hirta нуждаются в тепле. Понижение температуры ведет к продлению срока культивирования (при 16 °C примерно на 3 недели дольше). Температуры ниже 16 °C ведут к покраснению лиственного покрова.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Компактные сорта

Toto® -серия (штучно)

30-40 см, величиной 5-7 см круглые цветы, компактный, хорошо разветвленный рост, раннее и богатое цветение, идеально для культивирования в горшке 10-12 см. Мини-'Toto'® имеют высокий рыночный потенциал. Мини-'Toto'® можно получать за счёт регулирования длины светового дня. Для этого после индукции цветения (1-2 недели после пересадки в горшок) культивировать при коротком световом дне (10 часов) более 6-7 недель вплоть до готовности к продаже. Мини -'Toto'® распускаются устойчивыми средней величины цветками и образуют обильный листовой покров, так что они укрывают горшок 9 см хорошей плотной темно-зеленой листвой. Мини-'Toto'® могут быть подготовлены к продаже с конца апреля. Они показывают хорошую длительность периода продаж, высокое качество обильность цветения и развиваются в условиях длинного светового дня, при различных способах выращивания.

U 8970C ‘Toto® золотистый’ (Toto® Gold)

U 8960C ‘Toto® лимонный’ (Toto® Lemon)

U 8980C ‘Toto® простой’ (Toto® Rustic)

U 8940C ‘Toto® смесь’ (Toto® Mix)

‘Кордоба’ (Cordoba) (Benary) (штучно)

45-50 см хорошо разветвленная структура как у 'Toto'®, но рост как у ‘Сонора’, ‘Кордоба’ является сортом-солитером в ассортименте Rudbeckia от Benary. Ее прекрасное сочетание красок из красного кольца с золотистыми заостренными лепестками, равномерный рост с множеством побегов были отмечены Fleuroselect знаком Quality.

U 8880C ‘Кордоба’

Рекомендации по возделыванию ‘Toto’® и «Солнце прерий» от Benary

При "коротком световом дне" (10 часов) после индукции цветов можно получить, в зависимости от срока использования «короткого дня», самый различный внешний вид растений. Растения заметно компактнее с множеством побегов и пышным цветением. Высоту роста ‘Солнце прерий’ можно очень хорошо регулировать с помощью регуляторов роста. Это повышает экономичность производства и расширяет ассортимент выпускаемой продукции.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. /0049/ 5541 7009 0

Ассортимент Rudbeckia из: «Солнце прерий», ‘Toto® золотистый’, ‘Цвета осени’, 'Майя'

MAYA Майя (Maya) (Benary) (штучно)

40-50 см, самая низкорослая в мире, густомахровая Рудбекия с золотистыми цветами (8-10 см), хорошим основным ветвлением, компактным ростом и множеством побегов, устойчивое продолжительное цветение.

U 8850C ‘Майя’



Ассортимент Rudbeckia из: «Солнце прерий», ‘Цвета осени’, ‘Золотые замки’, и ‘Мармелад’

SONORA Сонора (Sonora) (штучно)

45-50 см, ‘Сонора’ подкупает исключительностью своей окраски: комбинация махагоново-коричневого кольца со светящимися золотистыми заостренными лепестками. ‘Сонора’ предлагает большие цветы (12-15 см) на несколько более крупных растениях чем 'Тото'®, и не уступает в разнообразии применения

U 9350C ‘Сонора’

Среднерослые сорта ‘Цвета осени’ (Autumn Colors) (штучно)

50-60 см, исключительная игра цвета: бронзовый с красным кольцом и коричневой «пуговкой» образует привлекательный контраст со светло-желтыми и золотистыми "сортами-сестрами", классическое растение для клумб или в сочетании с декоративными травами. За счёт очень прочных стеблей ‘Цвета осени’ могут очень разнообразно применяться на клумбах и в оформлении ландшафта.

U 9040C ‘Цвета осени’



Rudbeckia ‘Майя’



Rudbeckia ‘Сонора’

PRAIRIESUN «Солнце прерий» (Prairie Sun) (штучно)

70-80 см, очень большие светло-желтые цветы с золотым кольцом вокруг зеленой «пуговки». Они предлагают длительное, устойчивое цветение, устойчивость к засухе и впечатляющий кустистый рост, это хит продаж с июня по сентябрь в горшках диаметром 15-17-см или больше, полностью расцветающее растение для контейнера. Также используется в срезке.

U 9060C «Солнце прерий»



Rudbeckia ‘Цвета осени’

Rudbeckia ‘Солнце прерий’

‘Двойная радость’ (Doppelte Freude) (Gloriosa Double Daisy) (в кг)

75 см, тщательная селекция Benary подарила сорт ‘Двойная радость’ с очень высокой долей махровых и гигантских (12-15 см) золотистых цветов с черной «пуговкой». VIII-X

U 9010 ‘Двойная радость’



Rudbeckia ‘Двойная радость’



Идеи продаж для 'Тото'®, ‘Сонора’®, 'Майя' и ‘Солнце прерий’от Benary

Поднимите уровень продаж:
- Четкие слоганы в Вашей рекламе
- привлекательные постеры в торговом помещении
- информационные свисающие этикетки

По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. /0049/ 5541 7009 0
Получение постеров/этикеток: "floramedia" (etiketten@floramedia.de)

www.Benary.de



Rudbeckia ‘Золотые замки’



Rudbeckia ‘Мармелад’



Rudbeckia ‘Простая’



Sagina subulata



Salvia «Леди в красном»

Salvia coccinea Шалфей, Сальвия красная ⊙

Применение:	растение для клумб, рабаток, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	С апреля по август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения с апреля; июнь для цветения с августа
Проращивание:	5-12 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и поддерживать постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. Сальвии восприимчивы к концентрации солей в почве на стадии проращивания. Посевы не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. По возможности культивируют в прохладе, чтобы получить прекрасное, компактное строение растения. Не переносит заморозки. Зимовка без морозов в неотапливаемой теплице возможна, но не рекомендуется.

V 0550 ‘Леди в красном’ (Lady in Red) (в гр)
30 см, светло-алый, плотные цветки, длительное цветение, хорошо в группе с другими, V-X

Rudbeckia hirta Рудбекия мохнатая

Среднерослые сорта ‘Золотые замки’ (Goldilocks) (Benary) (в кг)

60-70 см, ‘Золотые замки’ Benary выделяется на фоне остальных растений высочайшим качеством. Очень богатое цветение с более высоким процентом густомахровых оранжево-золотых цветов.

U 9140 ‘Золотые замки’

‘Мармелад’ (Marmelade) (в кг)

60-70 см, ' Мармелад ' подкупает теплым золотисто-оранжевым оттенком цветов величиной 10 см; богатое цветение и выносливость, яркое светящееся цветное пятно вплоть до осени. Невысокий, устойчивый сорт.

U 9180 ‘Мармелад’

‘Простая’ (Rustic) (в кг)

60 см, смесь различных желтых и красных оттенков, крупные цветки, прямой рост, устойчивый сорт.

U 9340 ‘Простая’

Rudbeckia purpurea смотри Echinacea purpurea

Sagina (Spergula pilifera) Мшанка ♃ ⊙

Применение:	стелющийся многолетник для посадки на могилах, альпинариях, рокариях, на стыках камней дорожек, почвопокровник
Сроки продажи:	не цветущий товар: март-октябрь; цветущий: июнь-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель для не цветущего товара; февраль-март для цветения с июня; в середине июля - конце августа для цветущих в следующем году растений
Проращивание:	5-8 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Посевы не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка за 8-10 недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C. Цветение будет более длительным при пониженных температурах. Не переносит высокие температуры.

V 0030 Sagina subulata Мшанка шиловидная (в гр) FastraX
5-10 см, звездчатые белые цветы, вечнозеленый образующий сплошной коврик многолетник, идеально для посадки на могилах или в стыках дорожек, устойчивое, привлекательное растение, VI–VIII, △



Rudbeckia ‘Мармелад’

Salvia farinacea Шалфей, Сальвия мучнистая ⊙

Применение:	для контейнеров, клумб, рабаток, как летнее горшечное растение, срезка
Сроки продажи:	с середины апреля по август, срезка: июнь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-апрель для цветения с апреля; май-июнь для цветения с августа
Проращивание*:	стадия I: 7–12 дней при 18-22 °C Стадия II: 7-12 дней при 18-22 °C Стадия III и IV: 21 день 14-16 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать вермикулитом и поддерживать высокую влажность субстрата. Со стадии II начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения и сокращают влажность в субстрате. Со стадии III увеличивают дозу удобрений до 75 мг Азота на литр воды. В стадиях I-III сальвия восприимчива к концентрации солей в почве.
Температура:	14-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C, в стадии почек снижают температуру до 14 °C. Не переносит заморозки.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

V 0750 'Эволюция'® (Evolution®) (штучно)
45 см, длинные темно-синие метелки цветов образуют яркий цветовой контраст с тёмно-зеленой листвой. Хорошо разветвленное, компактное строение. VII-X

V 0700 'Синие группы' (Gruppenblau) (в гр)
90 см, плотные густые соцветия, ⚔

V 0651 'Рекомендация'® (Reference®) (Benary) (штучно)
50 см, новая комбинация красок из синего цветения и белого чашелистика, идеально для посадки на клумбах и создания «ковров» VII–X

V 0711 'Серебро' (Silber) (штучно)
60 см, белый, прекрасное дополнение к сорту 'Виктория', ⚔

V 0741 'Виктория' (Victoria) (штучно)
60 см, темно-синий, плотный, закрытый рост, интенсивное действие окраски, длительное цветение, VII–X, ⚔



Salvia 'Эволюция'®



Salvia 'Эволюция'®



Salvia 'Рекомендация'®

Salvia officinalis смотри Benary · Пряные травы

Salvia patens Шалфей, Сальвия отклоненная ⊙

Применение:	для контейнеров, клумб, рабаток, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	с апреля по август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения с апреля; июнь для цветения с конца августа
Проращивание:	4-7 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и поддерживать постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 17-20 °C, сокращают влажность в субстрате и начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. Сальвии восприимчивы к концентрации солей в почве на стадии проращивания. Посев не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	14-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. В стадии почек снижают температуру до 12-14 °C. По возможности культивируют в прохладе, чтобы ограничить рост побегов. Не переносит заморозки. Зимовка возможна в неотапливаемой теплице.



Salvia 'Серебро'



Salvia 'Виктория'



Salvia 'Синий ангел'

V 0731 'Синий ангел' (Blue Angel) (Benary) (штучно)
60-70 см, исключительные, светящиеся, ультрамариновые губоцветные соцветия величиной 6 см в длинных колосьях, грациозный характер роста, привлекательный вид для летнего горшка, а также для клумб или контейнеров, для хорошо освещенных и теплых мест, цветет с июля и до морозов.



Salvia 'Сальвано'



'Сальвано' посевной материал ApeX



«Девушка с обложки журнала»®



'Огненная звезда'®



'Огонь Иоанна'

Salvia splendens Шалфей, Сальвия блестящая ☉

Применение:	растение для клумб и рабаток, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	с апреля по август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель для цветения с апреля, июнь для цветения с августа
Проращивание:	7-12 дней при 22-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и поддерживать постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 20-22 °C, сокращают влажность в субстрате и начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. Сальвии восприимчивы к концентрации солей в почве в стадии зародыша. Культивируют при постоянном увлажнении.
Температура:	21-24 °C дневная и 13-16 °C ночная температура. Температура вентиляции: 25 °C. Растения перед продажей закаливают при 12-14 °C. Не переносит заморозков.

V 0800 'Карабинер' (Carabiniere) (в гр)
25 см, алый цвет, широкая метелка, темная листва, среднеранний сорт

V 0870 «Девушка с обложки журнала»® (Cover Girl®) (Benary) (в гр)
18 см, насыщенный багровый тон, большие, плотные метелки цветков, унифицированное расцветание, отличный внешний вид, равномерный, широкий кустистый рост в открытом грунте, ранний сорт.

V 0880 'Огненная звезда'® (Fire-Star®) (Benary) (в гр)
25 см, алые, сильные метелки, раннее цветение, привлекательные, быстро продающиеся молодые растения, невероятная по окраске продукция для клумб

V 0840 'Огонь Иоанна' (Johannisfeuer) (Benary) (в гр)
25 см, яркий алый окрас, ранний и выровненно низкорослый сорт, V-X

V 0850 'Светящееся веселье' (Leuchtfunk) (Benary) (в гр)
18 см, пылающий темно-алый цвет, очень низкий рост, ранний сорт, лучший для продажи молодых растений.

V 0830 'Сальвано' (Salvano) (штучно) Benary ApeXseed
25-30 см, ярко-красный, многочисленные плотно собранные метелки цветов, интенсивный, разветвленный от основного стебля рост, очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, замечательно пригодна для сада. Более ранний, чем ''Карабинер'

Salvia superba (Salvia nemorosa) Шалфей, Сальвия пышная ♃ ⚔

Применение:	посадка на клумбах, в вазоны, для подсадки в розарий, медонос, на срезку
Сроки продажи:	май-октябрь, срезка: июнь-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения с июня; август-октябрь для цветения в следующем году
Проращивание:	10-21 день при 22-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет. Обязательно избегают переувлажнения.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 8-10 недель при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C. Чем выше температура выгонки, тем короче срок выращивания, но тогда необходима высокая интенсивность освещения. Культивирование в прохладе обеспечивает компактность растений, но продлевает срок выращивания приблизительно на 3-4 недели



Salvia 'Сальвано'

Salvia superba (Salvia nemorosa)

V 0770 ‘Синяя королева’® (Blaukoenigin®) (Benary) (в гр) FastraX
40 см, темно-фиолетовый. Компактный и сомкнутый рост, интенсивная окраска, ароматный, VI-IX, e

V 0600 ‘Розовая королева’ (Rosakoenigin) (Benary) (в гр) FastraX
60 см, розовый, ароматный, VI-IX, є

V 0760 ‘Фиолетовая королева’ (Violettkoenigin) (в гр) FastraX
60 см, насыщенно-фиолетовый, яркий, ароматный, VI–IX, є



Salvia ‘Синяя королева’®

Salvia viridis (Salvia horminum)
Шалфей, Сальвия хорминум ⊙

Применение: растение для клумб и рабаток, летнее горшечное растение, на срезку
Сроки продажи: с апреля по август, срезка: июль-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: март-апрель для цветения с июня; открытый грунт: после заморозков начиная с мая
Проращивание: 12-20 дней при 18-20 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и поддерживать постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C, сокращают влажность в субстрате и начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. Сальвии восприимчивы к концентрации солей в почве на стадии проращивания. Посевы не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. По возможности культивируют в прохладе, чтобы получить прекрасное, компактное строение растения. Не переносит заморозки.

V 0610 ‘Оксфорд синий’ (Oxford Blue) (в гр)
50 см, сине-фиолетового цвета прицветники с темными прожилками, VI-IX, ⚔
V 0660 ‘Розовое воскресенье’ (Pink Sunday) (в гр)
50 см, светло-розовые прицветники с темными прожилками, VI-IX, ⚔



Salvia ‘Розовая королева’



Santolina ‘Томентоса’

Sanguisorba minor смотри Benary · Пряные травы

Santolina chamaecyparissus (Santolina pinnata subsp. Neapolitana, Santolina tomentosa)
Сантолина кипарисовниковидная ♃

Применение: декоративнолиственное растение, многолетник для альпинария, почвопокровник, для обрамления клумб, экстенсивного озеленения
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для не цветущего товара; июнь-июль с зимовкой
Проращивание: 10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов медленно понижают температуру до 16-18 °C и более сухо культивируют.
Температура: 12-15 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка возможна при 3-5 °C. Для образования цветов требуется вернализация при 3-5 °C. Выгонка при 15-18 °C.

V 0990 ‘Томентоса’ (Tomentosa) (в гр)
30 см, привлекательное декоративнолиственное растение с маленькими желтыми цветами, серебристый вечнозелёный лиственный покров, культивируется как однолетник, VII–IX, ⫶ △ ⌒



Santolina ‘Томентоса’


Sanvitalia procumbens


Sanvitalia 'Золото ацтеков'


'Золото ацтеков' посевной материал ApeX



Sanvitalia speciosa Санвиталия прекрасная

Применение:	для клумб, балконных ящиков, кашпо, как летнее горшечное растение, почвопокровник, для посадки на могилах
Сроки продажи:	с середины апреля по июль
Форма посевного материала:	очищенные семена, 'Золото ацтеков': обработанные семена, ApeX-Seed
Срок посева:	ноябрь-декабрь ранняя продукция для кашпо (ампельная); февраль-март для цветения в начале апреля
Проращивание:	7-12 дней при 18-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления всходы тонко присыпают землей, вермикулитом или песком и ставят на свет. Температуру понижают до 16 °C и удобряют по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. В течение первых 4 недель посевы восприимчивы к высоким концентрациям солей.
Температура:	12-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. При сильной освещенности возможны высокие температуры без ухудшения качества растений. Температуры ниже 8 °C допускаются, но сильно замедляют рост. Растения незадолго до продажи закаливают при 10-12 °C.

V 1050 Sanvitalia procumbens Санвиталия распростертая (в гр)
15 см, желтый с черной сердцевинкой, V-X, _

V 1070 Sanvitalia speciosa 'Золото ацтеков' (Aztekengold) (штучно)
30 см, золотистые, изящные словно звёзды, цветы с желтой сердцевиной. Привлекательный контраст с темно-зеленой листвой. Разветвление сильное и от корня. Прямые от основания, побеги становятся как у почвопокровников при обширных посадках на клумбах, и групповых посадках получается плотный, цветущий ковер.

V 1070T Sanvitalia speciosa 'Золото ацтеков' (Aztekengold), (штучно)
Посевной материал ApeX гарантирует уверенное прорастание и повышенную устойчивость культуры на стадии молодого растения.

Saponaria ocymoides Мыльнянка базиликовидная ♃

Применение:	альпийский почвопокровник для альпинариев и рокариев, экстенсивного озеленения
Сроки продажи:	не цветущие растения: март-октябрь, цветущие: июнь-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с ноября по июль для не цветущих растений; с середины июля по конец августа для продажи с конца февраля цветущих растений
Проращивание:	10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Посевы не ставят под прямой солнечный свет. При слабом прорастании всходы на 4-6 недель ставят в прохладу при 0-4 °C. Затем на 1 неделю при 10 °C и далее продолжают культивировать при повышении температуры до 15-18 °C. Возможно неравномерное прорастание. Старый посевной материал не используют.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка начиная с декабря за 8 недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C.

V 1160 Saponaria ocymoides (в кг)
15-20 см, розовые цветы-звёздочки, рост образует плотный чехол, идеально для альпийских групп, VI–VII, △

Satureja hortensis смотри Benary · Пряные травы

Saxifraga arendsii (Saxifraga Arendsii-Hybriden) Камнеломка Арендса ♃

Применение: стелющийся многолетник для альпинария, для создания «ковров», посадки между камней и на могилах
Сроки продажи: март-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для продажи в марте-июле без цветения; июнь-август для продажи в феврале-мае цветущими
Проращивание: 9-14 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Для зимовки в открытом грунте растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка за 5-7 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C. Температуры выше 20 °C тормозят рост.

V 1270 'Цветущий ковёр' (Bl_tenteppich)_ (в гр)
20 см, различные ярко розовые цветы, вечнозелёный, IV–V
V 1320 'Весенний снег' (Fr_hlingsschnee) (в гр)
25 см, белый, вечнозелёный, IV-V
V 1410 'Пурпурная мантия' (Purpurmantel) (в гр)
20 см, пурпурно-карминовый, вечнозелёный, идеально для альпинария, IV-V, ⁞
V 1490 'Смесь напоминающих мох сортов' (Mischung Moosartiger Sorten) (в гр)
Из вышеупомянутых окрасок, вечнозеленые сорта, IV-V


Saxifraga 'Цветущий ковёр'


Saxifraga 'Смесь напоминающих мох сортов'


Scabiosa 'Олимпия-гибрид'®

Scabiosa Скабиоза ⊙ ⚔

Применение: для контейнера, деревенской клумбы, медонос, на срезку и как сухоцвет
Сроки продажи: с мая по октябрь; с октября по июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: март-май для цветения с июля
Проращивание: 10-12 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом. Поддерживают постоянную влажность, после появления первых листьев уменьшают влажность и снижают температуру до 16-18 °C.
Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 17 °C. Для хорошего качества стеблей культивируют как можно прохладнее.


Scabiosa 'Пинг-понг'

Scabiosa atropurpurea (Скабиоза тёмно-пурпурная)

V 2270 'Олимпия-гибрид'® (Olympia-Hybriden®) (Benary) (в кг)
60 см, привлекательные большие головки цветов светящейся окраски на длинных, прочных стеблях. Специально выведенный сорт для качественной срезки.
VII-IX, ⚔

Scabiosa stellata (звездчатая)

V 2320 'Пинг-понг' (Pingpong) (в кг)
60 см, цветы белые и неприметные, исключительные шарообразные коробочки семян 4 см диаметром на длинных стеблях. Идеально как сухоцвет для изысканных букетов и композиций VI–IX, ⚔


Saxifraga 'Пурпурная мантия'



Scabiosa ‘Фама’®



‘Комплимент’®



‘Perfecta’



‘Перфекта белый’



‘Самые прекрасные сорта’

Scabiosa caucasica
Скабиоза кавказская ♃ ⚔

Применение: для контейнера, вазона, деревенского цветника, медонос, многолетник на срезку

Сроки продажи: с мая по октябрь; возможно раннее культивирование (март - начало апреля); срезка: май-ноябрь

Форма посевного материала: очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed (‘Фама’®)

Срок посева: январь-март для цветения с июня; июнь-август с зимовкой для цветения в следующем году

Проращивание: 10-18 дней при 18-21 °C

Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом. Поддерживают постоянную влажность в субстрате, которую снижают после появления первых листьев. В это же время температуру опускают до 16-18 °C.

Температура: 12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за 10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C.

V 1971C ‘Фама’® (Fama®) (Benary) FastraX (в гр)
50 см, синего цвета, самая интенсивная окраска цветов среди семян скабиозы. Ценный сорт на срезку, ApeX - посевной материал в оболочке позволяет осуществлять машинный посев. VI-IX, ⚔

V 1990 ‘Комплимент’® (Kompliment®) (Benary) FastraX (в гр)
60 см, тёмно-лавандовый, крупные цветки, благородной формы для высококлассной свежей флористики VI–IX, ⚔

V 2010 ‘Перфекта’ (Perfecta) (в гр) FastraX
60 см, лавандовый, VI–IX, ⚔

V 2040 ‘Перфекта белый’ (Perfecta Weiss) (в гр) FastraX
60 см, элегантные белые цветы, VI–IX, ⚔

V 2150 ‘Высшее мастерство’ (Schoenste Spielarten) (в гр) FastraX
60 см, смесь крупноцветковых сортов, синего, белого и лилового тонов VI–IX, ⚔



Scabiosa ‘Фама’® специально подготовленные семена «Coating» и простой посевной материал

Scabiosa japonica var. alpina Скабиоза японская ♃

Применение:	для контейнера, вазонов, рабаток и балконных ящиков, медонос
Сроки продажи:	с мая по октябрь, возможно раннее культивирование (март-начало апреля)
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	круглогодично: март-май для двулетней культуры с выгонкой с 31-32-й недели
Прораживание*:	стадия I: 10-12 дней при 18-21 °C Стадия II-IV:10-12 дней при 16-18 °C
Условия прораживания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом. Поддерживают постоянную влажность, и после появления первых листьев культивируют более сухо.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за 10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

V 2220 'Ритц синий' (Ritz Blau) (штучно) FastraX
15-20 см, лазурное цветение, более рослое и обильно цветущее по сравнению с подобными сортами. Культивируется как однолетник. VI-IX



Scabiosa 'Ритц синий'



Scabiosa 'Ритц синий'

Культурные указания от Benary для Scabiosa japonica var. alpina 'Ритц синий'

Собственные опыты Benary доказывают, что эта скабиоза – исключение, может без особых потерь высаживаться весной, к цветению параллельно с виолами. Возможные сроки продажи, например, в середине марта, в середине апреля и в конце апреля. При выполнении соответствующих схем культивирования.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. /0049/ 5541 7009 0

Schizanthus wisetonensis
Схизантус визетонский ☉ ⓚ

Применение:	как горшечное растение для украшения цветами солнечных окон, для балкона, создания «ковров», украшения могил
Сроки продажи:	горшечные растения: апрель-май, растения для клумб: май-июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	сентябрь-апрель; конец декабря - середина января для продажи в середине мая; февраль-апрель растения для клумб с мая
Прораживание:	7-14 дней при 16-22 °C
Условия прораживания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. Посевам ни в коем случае не дают пересыхать и защищают от прямого солнечного света. После появления первых листьев снижают температуру до 14-16 °C и сокращают влажность в субстрате. Возможно неравномерное прорастание.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После укоренения в горшке температуру можно опускать до 8-10 °C. При низких температурах растения остаются компактными, но продлевается срок культивирования (8 °C: примерно 160 дней, 16 °C: примерно 90 дней). Слишком высокие температуры ведут к бесформенному строению растений.

V 2440 'Парад звёзд'® (Starparade®) (Benary) (в гр)
20 см, еще компактнее и четче, чем сорта 'Хит парад'®. Круглое строение растения, большие цветы, светящиеся краски.




Schizanthus 'Парад звёзд'®


Sedum «Коккинеум»



Sedum ‘Дух’



Sedum ‘Вуду’


Sedum ‘Смесь различных сортов’

Sedum Очиток, Седум ♃

Применение:	привлекательный многолетник для альпинария, декоративнолиственное растение, для создания «ковров» и посадки на могиле, медонос, для экстенсивного озеленения и рокариев, S. arce: для создания «газона», S. reflexum: прямое растение
Сроки продажи:	март-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для продажи с марта по июль без цветения; июнь-август для продажи с февраля по май цветущее растение
Проращивание:	9-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка с середины января за 10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Низкие температуры и сильное солнечное облучение интенсифицируют окраску листа для пестролистных сортов.

V 2610 Sedum acre (Очиток едкий) (в гр)
6 см, желтый, вечнозеленый, образующий «газон», устойчивый, ядовитый, VI–VIII,

V 2700 Sedum reflexum (Очиток отогнутый) (в гр)
(S. rupestre ssp. Reflexum)
20 см, желтый, листья серо-зеленые, колючие, вечнозеленые, пряное растение, VII-VIII

V 2801 Sedum selskianum ‘Дух’ (Spirit) FastraX
Седум Сельского(штучно)
10 см, многолетник для альпинария с бесчисленными, ярко желтыми, цветами-звёздочками, которые образуют прекрасный контраст с зеленой сверкающей листвой. VI-IX

V 2930 Sedum spurium ‘Коккинеум’ (Coccineum) Седум ложный (в гр)
15 см, оживленный тёмно-розовый, лиственный покров от зеленого до красно-коричневого цвета, вечнозеленый, VII-VIII

V 2951 Sedum spurium ‘Вуду’ (Voodoo) Седум ложный (штучно)
15 см, интенсивно окрашенная темно-красная листва, прекрасный круглый рост в горшке, на клумбе - плотный почвопокровник, богатое неоново-розовое цветение с июня по август, привлекательное по структуре вечнозелёное растение, VII-VIII


V 2980 Sedum ‘Смесь различных сортов’ (Viele Sorten Mix) (в гр)
из вышеперечисленных и других окрасок, VI–VIII


Sedum ‘Вуду’

Sempervivum Молодило ♃

Применение: привлекательный многолетник для альпинария, декоративнолиственное растение, для посадки на могилах и создания «ковров», медонос, для экстенсивного озеленения и рокария
Сроки продажи: март-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для продажи в марте-июле без цветения; июль-август для продажи в феврале-мае с цветком
Проращивание: 9-14 дней при 22-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка с середины января за 10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Низкие температуры интенсифицируют окраску листа у пестролистных сортов.

V 3100 'Зимостойкая смесь' (Winterharte Gemischt) (в гр)
5 см, сочные розетки листьев, отдельные стебли цветов, смесь цветов, для скалистых садов, вечнозеленые, привлекательные по структуре растения, VI–VIII, ⁞


Sempervivum 'Зимостойкая смесь'

Senecio cineraria (S. bicolor, S. candicans, Cineraria maritima) Цинерария приморская ⊙

Применение: привлекательное декоративнолиственное растение, для групповых посадок и создания « ковров», посадке на могиле, осенних посадок
Сроки продажи: апрель-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль-июль
Проращивание: 3-10 дней при 22-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. Ни в коем случае не дают посевам пересыхать и защищают от прямого солнечного света. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После укоренения в горшке температуру можно опустить до 10-16 °C. S. cineraria может зимовать только в мягких климатических условиях, соответственно без заморозков при 3-5 °C и выдерживает незначительные отрицательные температуры.

V 4600 'Новый взгляд'® (New Look®) (в гр)
30 см, большие, элегантные плотные развернутые листья, покрытые мягкими белыми ворсинками. Вечнозеленое растение. Интересный материал для флористики. Привлекательное растение для создания групп в открытом грунте
V 4660 'Серебряная пыль' (Silverdust) (в гр)
20 см, самый низкорослый, очень белёсый сорт, изящный, тонко перистый лиственный покров, ⁞


Senecio 'Новый взгляд''®


Senecio 'Серебряная пыль'



Senecio ‘Звездочка® смесь’

Senecio cruentus (Pericallis x hybrida, Senecio hybrida) Крестовник гибридный ⊙ ⌂ ▽

Применение: горшечное растение для украшения цветами солнечных окон, создания «ковров»
Сроки продажи: декабрь-май
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: рассада: середина - конец октября; подросшие растения: конец августа - конец сентября; взрослые растения: в конце июля – середине августа
Проращивание: 5-10 дней при 22-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. Ни в коем случае не дают посевам пересыхать и защищают от прямого солнечного света. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура: 12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После укоренения в горшке температуру можно снизить до 10-16 °C. Для индукции цветения необходим прохладный период 4 недели при 6-8 °C или 6-8 недель при 8-12 °C. Молодые растения перед холодным периодом должны быть более 8-10 см. в диаметре. Чем меньше времени между посевом и холодной фазой, тем меньше будут растения, и чем продолжительнее холодный период, тем больше будут соцветия. По истечении прохладного периода повышают температуру на 6-8 недель до 12-15 °C. При низких температурах растения остаются компактными, и затягивается начало цветения. Вследствие этого возможна постепенная продажа ассортимента. Слишком высокие температуры ведут к бесформенному строению растений. Senecio переносит температуры от 3 до 20 °C, но не заморозки. Хранение готовых к продаже, цветущих растений возможно при 3-5 °C.

V 4480 ‘Эрфуртская карликовая смесь’(Erfurter Zwerg Mix) (Benary) (в гр)
20 см в высоту и 25-30 см в ширину, короткая листва, округлые шапки цветов окрашенных в светящиеся тона, цветы средней величины.

V 4570 ‘Звездочка® смесь’ (Starlet® Mix) (Benary) (в гр)
15-18 см, самый маленький вид Крестовника, всего 15-18 см ø, цветы средней величины, богатая смесь различных окрасок. Прекрасные растения для создания «ковров», особенно хорошо для позднего посева.

Setaria macrostachya смотри
Benary · Однолетние декоративные травы

Sidalcea hybrida (S. malviflora-Hybriden) Сидальцея гибридная ♃

Применение: образующий кустарник многолетник, медонос, как цветущее горшечное растение и на срезку
Сроки продажи: март-октябрь, срезка: июль-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-февраль для продажи цветущих растений в сентябре-октябре; апрель-июль для продажи цветущего товара с мая следующего года
Проращивание: 21-40 дней при 18 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком, субстратом, поддерживают постоянную влажность согласно температурной схеме. Температурные изменения способствуют процессу проращивания. Всходы появляются неравномерно.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за 10-12 недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

V 4720 ‘Тусовщица’ (Partygirl) (Benary) (в гр) FastraX
90 см, кустистый рост, ярко розовые, как у мальвы, цветы от 3 см в диаметре, собранные в стройные, длинные кисти, VII–IX, ⚔



Sidalcea ‘Тусовщица’

Silene pendula Смолёвка ампельная ☉ ⚉

Применение:	посадка на клумбе, в контейнер, как культура для горшка
Сроки продажи:	март-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для цветения с июня; апрель-май для посева в открытый грунт; июль-август с зимовкой для цветения в следующем году
Проращивание:	10-14 дней при 18-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка возможна только без заморозков при 3-5 °C, так как S. pendula только условно морозоустойчива. Выгонка с 51-й недели при 10-15 °C при длинном световом дне. Чем прохладнее культивирование, тем компактнее строение растения, но срок культивирования продлевается приблизительно на 2-3 недели.

V 5040 'Селина' (Celina) (штучно)
15-20 см, богатое, интенсивно окрашенное цветение, более унифицированный, компактный кустообразный рост. В открытом грунте создаёт привлекательную бронзово-красную окраску листьев и завязи семян по окончании цветения. Так как устойчиво к прохладе, то может культивироваться для цветения в ранние сроки, например, с виолой, маргаритками или незабудкой. Культивируется как однолетник. V-VI



Silene 'Селина'



Silene 'Белое горлышко'

Silene schafta Смолевка Шафта ♃

Применение:	стелящийся многолетник для альпинария, песчаных садов-степей, посадки на клумбе, в горшок или контейнер
Сроки продажи:	май-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для не цветущего товара с июня; июль-август с зимовкой для цветения в следующем году
Проращивание:	14-21 день при 20-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за 14-16 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Чем прохладнее культивирование, тем компактнее строение растения, но срок культивирования продлевается приблизительно на 2-3 недели.

V 4890 Silene schafta (в гр)
20 см, цвета фуксии, обильное цветение, образующий кустарник, стелющийся рост, VIII-IX, ♃



Silene 'Селина'

Silene uniflora (Silene vulgaris subsp. Maritima, Silene maritima) Смолевка приморская ♃

Применение:	многолетник для альпинария, песчаных садов-степей, посадки на клумбах, в контейнеры и горшки
Сроки продажи:	май-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-апрель для цветущего с июня товара; июль-август для цветения в следующем году
Проращивание:	14-21 день при 20-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 11-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Чем прохладнее культивирование, тем компактнее строение растения, но срок культивирования продлевается приблизительно на 2-3 недели.

V 4760 'Белое горлышко' (Weisskehlchen) (in g) FastraX
20 см, бесчисленные белые цветы на фоне серебристой вечнозеленой листвы, надутые чашелистики, очень длительный период цветения, стелящийся рост, культивируется как однолетник, VI-VIII, ♃



Solidago 'Золотой ребенок'



Solanum 'Джокер'®

Solanum pseudocapsicum Соланум, Паслён ложноперичный

Применение:	горшечное растение с привлекательными декоративными плодами
Сроки продажи:	август-декабрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-март для появления плодов начиная с августа
Проращивание:	14-21 день при 22-25 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом. Поддерживают постоянную влажность. Молодые ростки не должны пересыхать, но обязательно надо избегать переувлажнения. После появления первых листьев снижают температуру до 20-22 °C и сокращают влажность в субстрате.
Температура:	18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После укоренения в горшке для окрашивания плодов температуру можно опустить до 15-18 °C. S. Pseudocapsicum не переносит температуры ниже + 10 °C и не терпит заморозков. Летом возможно культивирование в открытом грунте, что оптимально для завязи плодов. В открытом грунте S. pseudocapsicum при наступлении прохладных осенних ночей (<10 °C) укрывают. Возможна зимовка в неотапливаемой теплице при 10 °C.

V 7950 'Джокер'® (Joker®) (Benary) (в гр)
25 см, красивой окраски плоды, сначала желтые, затем оранжевые и красные, свободно расположены на фоне темно-зеленой листвы, компактный рост, вечнозеленый вид. ♣

Solidago canadensis Золотарник канадский ♃

Применение:	для посадки на клумбе, в контейнеры, на срезку и засушивания, медонос и лечебное растение
Сроки продажи:	май-октябрь, срезка: май-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-май для цветения с августа; август-октябрь для цветения в следующем году с июня
Проращивание:	5-10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет. Обязательно избегают переувлажнения.
Температура:	12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для индукции цветения повышают температуру до 17-18 °C, так как при более высоких температурах цветение происходит обильнее. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Перед зимовкой растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка первые 6 недель при 12-16 °C и позже при 17-18 °C.

V 8360 'Золотой ребенок' (Goldkind) (Benary) (в гр)
70 см, невысокое золотистое растение, VI–VII, при посеве в середине мая цветении с августа того же года, культивируется как однолетник

Spergula pilifera смотри Sagina subulata

Stipa barbata смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Stipa capillata смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Stipa pennata смотри Benary · Многолетние декоративные травы

Tagetes erecta Бархатцы прямостоячие ⊙

Применение:	для клумб и балкона, как горшечные растения, для создания «ковров», 'Золотые монеты': на срезку
Период продажи:	с середины апреля по август; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала:	«detailed» посевной материал и очищенные семена
Срок посева:	январь-февраль для клумбовых растений; февраль-март для цветения с июня; апрель-май (после заморозков) для непосредственного посева в открытый грунт
Проращивание:	7-14 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом, держат в постоянной влажности и ставят под свет. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Удобряют 75-100 мг азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. Растениям не позволяют пересыхать.
Температура:	12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Низкие температуры во время выращивания дают плохое качество первого цветения. Температуры между 18-22 °C обеспечивают развитие цветов. К концу культивирования снижают температуру до 10-13 °C для закаливания растений. Tagetes не переносят заморозки.

Буквой D обозначены артикулы доступные только в форме 'DETAILED'-семян, то есть у которых отделены «хвостики» и, соответственно, они подходят для машинного посева.

Tagetes erecta Бархатцы прямостоячие ⊙

‘Антигуа’ (Antigua) (штучно) нейтральные к световому дню карликовые-F_1-гибриды

20-25 см, очень крупные цветки, роскошное цветение. Мощное разветвление, компактная структура роста, нейтральные к световому дню. Идеально для масштабного производства. Detailed посевной материал.

W 1600D ‘Антигуа золотой’ (‘Antigua Gold’), золотисто-желтый
W 1610D ‘Антигуа оранжевый’ (Antigua Orange)
W 1700D ‘Антигуа цвет примулы’ (Antigua Primrose)
W 1670D ‘Антигуа желтый’ (Antigua Yellow’)



Tagetes ‘Антигуа оранжевый’



‘Антигуа золотой’



‘Антигуа цвет примулы’



‘Антигуа желтый’

‘Атлантис’ (Atlantis), в Америке Мариголд (штучно) F_1-гибриды

30-35 см, шарообразные, величиной до 12 см, махровые цветы. Плотный ковер цветов при длинном световом дне. Идеально для машинного посева.

W 1850D ‘Атлантис желтый’
W 1810D ‘Атлантис золотой’
W 1830D ‘Атлантис оранжевый’
W 1870D ‘Атлантис смесь’



‘Атлантис золотой’



‘Атлантис оранжевый’



‘Атлантис желтый’

‘Открытие’ (Discovery) (в гр) карликовые - F_1-гибриды

Всего 15-20 см в упаковке или горшке, позже в открытом грунте 20-25 см. густомахровые цветы, 8 см в диаметре. Идеальный сорт для горшка.

W 1640 ‘Открытие оранжевый’ (Discovery Orange), светло-оранжевый
W 1650 ‘Открытие желтый’ (Discovery Yellow), светящийся золотистый



‘Открытие желтый’



‘Открытие оранжевый’

‘Золотые монеты’ (Gold Coins) (в гр) F_1-гибриды для получения срезки

75 см, шарообразные, 100% махровые гигантские цветы 12 см ø, раннее цветение.

W 0850 ‘Двуглавый орел’ (Double Eagle), светло-оранжевый
W 0870 ‘Дублон’ (Doubloon), светящийся примульно-желтый
W 0890 ‘Золотой соверен’ (Gold Sovereign), теплый золотисто-желтый
W 1100 ‘Золотые монеты смесь’ (Gold Coins Mix)

‘Инка II’ (Inca II) (штучно) Низкорослые F_1-гибриды для горшка и клумб

30-35 см, огромные, круглые густомахровые соцветия на сильных, компактных растениях, очень раннее и равномерное цветение. Идеальный сорт для весенних продаж. Для цветения в мае посев в феврале

W 1320D ‘Инка II золотой’ (Inca II Gold)
W 1340D ‘Инка II оранжевый’ (Inca II Orange)
W 1360D ‘Инка II цветы примулы’(Inca II Primrose), светящийся примульно-желтый
W 1380D ‘Инка II желтый’ (Inca II Yellow)



‘Инка II золотой’



‘Инка II оранжевый’



Tagetes ‘Парень гармония’



‘Парень непоседа’



‘Парень О’Парень’



Tagetes ‘Герой непоседа’



‘Герой пчела’



‘Герой пламя’

‘Герой золотой’



‘Герой гармония’



‘Герой оранжевый’



‘Герой желтый’

Tagetes patula Бархатцы отклоненные ⊙

Применение:	растения для клумб и балкона, горшечные растения, создание «ковров»
Сроки продажи:	середина апреля - август
Форма посевного материала:	«detailed» посевной материал («Процветание») и очищенные семена
Срок посева:	январь-февраль для клумбовых растений; февраль-март для цветения с июня
Прорашивание:	7-14 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Удобряют сбалансированным комплексным удобрением с 75-100 мг азота на литр воды. Растениям не позволяют пересыхать.
Температура:	12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Низкие температуры во время выращивания дают плохое качество первого цветения. Температуры между 18-22 °C обеспечивают развитие цветов. К концу культивирования снижают температуру до 10-13 °C для закаливания растений. Tagetes не переносят заморозки.

«Процветание» (Bonanza) (штучно)

20 см, низкие и очень ранние сорта, крупноцветковые. Растения быстро зацветают, хорошо для продажи крупных партий, в садовых центрах и супермаркетах. Detailed посевной материал, очень хорошо подходит для машинного посева.

W 3030D	‘Процветание пчелка’ (Bonanza Bee), махагоново-красный с золотистой окантовкой
W 3040D	‘Процветание болеро’ (Bonanza Bolero), золотисто-красный, пестрый
W 3070D	‘Процветание пламя’ (Bonanza Flame), красно-коричневый с оранжевым рисунком
W 3090D	‘Процветание золотистый’ (Bonanza Gold)
W 3100D	‘Процветание гармония’ (Bonanza Harmony)
W 3110D	‘Процветание оранжевый’ (Bonanza Orange), в улучшенном качестве
W 3160D	‘Процветание желтый’ (Bonanza Yellow), лимонно-желтый

‘Парень’ (Boy) (в гр)

20 см, низкие и ранние сорта, цветы средней величины с махровой, как у скабиозы, сердцевиной, очень обильное цветение

W 2880	‘Парень золотой’ (Boy Golden), золотисто-желтый
W 2890	‘Парень гармония’ (Boy Harmony), коричневый с оранжевой серединой
W 2930	‘Парень оранжевый’ (Boy Orange), очень раннее и равномерное цветение
W 2950	‘Парень непоседа’ (Boy Spry), коричневый с желтой серединой
W 2940	‘Парень желтый’ (Boy Yellow), светло-желтый
W 2990	‘Парень О’Парень’ (Boy O’ Boy), смесь из перечисленных окрасок

‘Герой’ (Hero) (в гр)

25 см, крупные цветки, компактный рост, очень раннее цветение, высокая пригодность для выращивания в лотках

W 1900	‘Герой пчела’ (Hero Bee), двуцветный окрас красно-желтый
W 1920	‘Герой пламя’ (Hero Flame), ярко коричневый цвет с золотым краем
W 1940	‘Герой золотой’ (Hero Gold), золотисто-желтый
W 1950	‘Герой гармония’ (Hero Harmony), красно-коричневый с оранжевой серединой
W 1980	‘Герой оранжевый’ (Hero Orange)
W 2060	‘Герой непоседа’ (Hero Spry) махагоново-красные язычковые лепестки, желтая середина из трубчатых лепестков, очень хорошие оттенки цветов
W 2040	‘Герой желтый’ (Hero Yellow), светящийся желтый

Скабиозовидные цветки (в гр)

25 см, низкорослые, крупноцветковые сорта с трубчатыми лепестками у середины, идеально для рассады в открытом грунте

W 2050 'Медовые соты' (Honeycomb), (Bienenwabe) светящийся коричневый с золотым рисунком
W 2970 'Жакет оранжевый' (Jacket Orange), интенсивное равномерное оранжевое цветение
W 2960 'Жакет желтый' (Jacket Yellow), светящийся желтый

'Сафари' (Safari) (в гр)

20 см, ранние крупные махровые, подобные гвоздикам цветы. Компактный и неприхотливый рост. Очень хорошая пригодность для сада

W 3290 'Сафари мандариновый' (Safari Tangerine)



'Сафари мандариновый'


'Медовые соты'

'Диско' (Disco) (в гр)

25 см, просто цветущие бархатцы с лучшей пригодностью для контейнера. Раннее цветение, компактный рост

W 3750 'Диско пламя' (Disco Flame) более компактный, красно-коричневый, простые цветы с равномерной золотистой каймой
W 3710 'Диско золотисто-желтый' (Disco Golden Yellow), золотистые, круглые, большие цветы
W 3730 'Диско оранжевый' (Disco Orange)
W 3780 'Диско смесь' (Disco Mix) смесь из вышеперечисленных и других окрасок.


'Диско пламя'


'Диско смесь'

Tagetes tenuifolia Бархатцы тонколистные ⊙

Применение: растения для клумб и балкона, горшечные растения, создание «ковров» и групп
Сроки продажи: середина апреля - август
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-февраль для клумбовых растений; февраль-март для цветения с июня
Проращивание: 7-14 дней при 18-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в субстрате. Удобряют сбалансированным комплексным удобрения с 75-100 мг азота на литр воды с повышенным содержанием нитратной формы азота. Растениям не позволяют пересыхать.
Температура: 12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Низкие температуры во время выращивания дают плохое качество первого цветения. Температуры между 18-22 °C обеспечивают развитие цветов. К концу культивирования снижают температуру до 10-13 °C для закаливания растений. Tagetes не переносят заморозки.


'Гном'


'Орнамент'®


'Лулу'

W 3930 'Гном' (Gnom) (в гр)
30 см, бесчисленные, насыщенно-золотистые цветы
W 3960 'Лулу' (Lulu) (в гр)
30 см, ярко-желтый
W 4000 'Орнамент'® (Ornament'®) (Benary) (в гр)
25 см, красно-коричневый, богатое и длительное цветение
W 4030 'Огонь звезды смесь' (Starfire Mix) (в гр)
30 см, светящиеся окраски от светло-желтого до красно-коричневого, одноцветные или с изящным рисунком цветы
W 4040 'Мандариновый джем' (Tangerine Gem) (в гр)
25 см, светящийся апельсиновый, бесчисленные круглые цветы


'Мандариновый джем'


'Огонь звезды смесь'



Tanacetum ‘Снежная корона’®



‘Тетравайс’

Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium, Matricaria parthenium, Martricaria exima, Pyrethrum parthenium) Пижма девичья (Хризантема девичья, Матрикария исключительная, Пиретрум девичий), Ромашка ⊙

Применение: групповые растения, для горшков и балконных ящиков, срезка
Сроки продажи: апрель-июнь; срезка: круглый год
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: в горшок: январь-июнь; в открытый грунт: апрель, возможен непосредственный посев
Проращивание: 7-12 дней при 20-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев понижают температуру до 16-18 °C.
Температура: 16-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью. Температура вентиляции: 20 и 15 °C соответственно. Чем прохладнее температура, тем компактнее будет строение растений. Начиная с апреля возможно культивирование в открытом грунте. Недавно высаженные растения укрывают нетканым полотном от ночных заморозков. T. parthenium переносит слабые заморозки.

Сорта на срезку для профессионального выращивания в теплице и в открытом грунте:

J 2140 ‘Снежная корона’® (Schneekrone’®) (Benary) (в кг)
50 см, под стеклом до 75 см, белые язычковые лепестки вокруг трубчатых лепестков, образующих головку цветка
J 2020 ‘Тетравайс’ (Tetraweiss) (в кг)
50 см, особенно крупные махровые цветки
J 2120 ‘Белый помпон’ (Weisser Pompon) (в кг)
60 см, большие белые помпонные цветы, селекция с длинными стеблями

Низкорослые сорта для клумб и горшка:

J 1990 ‘Белая звезда’ (Weisser Stern) (в кг)
20 см, махровые, белые язычковые цветы, с трубчатыми лепестками у середины, стелющийся рост, идеально как культура горшка и для клумб. ⊙

Tanacetum ptarmiciflorum (Chrysanthemum ptarmiciflorum) Пижма птармикоцветковая ⊙

Применение: декоративнолиственное растение для клумб, обрамления рабаток, посадки на могилах
Сроки продажи: апрель-июнь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: февраль-июль
Проращивание: 7-12 дней при 20-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают температуру до 16-18 °C. Не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: 16-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью. Температура вентиляции: 20 и 15 °C соответственно. Чем ниже температура, тем компактнее будет строение растений.

J 2080 ‘Серебряное перо’ (Silberfeder) (в гр)
20-30 см, изысканная серебристо-серая листва, растение для вазонов и обрамления.

Teucrium chamaedrys (Teuricum x lucidrys) Дубровник обыкновенный ♃

Применение: многолетник для альпинариев и песчаных садов-степей, посадки на могилах, экстенсивного озеленения, лечебное растение и медонос
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-апрель для не цветущего товара; май - конец июля для цветения в следующем году
Проращивание: 35-42 дня при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Посев присыпают вермикулитом, песком или субстратом. По возможности обеспечивают 100% относительную влажность воздуха на стадии I. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и держат в постоянной влажности, но избегают переувлажнения. Всходы не должны пересыхать. При слабом появлении всходов семена ставят в прохладу при 0-4 °C на 4-6 недель. Затем культивируют 1 неделю при 10 °C и далее снова повышают температуру до 12-15 °C.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температурные изменения способствуют повышению качества. Зимовка при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка в тепле при 15-18 °C. Более низкие температуры продлевают время выращивания.

W 4050 Teucrium chamaedrys (в кг)
25 см, розовые губоцветные цветки, маленькие овальные листья, медленный рост, вечнозелёное растение, идеально для обрамления клумб и посадки на могилах, VI–VIII




Teucrium chamaedrys

Thalictrum aquilegifolium Василистник водосборолистный ♃ ⚔

Применение:	растение - многолетник для групповых посадок и контейнера, как декоративнолиственное, хорошо стоит в срезке, медонос
Сроки продажи:	рассада: март-октябрь; цветущие растения: июнь-июль; срезка: май-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для не цветущего товара; май - конец июля для цветения в следующем году
Проращивание:	10-20 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы не присыпают и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Всходы не должны пересыхать. При слабом появлении всходов семена ставят в прохладу при 0-4 °C на 4-6 недель. Затем культивируют 1 неделю при 10 °C и далее снова повышают температуру до 12-15 °C. Возможно неравномерное прорастание.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном или мульчей. Выгонка культуры на срезку в пленочном парнике при 10-12 °C.

W 4110 'Игра видов' (Spielarten) (в гр)
120 см, большие зонтики, похожие на страусиные перья, от белого до фиолетового оттенков. Листья напоминают листья аквилегии, могут так же использоваться как аксессуар во флористике. VI–VII, ⚔



Thalictrum 'Игра видов'

Thunbergia alata Тунбергия крылатая ⊙

Применение:	привлекательное, быстро растущее вьющееся растение, как почвопокровное для клумб, балкона или зимнего сада, для вазонов и кашпо
Сроки продажи:	середина апреля июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель
Проращивание:	6-12 дней при 21-24 °C
Условия проращивания: п	одсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и начинают удобрять , 75-100 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения.
Температура:	13-20 °C. Температура вентиляции 22 °C. Температуру постепенно снижают только после укоренения растения в горшке. Незадолго до продажи растения закаливают при 10-12 °C. Thunbergia не выносит отрицательных температур.

W 4150 Thunbergia alata (в кг)
150 см, желтые и оранжевые тона с черным глазком, привлекательный вьюн для подсадки в вазоны и кашпо, VI–IX, ⚷



Thunbergia alata



Thymophylla 'Метеорит'

Thymophylla tenuiloba (Dyssodia tenuiloba, Chrysanthemum tenuilobum) Тимофилла, Диссодия ⊙

Применение:	балконные ящики, кашпо, как летнее горшечное растение
Сроки продажи:	середина апреля июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	с середины января по апрель
Проращивание:	10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают, ставят на свет и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев снижают температуру до 16-18 °C, сокращают влажность в субстрате и удобряют по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения. В течение первых 4 недель всходы очень восприимчивы к высокой концентрации солей.
Температура:	В начале вегетации температура 16-20 °C, далее 12-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. При высокой интенсивности освещения возможны высокие температуры без снижения качества растений. В течение короткого периода растение выдерживает температуры ниже 10 С, но это замедляет рост. Тимофилла не выносит отрицательных температур.

W 4240 'Метеорит' (Sternschnuppe) (в гр)
15 см, раскидистый рост, золотистые цветы и изящная листва, продолжительное обильное массовое цветение. Идеальный партнер для Брахикомы.




Tithonia
Праздник
солнца'



Thymus
serpyllum



Trachelium '
Покрывало цветов синий'



Trachelium
ассортимент 'Джемми'

Thymus serpyllum Чабрец, Тимьян ползучий ♃ D

Применение:	многолетник для альпинариев и песчаных садов-степей, пряное и лечебное растение, медонос, почвопокровник для экстенсивного озеленения
Сроки продажи:	март-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	март-сентябрь
Проращивание:	10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После появления всходов медленно снижают температуру до 16-18 °C и более сухо культивируют. Тимьян восприимчив к солям на стадии молодого растения.
Температура:	10-20 °C или открытый грунт. Температура вентиляции: 22 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. В открытом грунте хорошо защищают от поздних морозов в апреле и мае. Выгонка в прохладе (с 51-й недели) при 10-15 °C или в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

W 4200 Thymus serpyllum (в гр)
10 см, пурпурно-фиолетовый, стелющийся рост, вечнозеленый, нуждается в вернализации, приятный аромат, хорошие продажи как пряного растения без цветения, VII–VIII

Thymus vulgaris смотри Benary · Пряные травы

Tithonia rotundifolia
(Tithonia speciosa, Helianthus speciosus)
Титония круглолистная ⊙

Применение:	для посадки на клумбах и в группах, как летнее горшечное растение, медонос
Сроки продажи:	середина мая - сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-май
Проращивание:	5-8 дней при 18-22 °C.
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают к почве и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 17-18 °C.
Температура:	12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Температуры ниже 10 °C в течение короткого периода могут вызывать изменение окраски листьев (в красно-коричневый и желтый), или даже опадание листвы при длительном понижении температур. Титония не переносит отрицательных температур.

W 4260 'Праздник солнца' (Fiesta Del Sol) (в кг)
75 см, пламенно-оранжевые цветы, компактный рост, идеально для вазонов и посадки на рабатке, привлекательное растение для летнего горшка, VI–X, ⊙

Trachelium caeruleum Трахелиум голубой Ⓚ ⚔

Применение:	посадки на клумбе и в группах, как летнее горшечное растение, срезка
Сроки продажи:	середина мая - сентябрь; срезка: январь-ноябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-апрель; август-сентябрь с зимовкой для цветения в следующем году
Проращивание:	5-10 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Семена прижимают к почве, поддерживают постоянную влажность и ставят под свет. После появления первых листьев сокращают влажность субстрата и снижают температуру до 18-20 °C.
Температура:	13-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Сразу после пересадки в горшки (пикировки) снижают температуру до 15 °C днем и 13 °C ночью на 2-3 недели. С началом подсветки дневную температуру снова доводят до 18°C, а ночную до 15 °C. Температуры выше 25 °C и ниже 10 °C следует избегать во время фазы роста. Слишком низкие температуры приводят к пожелтению листьев. Зимовка возможна при 5-8 °C. Зимовка способствует образованию розеток (особенно привлекательно для получения горшечных растений) и укрепляет растения.

W 4340 'Покрывало цветов синий' (Bluetenschleier Blau) (Benary) (штучно)
75 см, большие (15 см ø), сине-фиолетовые зонтики цветов, хорошее дополнение по окраске к серии 'Джемми', идеально как культура на срезку, VI–VIII, ⊙ ⚔

'Джемми' (Jemmy)-серия (Benary) (штучно)

90-100 см как растение на срезку с качественными стеблями, большими центральными зонтиками цветов и маленькими боковыми (при крупном растении), оптимальное качество растений для продажи как весной, так и летом. Высотой примерно 40 см горшечное растение с компактным, разветвленным ростом, увеличивающим объём растения, отличное расширение классического ассортимента летних цветов. ⊙

W 4310 'Джемми лилово-розовый'
W 4330 'Джемми пурпурный'

W 4360 'Джемми насыщенно-фиолетовый'
W 4390 'Джемми белый'

Tritoma uvaria смотри Kniphofia uvaria

Trollius Купальница, троллиус, жарки ♃ ⚔ F

Применение: растение для контейнера, клумбы, посадки у края пруда, медонос
Сроки продажи: рассада: март-апрель и август-октябрь; цветущие растения: апрель-июль; срезка: апрель-июль
Форма посевного материала: очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed ('Золотая королева')
Срок посева: ноябрь-март для не цветущего товара; июнь-август для цветения в следующем году
Проращивание: 1-2 недели при 18-22 °C; 4-5 недель при 0-5 °C; 1 неделя при 5-10 °C; далее культивируют при 12-15 °C
Условия проращивания: в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом, увлажняют и культивируют по температурной схеме. Холодную фазу проводят либо в ящике в открытом грунте, либо в не отапливаемой теплице. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате.
Температура: 10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка возможна в открытом грунте или при 0-3 °C. Перед зимовкой растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка культуры на срезку в пленочном парнике с января при 10-15 °C.

W 4610 Trollius chinensis 'Золотая королева' (Goldkoenigin) (в гр) (Trollius ledebouri)
80 см, золотисто-оранжевый, VI–VII
W 4610T Trollius chinensis 'Золотая королева' (Goldkoenigin) (штучно) (Trollius ledebouri)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и более высокой всхожести, на 45% больше выход молодых растений.



Trollius 'Золотая королева'



'Золотая королева' ApeX-посевной материал

Tropaeolum Настурция, Капуцин ⊙

Применение: для рабаток, балконных ящиков, кашпо, вазонов, как летнее горшечное растений, как стелющееся растение, пряное и лечебное растение
Сроки продажи: середина апреля - июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с середины февраля по май; открытый грунт: начало мая- начало июня, после заморозков
Проращивание: T. majus: 10-14 дней при 18-21 °C; T. peregrinum: 5-10 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев ставят на свет и удобряют по 50 мг Азота на литр воды сбалансированного комплексного удобрения.
Температура: в период появления всходов 15-20 °C, затем 12-16 °C. При высокой интенсивности освещения возможны высокие температуры без снижения качества растений. Температуры ниже 10 °C переносятся растением, но замедляют его рост. Настурция не морозоустойчива.



Tropaeolum 'Кружащаяся птичка смесь'

Tropaeloum majus
Настурция большая

W 5750 'Пестрые драгоценности' (Bunte Juwelen) (в кг)
25 см, полумахровые цветки, обильное и свободное цветение на фоне маленькой листвы, не вьётся, идеально как растение для клумб и горшка

W 5390 'Низкорослая смесь' (Niedrige Mix) (в кг)
30 см, не вьётся, крупная листва, для посадки на клумбах

W 5000 'Вьющаяся смесь' (Rankende Mix) (в кг)
300-400 см вьётся в высоту, крупная листва, быстро растущее и привлекательное растение для вазонов, VI-X

W 5690 'Кружащаяся птичка смесь' (Whirlybird Mix) (в кг)
25 см, контрастная игра окрасок, простые цветы без шпорцев, очень маленькая листва, не вьётся, идеально как растение для клумб и горшка

Tropaeolum peregrinum ⊙
Настурция иноземная

W 5830 Tropaeolum peregrinum (T. canariense) (в кг)
120 см, желтые, необычно гофрированные цветы, сильно изогнутые листья, богатое цветение, вьющийся рост, растение для ширм и балконов, VI–X, ⚷



Tropaeolum peregrinum





Verbena rigida ApeX – посевной материал

Verbena rigida



Verbena bonariensis



Verbena‘Превосходная’



Verbena ‘Поларис’®



Verbena ’Море цветов ® фиолетовый’

Verbascum Коровяк, Вербаскум ♃

Применение: многолетник-солитер, растения для контейнера, медонос, 'Полярное лето': декоративнолиственное растение
Сроки продажи: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: V. phoeniceum: январь-март для цветения с мая; июль-август для цветения в следующем году; 'Полярное лето': январь-март для не цветущего товара; июль-август для цветения в следующем году
Проращивание: 4-7 дней при 21-22 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Семена прижимают к почве и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Непременно избегают переувлажнения. Под прямой солнечный свет не ставят.
Температура: 10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Температуры выше 25 °C избегают. Зимовка при 0-3 °C или в открытом грунте. Выгонка при температуре 10-15 °C или в прохладе при 5 °C. Чем теплее выгонка, тем короче срок культивирования, тем большая интенсивность освещения необходима. Культивирование в прохладе держит растения компактными, но продлевается срок культивирования приблизительно на 2-4 недели. Пониженные температуры в течение 4 недель (0+5 °C) обеспечивают прекрасное строение розеток, лучшее ветвление, а также большее количество соцветий. Прохладный период так же рекомендуется при однолетнем культивировании.

W 5980 Verbascum bombyciferum ‘Полярное лето’ (Polarsommer) (Benary) (в гр)
(Verbascum lagurus)
210 см, светло-желтый, декоративные белые, покрытые ворсинками свечевидные соцветия и розетки листьев, вечнозелёный, VI–VIII,

Verbena Вербена ⊙

Применение: посадка на клумбах, в балконные ящики, контейнеры, создание «ковров», на срезку
Сроки продажи: середине апреля - конце июня; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed (V. rigida, и ‘Поларис’®)
Срок посева: февраль-апрель; V. rigida в январе-феврале для выращивания в горшке
Проращивание: 5-10 дней при 21-24 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевному материалу дают разбухнуть за ночь в воде. Посевы слегка присыпают вермикулитом и укрывают черной фольгой с отверстиями для улучшения влажности воздуха. Вербена прорастает лучше всего в средне-влажных и сухих субстратах. Посевы не поливают повторно. Избегают переувлажнения на всех стадиях проращивания.
Температура: 14-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают при 10 °C. Вербена не морозостойка.

W 6160 Verbena bonariensis вербена буэнос-айресская(в гр)
120 см, лиловый, VII–X,

W 6230 Verbena canadensis ‘Превосходная’ (Perfecta) (V. aubletia) Вербена канадская (в гр)
20 см, темный красно-фиолетовый, закрытой рост, богатое цветение, VII–X,

W 6260 Verbena rigida (V. venosa) Вербена жесткая (в гр)
30 см, сиреневый, для клумб, VI–X,

W 6260T Verbena rigida (V. venosa) (в гр)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и более высокой всхожести, на 15% больше выход молодых растений.

W 6280 Verbena rigida ‘Поларис’® (Polaris®) (Benary) (в гр)
30 см, нежный фарфорово-синий, очень оригинальный, для посадки на рабатках, высококлассного букета и флористических композиций, VII–X,

W 6280T Verbena rigida ‘Поларис’® (Polaris®) (Benary) (в гр)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и более высокой всхожести, на 15% больше выход молодых растений.

W 6360 Verbena tenuisecta ‘Море цветов ® фиолетовый’ (Bluetenmeer® Violett) Вербена красивая (в гр)
30 см, красиво свисающий рост, очень обильное цветение, растение для балкона и контейнера.



Verbascum ‘Полярное лето’

Verbena hybrida Вербена гибридная

Применение:	посадка на клумбах, в балконные ящики, контейнеры, создание «ковров»
Сроки продажи:	середина апреля – конец июня
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	середина января - конец марта
Проращивание*:	стадия I: 10-20 дней при 24-27 °C Стадия II: 12-16 дней при 20-21 °C Стадия III - стадия IV: 21-30 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом и укрывают черной фольгой с отверстиями для повышения влажности воздуха. Вербена прорастает лучше всего в средне-влажных и сухих субстратах. Посевы не поливают повторно. Избегают переувлажнения на всех стадиях проращивания.
Температура:	16-18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Незадолго до продажи растения закаливают при 10 - 15 °C V. hybrida не морозостойка.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

'Дерби'® (Derby®) (Benary) (в гр)

W 7120 'Дерби® смесь'
25 см, большие отдельные цветы в мощных зонтиках, интенсивные окраски, компактный рост, продолжительное цветение, смесь серии из лучших окрасок для самого ^ требовательного потребителя.

'Новалис'® (Novalis®)-серия (Benary) (штучно)

20 см, круглый, закрытый рост, раннее цветение, лучшая презентация в контейнере, очень высокая пригодность для открытого грунта, улучшенная всхожесть,

W 6680 'Новалис ® светящийся алый' невероятная окраска, темно-зеленый лиственный покров

W 6770 'Новалис ® розовый с глазком', блестящий средне-розовый
W 6790 'Новалис ® алый с глазком'
W 6720 'Новалис ® насыщенно-синий с глазком', прекрасный синий

W 6840 'Новалис ® белый'
W 6880 'Новалис ® смесь' контрастная смесь из вышеперечисленных и других окрасок.



Verbena 'Новалис ® светящийся алый'


'Новалис ® розовый с глазком'


'Новалис ® алый с глазком'



'Новалис ® насыщенно-синий с глазком'


'Новалис ® смесь'



Verbena 'Воображение' ®

Verbena speciosa Вербена прекрасная ⊙

Применение:	посадка на клумбах, в балконные ящики, контейнеры, кашпо, создание «ковров»
Сроки продажи:	середина апреля – конец июня
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	середина января - середина марта для культуры горшка; декабрь для ампельных растений
Проращивание:	5-10 дней при 21-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают вермикулитом и укрывают черной фольгой с отверстиями для улучшения влажности воздуха. Вербена прорастает лучше всего в средне-влажных и сухих субстратах. Посевы не поливают повторно. Избегают переувлажнения на всех стадиях проращивания.
Температура:	16-18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Незадолго до продажи растения закаливают при 10 - 15 °C. V. speciosa не морозостойкая.

W 6370 'Воображение'® (Imagination®) (в гр)
30 см, шириной 50 см, изящный, сильно ветвистый рост, маленькие, яркие фиолетово-синие цветы, VI–IX



Veronica spicata
'Карликовая
роза'



Veronica incana




Veronica spicata



Veronica spicata
'Достопримечательность'®



Veronica teucrium
'Королевский синий'



Veronica
repens

Veronica (Pseudolysimachion spicatum) Вероника ♃

Применение:	растение для альпинариев и песчаных садов-степей, для контейнера, медонос, V. spicata: срезка
Сроки продажи:	горшечное и клумбовое растение: май-август; срезка: май-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-апрель для не цветущего товара; июнь-август для цветущего в следующем году товара
Проращивание:	7-14 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Прямого солнечного света во время проращивания избегают. Проращивание проходит не равномерно.
Температура:	12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка возможна с зимней защитой (нетканое полотно). Для вернализации требуется 10 недель при 5 °C для равномерного и обширного цветения. Выгонка в тепле за 6-8 недель (V. spicata) и соответственно 8-10 недель (V. incana и V. teucrium) при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C.

W 7980	Veronica incana Вероника седая (в гр) (Pseudolysimachion spicatum subsp. Incanum) 30 см, синего, как Агератум, цвета, белесый лиственный покров, VI–VIII, ⫶ △
W 8130	Veronica spicata (Pseudolysimachion spicatum) Вероника колосковая (в гр) 60 см, синий, обильное цветение, хороший цветок на срезку, VI–VIII, △ ⚔
W 8180	Veronica spicata 'Карликовая роза' (Rosa Zwerg) (в гр) 40 см, розовый, △ ⚔
W 8210	Veronica spicata 'Достопримечательность'® (Sightseeing®) (в гр) 60 см, гармоничная смесь из белого, розового и синего, VI–VIII, ⚔
W 8250	Veronica teucrium 'Королевский синий' (Koenigsblau) Вероника большая (в гр) (Veronica austriaca subsp. Teucrium) 30 см, синего, как горечавка, цвета, кустистый рост, VI–VII, △ ⫶ ⚔

Veronica repens Вероника ползучая ♃

Применение:	растение для альпинариев и песчаных садов-степей, почвопокровник, медонос
Сроки продажи:	март-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-апрель для не цветущего товара; июнь-август для цветущего в следующем году товара
Проращивание:	7-14 дней при 18-24 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность. Прямого солнечного света во время проращивания избегают. Проращивание происходит не равномерно.
Температура:	12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка возможна с зимней защитой (нетканое полотно). Для вернализации требуется 10 недель при 5 °C для равномерного и обширного цветения. Выгонка в тепле за 4-5 недель при температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C.

W 8060	Veronica repens (в гр) 5 см, изящные белые с синеватым оттенком цветы, стелящийся, подобный коврам рост, IV-VI

Vinca hybrida
(Catharanthus roseus, Lochnera rosea) Барвинок,
Катарантус гибридный

Применение:	летнее горшечное растение, для клумб и балкона для теплых климатических зон. Vinca рекомендуется к выращиванию в южных районах России, в Украине, в Молдавии, в республиках Средней Азии и Кавказа.
Сроки продажи:	июнь-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Сроки посева:	Февраль-март для цветения в июне
Проращивание*:	стадия I: 7-14 дней при 24-27 °C Стадия II: 7-10 дней при 22-24 °C Стадия III: 15-20 дней при 20-23 °C Стадия IV: 20-21 °C
Условия проращивания:	в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы тонко присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность, избегают переувлажнения. Со стадии II ставят посевы под свет.
Температура:	21-24 °C дневная температура и 18-20 °C ночная. Температура вентиляции: 26 °C. Температуры ниже 16 °C провоцируют хлороз и приостанавливают рост.

* Описание стадий смотреть во введении каталога



Vinca 'Первый поцелуй черника'

'Первый поцелуй' (First Kiss)-серия (штучно)
F_1-гибриды

25-30 см, цветение раннее и унифицированное, крупные, круглые цветы из широких, перекрывающихся лепестков. Отличное разветвление от основания и круглое строение растений. Теплолюбивые растение для посадки на рабатках, в садах, в контейнеры и балконные ящики.

W 8740	'Первый поцелуй абрикос' (First Kiss Apricot) нежный лососево-розовый с желтым глазком и розовым кольцом
W 8600	'Первый поцелуй черника' (First Kiss Blueberry) неповторимый барвинок на рынке, сине-фиолетовая окраска, которая не ослабевает даже при прямом солнечном свете, зацветает примерно 10 дней позже чем другие окраски
W 8650	'Первый поцелуй румянец' (First Kiss Blush) еще более крупные цветы с более интенсивной окраской
W 8670	'Первый поцелуй вишня' (First Kiss Cherry), вишнево-красный
W 8770	'Первый поцелуй коралл' (First Kiss Coral) крупноцветковый, светящаяся, насыщенная лососево-оранжевая окраска
W 8690	'Первый поцелуй розовый лёд' (First Kiss Icy Pink) прохладный окрас со светло-розовыми лепестками и высветленными краями
W 8720	'Первый поцелуй персик' (First Kiss Peach), персиковый с розовым кольцом
W 8750	'Первый поцелуй розовый' (First Kiss Pink) светло-розовый цветы с желтой серединой и розовым кольцом
W 8730	'Первый поцелуй в горошек' (First Kiss Polka Dot), белый с красным глазком
W 8790	'Первый поцелуй цвета розы' (First Kiss Rose) неповторимая окраска, сочные светящиеся розовые цветы с белой серединкой
W 8760	'Первый поцелуй рубин' (First Kiss Ruby) насыщенный винно-красный, неповторимая окраска
W 8800	'Первый поцелуй восход солнца' (First Kiss Sunrise) темно-лососевый окрас цветов с неоново-розовой серединкой
W 8820	'Первый поцелуй смесь' (First Kiss Mix), не содержит сорт 'Черника'




'Первый поцелуй абрикос'



'Первый поцелуй румянец'



'Первый поцелуй вишня'



'Первый поцелуй коралл'



'Первый поцелуй розовый лёд'



'Первый поцелуй персик'



'Первый поцелуй розовый'



'Первый поцелуй в горошек'



'Первый поцелуй цвета розы'



'Первый поцелуй рубин'



'Первый поцелуй восход солнца'



'Первый поцелуй смесь'



'Шербет лимоновый шифон'



'Шербет поле огней'



'Шербет синие небеса'



'Шербет кокос'



'Шербет кокосовый дует'



'Шербет лиловый лёд'



'Шербет сливовый бархат'

Viola cornuta F_1-гибриды Фиалка, Виола рогатая ☉

Применение:	клумбы, альпинарии, смешанный контейнер, балконные ящики, создание «ковров»
Сроки продажи:	с февраля для весеннего цветения, с середины сентября для осеннего цветения
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	осеннее цветение: конец мая - начало июля, культивируют как можно прохладнее; весеннее цветение (в теплице без заморозков 0-5 °C): середина августа - середина сентября; в 1-2 декаду мая (в теплице без заморозков 0-5 °C): в начале - середине января
Проращивание:	7-14 дней при 18-21 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом или перлитом и держат в постоянной влажности. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и более сухо культивируют, но не позволяют посевам пересыхать. В стадии I+II* оттеняют. Температуры выше 18 °C тормозят проращивание.
Температура:	10-15 °C. Культивируют как можно прохладнее. За счёт низких температур и освещенности местоположения достигается компактность растения. Температуры выше 12 °C влияют на раскидистость побегов растения. Зимовка при 2-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. При низких температурах, до тех пор, пока земля или горшки находятся в замерзшем состоянии (открытый грунт), растения укрывают нетканым полотном, защищая таким образом от пересыхания. При обработке регуляторами роста повышают температуру в теплице или пленочном парнике на короткий срок (48 часов) до 12-15 °C. Температура вентиляции весной устанавливают на 8-10 °C. Растение, культивируемое без отрицательных температур, примерно на 3-4 недели опережают в развитии растения, выращиваемые в открытом грунте. Прохладу для растений создают не столько притенением, сколько воздушными потоками.


* Описание стадий смотреть во введении каталога

'Шербет' (Sorbet) (штучно) F_1-гибриды

Крупные цветки, обильное цветение, исключительная цветная палитра, унифицированный, компактный рост, идеально для весенней и осенней продажи культуры в горшках или в лотках, зимостойкие сорта.



'Шербет оранжевый дует'



Viola F_1 'Шербет смесь'

W 8280 'Шербет поле огней' (Sorbet Beaconsfield) фиолетовый с лавандовым крыльями

W 8260 'Шербет синие небеса' (Sorbet Blue Heaven), средне-синий

W 8270 'Шербет кокос' (Sorbet Coconut), чисто белый с маленьким медовым глазком

W 8290 'Шербет кокосовый дует' (Sorbet Coconut Duet), белый с фиолетовыми крыльями

W 8330 'Шербет лимоновый шифон' (Sorbet Lemon Chiffon) кремово-желтый с тёмными штрихами на нижних лепестках

W 8320 'Шербет лиловый лёд' (Sorbet Lilac Ice), лавандово-розовый

W 8350 'Шербет оранжевый дует' (Sorbet Orange Duet), оранжевый с фиолетовыми крыльями

W 8400 'Шербет сливовый бархат' (Sorbet Plum Velvet) бархатный пурпурно-фиолетовый с высветленной серединой

W 8410 'Шербет пурпурный дует' (Sorbet Purple Duet) светлый пурпурно-фиолетовый с более темными крыльями

W 8420 'Шербет красные крылья' (Sorbet Red Wing), желто с махагоново-красными крыльями

W 8440 'Шербет солнечный королевский' (Sorbet Sunny Royale) ярко-золотистый с пурпурными крыльями

W 8500 'Шербет желтый восторг' (Sorbet Yellow Delight), золотисто-желтый

W 8470 'Шербет желтый мороз' (Sorbet Yellow Frost) бело-желтый с голубыми крыльями

W 8490 'Шербет YTT' (Sorbet YTT) белые и синие цветы на растении, привлекательная игра окрасок

W 8520 'Шербет смесь' (Sorbet Mix), смесь серии



'Шербет пурпурный дует'



'Шербет красные крылья'



'Шербет солнечный королевский'



'Шербет желтый восторг'



'Шербет желтый мороз'

Viola odorata Фиалка душистая ♃ ⚔ F D

Применение: для клумб, альпинариев, создания «ковров», срезки
Сроки продажи: с февраля для весеннего цветения; срезка: с февраля по апрель
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: октябрь-ноябрь
Проращивание: 7-14 дней при 15-18 °C; 14-24 дня при 0-4 °C; 7 дней при 10 °C; далее при 12-15 °C
Условия проращивания: в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом, песком, субстратом, держат в постоянной влажности и культивируют согласно температурной схеме. Температурные изменения способствуют проращиванию. Возможно неравномерное появление всходов.
Температура: 5-10 °C. Температура вентиляции: 10 °C. Зимовка при 2-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 4 недели (с 51-й недели) при коротком световом дне и температуре 5-10 °C. Культивируют как можно прохладнее. За счёт низких температур и хорошо освещенного местоположения достигается компактность растения. Температуры выше 12 °C приводят к росту побегов и лиственного покрова и тормозят развитие цветов.



'Шербет YTT'

'Шербет синие небеса'

W 9770 'Королева Шарлотта' (Koenigin Charlotte) (в кг)
10 см, темно-синий, приятный аромат цветов, хорошие стебли на срезку, III-IV, ⚔ ⫶



Viola 'Королева Шарлотта'

Viola wittrockiana F_1-гибриды

Cats

Der Trendsetter im Violen-Markt

- Уникальные сорта на рынке, неповторимый рисунок цветов
- Многостебельный рост при качестве F1
- Замечательное качество посевного материала
- Стимулирование продаж с Point-of-Sale материалами



Viola wittrockiana для горшка Фиалка Виттрока ☺

Применение:	клумбы, смешанный контейнер, балконные ящики, создание «ковров»
Сроки продажи:	с февраля для весеннего цветения, с середины сентября для осеннего цветения
Форма посевного материала:	очищенные семена и отборные семена у серий 'Фантазия' и 'Фама'®
Срок посева:	в зависимости от географического положения (север раньше, юг позже) срок посева варьируется примерно на 20 дней. Для цветения осенью: начало-середина июля, культивируют как можно прохладнее; для весеннего цветения (в теплице, без заморозков 0-5 °C): конец августа - середина сентября; весеннее цветение (пленочный парник, не отапливаемый): начало августа - начало сентября
Проращивание*:	стадия I-II: 2-3 недели при 15-18 °C; стадия III-IV: 2-3 недели при 12-16 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом или перлитом и поддерживают постоянную влажность. После появления первых листьев сокращают влажность в субстрате и более сухо культивируют, но не позволяют посевам пересыхать. В стадии I+II* притеняют. Температуры выше 18 °C тормозят проращивание.
Температура:	10-15 °C. Культивируют как можно прохладнее. За счёт низких температур и хорошо освещенного местоположения достигается компактность растения. Температуры выше 12 °C влияют на раскидистость побегов растения. Зимовка при 2-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. При низких температурах, до тех пор, пока земля или горшки находятся в замерзшем состоянии (открытый грунт), растения укрывают нетканым полотном, защищая таким образом от пересыхания. При обработке регуляторами роста повышают температуру в теплице или пленочном парнике на короткий срок (48 часов) до 12-15 °C. Температуру вентиляции весной устанавливают на 8-10 °C. Растение, культивируемое без заморозков, приблизительно на 3-4 недели быстрее по сравнению с обычной культурой. Прохладу для растений создают не столько притенением, сколько воздушными потоками.


Viola F_1 'Кошки желтый'


(ограниченное предложение)
Viola F_1 'Кошки оранжевый'


Viola F_1 'Кошки красный-золотистый'


Viola F_1 'Кошки фиолетовый-белый'


Viola F_1 'Кошки белый'

* Описание стадий смотреть в введении каталога

Cats Кошки-(Cats) -серия (штучно) Benary-F_1-гибриды

'Кошки' объединяют главные положительные качества роста современных Фиалок-F_1 с волнующим, ранее ещё не созданным рисунком цветков, напоминающим мордочки кошек. Они имеют хорошо разветвленный, многостебельный рост и за счёт этого образуют богатое цветение. Для торговли есть специальный POS-материал.

X 0520	'Кошки желтый'
X 0520	'Кошки оранжевый' (ограниченное предложение)
X 0550	'Кошки красный-золотистый'
X 0560	'Кошки фиолетовый-белый'
X 0570	'Кошки белый'
X 0610	'Кошки смесь'



Идеи продаж от Benary

С этими средствами рекламы продажи 'Cats' вырастут:•
Четкие слоганы в Вашей рекламе
- Привлекательные постеры в торговом помещении
- Дополнительный мобильный стол
- информационные свисающие этикетки
- фирменная web-страница серии: www.viola-cats.de

По вопросам обращайтесь: info@benary.de, тел. /0049/ 5 541 7 009 0
Получение постеров/этикеток: "floramedia"
(Контактный e-mail : etiketten@floramedia.de)

www.Benary.de

Viola wittrockiana F_1-гибриды

'Фантазия'

Darauf ist Verlass!



- Превосходное качество посевного материала, так как семена проходят тщательный отбор
- Генетически компактный рост, крупные цветки на коротких стеблях
- Ранняя и плотная шапка цветов
- Устойчивость к морозам и жаре
- Первоклассный вид цветов и качество растений

Viola wittrockiana для горшка Фиалка Виттрока ☉

‘Фантазия’ (Fancy)-серия (штучно)
Benary-F_1-гибриды

Генетически компактная серия для высокой надежности производства, большей гибкости и максимизации доходов. ‘Фантазия’ оптимально для культивирования как осенью так и весной. Отличное качество цветов и унифицированность качества растений.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что заказы на специально подготовленный посевной материал должны поступать минимум за 8 недель до доставки.

X 0151	‘Фантазия синий с глазком’
X 0181	‘Фантазия сиреневый’, светло-лиловая игра красок
X 0201	‘Фантазия желтый с глазком’, (улучшенный) превосходный рост и вид цветов
X 0261	‘Фантазия желтый с красными крыльями’
X 0231	‘Фантазия золотисто-желтый’
X 0331	‘Фантазия карминно-розовый с глазком’, бордовый
X 0211	‘Фантазия персиковые тона’ нежные пастельные цвета от желтого, нежно-розового до белого
X 0311	‘Фантазия красный с глазком’, (улучшенный)
X 0341	‘Фантазия рубиновый’
X 0401	‘Фантазия серебристо-синий’
X 0271	‘Фантазия насыщенно-оранжевый’, самый насыщенный оранжевый тон на рынке
X 0471	‘Фантазия фиолетовый’
X 0351	‘Фантазия фиолетово-белый’
X 0291	‘Фантазия белый’, белоснежный
X 0381	‘Фантазия белый с глазком’
X 0371	‘Фантазия белый с красным глазком’
X 0451	‘Фантазия смесь’ улучшенная привлекательная смесь из всех 16 окрасок



Viola F_1 ‘Фантазия смесь’



‘Фантазия синий с глазком’



‘Фантазия сиреневый’



‘Фантазия желтый с красными крыльями’



‘Фантазия золотисто-желтый’



‘Фантазия персиковые тона’



‘Фантазия карминно-розовый с глазком’



‘Фантазия красный с глазком’



‘Фантазия рубиновый’



‘Фантазия серебристо-синий’



‘Фантазия насыщенно-оранжевый’



‘Фантазия фиолетовый’



‘Фантазия фиолетовый-белый’




‘Фантазия белый’



‘Фантазия белый с глазком’



‘Фантазия белый с красным глазком’



Viola F_1 ‘Фантазия желтый с глазком’



'Фама ® Голубой ангел'



'Фама ® Глаза испанки'



'Фама ® Чистый синий'



'Фама ® лимонный'



'Фама ® лимонный с глазком'



Viola F_1 'Фама'® молодые растения из ячеек

Viola wittrockiana для горшка Фиалка Виттрока ☉

'Фама'® (Fama®)-серия (штучно)
Benary-F_1-гибриды

Огромные цветки для выращивания под стеклом. Короткое время выращивания, компактный рост, короткие стебли, прямые цветы.

X 0190	'Фама ® Голубой ангел' (Fama® Blue Angel), голубой с белым глазком
X 0240	'Фама ® Чистый синий', чистейший синий
X 0390	'Фама® Глаза испанки' (Fama® Spanish Eyes) насыщенно-фиолетовый с белым краем на каждом лепестке
X 0220	'Фама ® лимонный'
X 0170	'Фама ® лимонный с глазком'

Этими красками идеально можно сочетать сорта серии 'Fancy'

Viola wittrockiana для открытого грунта Фиалка Виттрока ☉

Применение:	для клумб, смешанного контейнера, балконных ящиков, создания «ковров»
Сроки продажи:	с февраля для весеннего цветения, с середины сентября для осеннего цветения
Форма посевного материала:	очищенные семена и семена, подготовленные для механизированного посева
Срок посева:	в зависимости от географического положения (север раньше, юг позже) срок посева варьируется примерно на 20 дней. Для цветения осенью: середина июня - начало июля, культивируют как можно прохладнее; для весеннего цветения (в теплице, без заморозков 0-5 °C): конец августа середина сентября; весеннее цветение (пленочный парник, не отапливаемый): начало июля - начало августа
Проращивание:	2-3 недели при 15-18 °C
Условия проращивания:	в индивидуальных торфяных горшочках укрывая нетканым полотном, ставят в открытый грунт и поддерживают постоянную влажность. Нетканое полотно или фольга защищают от сильного солнечного облучения и повышают влажность воздуха. Открытый грунт: посевы не должны пересыхать. Используют только почвы, которые не пересыхают, очищенные от сорняков и равномерно увлажненные. Далее оснащают оросительной установкой. Землю не фрезеруют. Для упрощения посева используют рядовую сеялку. Сорняки регулярно удаляют. Свежие посевы защищают от пересыхания и сильного солнечного освещения, можно укрывать нетканым полотном. Расход посевного материала (при механизированном посеве) 0,14 гр. на 1 метр.
Температура:	выращивание в индивидуальных торфяных горшочках: При низких температурах, до тех пор, пока земля или горшки находятся в замерзшем состоянии (открытый грунт), растения укрывают нетканым полотном, защищая таким образом от пересыхания.



'Превосходно'® (Bravissimo'®) (в кг)
Benary-F_2-гибриды

34740 'Превосходно'®
Контрастная смесь для ярких групп, огромные цветы. Для осенней продажи и длительного цветения.

Viola wittrockiana для открытого грунта
Фиалка Виттрока ☺

‘Джокер’ (Joker)-серия (в кг)
Benary-F_2-гибриды

Зимостойкая фиалка Виттрока для открытого грунта с веселыми лицами, на осеннюю и весеннюю продажу

X 3720 ‘Джокер® золотисто-коричневый’ коричневато-красный край, золотистое лицо с темным рисунком

X 3830 ‘Джокер® голубой’, с белым лицом

X 3880 ‘Джокер® весёлый Джокер’® (Joker® Jolly Joker®), исключительная, эффектная комбинация красок оранжевого и фиолетового

X 3870 ‘Джокер® лицо покера’ (Joker® Poker Face) оранжевый с фиолетовым краем и темным глазком

X 3920 ‘Джокер® красный-золотистый’ золотистый со светло-красным краем и светло-красными лепестками-крыльями

X 3940 ‘Джокер® фиолетово-золотистый’, интересный двуцветный окрас

X 3980 ‘Джокер® смесь’ составлено из дюжины двух или трех цветных комбинаций окрасок.

‘Падпараджа’® (‘Padparadja®) (в кг)
Benary-F_2-гибриды

X 8410 ’ Падпараджа’
Неповторимое действие цвета, сочный тёмно-оранжевый; зимостойкий сорт, преимущественно для весенней продажи.



Viola F_2‘Падпараджа’ ®



Viola F_2 ‘Джокер смесь’



‘Весёлый Джокер’



‘Джокер ® золотисто-коричневый’



‘Джокер® голубой’



‘Джокер ® лицо покера’



‘Джокер ® фиолетово-золотистый’



Viola F_2 ’ Джокер ® красный-золотистый’

www.Benary.de


'Великаны предвестники небесно-голубой'


'Великаны предвестники Иллюминация®'


'Великаны предвестники махагоново-золотистый'


'Оранжевый с глазком'


'Красный-золотистый'


'Рубин'


'Серебряные крылья'


'Мандариновый'


'Белый с глазком'

Viscaria alpina (Silene suecica, Lychnis alpina) Лихнис альпийский ♃

Применение:	почвопокровный многолетник для альпинариев, горшечное растение
Сроки продажи:	апрель-сентябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	январь-март для не цветущего товара с июня; июль-август с зимовкой для цветения в следующем году
Проращивание:	10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают постоянную влажность и ставят на свет. После появления первых листьев снижают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Температура:	10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 5-6 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Чем ниже температура культивирования, тем компактнее строение растения, но срок культивирования продлевается на 2-3 недели.

Y 0040 Viscaria alpina (в гр)
10 см, розовый, вечнозелёный, стебли не липкие, идеальный многолетник для альпинария, IV–V, ⫶ △ ⌒


Viscaria alpina

'Великаны предвестники сине-белый'

'Великаны предвестники' (Riesen Vorbote)-серия (в кг)

Цветущие ранней зимой сорта с прямым, крупным ростом для контейнеров и открытого грунта, осенней и весенней продажи. Идеальные сорта для маленьких и больших клумб в садах, городского озеленения и кладбищ.

X 8480 'Великаны предвестники синий'
X 8440 'Великаны предвестники сине-белый'
X 8510 'Великаны предвестники желтый с глазком'
X 8540 'Великаны предвестники золотисто-желтый'
X 8580 'Великаны предвестники небесно-голубой'
X 8640 'Великаны предвестники Иллюминация®' (Illumination®), светло-красный
X 8590 'Великаны предвестники махагоново-золотистый'
X 8600 'Великаны предвестники оранжевый с глазком'
X 8620 'Великаны предвестники красный-золотистый'
X 8630 'Великаны предвестники рубин'
X 8680 'Великаны предвестники серебряные крылья'
X 8660 'Великаны предвестники мандариновый'
X 8650 'Великаны предвестники белый'
X 8700 'Великаны предвестники белый с глазком'
X 4460 'Великаны предвестники смесь серии'

'Швейцарские великаны' (Schweizer Riesen) (в кг)

Элитное качество для производителя. Компактная, серия с цветками-великанами для осенней продажи, контейнера и открытого грунта. Как раннецветущее растение для более теплых южных мест или как долго цветущее летнее растение для групп.

X 9300 'Schweizer Riesen Вечерняя заря'(Schweizer Riesen Abendglut), насыщенный темный коричнево-красный
X 9440 'Schweizer Riesen Альпийское озеро' (Schweizer Riesen Alpensee), насыщенно-синий
X 9500 'Schweizer Riesen Хранители гор' (Schweizer Riesen Bergwacht), тёмный бархатно-синий
X 9620 'Schweizer Riesen Золото фирнов' (Schweizer Riesen Firnengold) желтый с черными пятнами
X 9650 'Schweizer Riesen Снег фирнов' (Schweizer Riesen Firnenschnee), кремово-белый
X 9680 'Schweizer Riesen Огонь' (Schweizer Riesen Flamme) желто-красный в медных и бронзовых тонах
X 9730 'Schweizer Riesen Золотая крона' (Schweizer Riesen Goldkrone), чисто золотистый окрас
X 9770 'Schweizer Riesen Люцерн' (Schweizer Riesen Luzern), тона винного цвета
X 9840 'Schweizer Riesen Красное крыло' (Schweizer Riesen Roter Fluegel) золотистый с коричневыми крыльями и глазком
X 9870 'Schweizer Riesen Серебряная невеста' (Schweizer Riesen Silberbraut) белый с большим фиолетовым глазком
X 4790 'Высшего качества цветы от Benary' (Benarys Ausstellungsblumen), для самых высоких требований

'Весельский лёд'® (Weseler Eis®) (в кг)

Селекция типа Нижний Рейн. Крепкие, крупные цветки, раннее цветение для весенней продажи.

X 5910 'Весельский лёд® лазурно-синий' (Benary) пурпурно-фиолетовый, с лазурными крыльями
X 5950 'Весельский лёд® тёмно-синий'
X 6020 'Весельский лёд® Изысканность®' (Weseler Eis® Finesse®) (Benary) золотисто-желтый с легкой штриховкой
X 6000 'Весельский лёд® с желтым глазком'
X 5930 'Весельский лёд® небесно-голубые тона' (Benary)
X 5990 'Весельский лёд® красные тона'
X 6030 'Весельский лёд® ультрамарин' с глазком и фиолетовыми крыльями
X 6070 'Весельский лёд® белый с глазком' (Benary) кремово-белый с фиолетовым глазком
X 4240 'Весельский лёд® смесь' ранние с красными тонами, позже остальные окраски.

Zinnia elegans Срезка Цинния изящная для получения срезки ⊙

Применение:	горшечное растение и для клумб, высокорослые сорта на срезку
Сроки продажи:	сорта для клумб: май-июль; срезка: июль-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	для горшка: с февраля по март; на срезку в открытом грунте: в конце апреля – конце июня; непосредственный посев в открытый грунт: после заморозков с конца мая
Проращивание*:	стадия I: 7-10 дней при 20-22 °C Стадия II: 5-7 дней при 20-21 °C Стадия III: 7-10 дней при 18-20 °C Стадия IV: 17-18 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. Избегают переувлажнения. Слишком высокие или слишком низкие температуры замедляют проращивание. Влажность воздуха со стадии II медленно сокращают.
Температура: 1	5-16 °C. Температура вентиляции 22-25 °C в течение летних месяцев. Для закаливания снижают температуру до 12-14 °C, но циннии не переносят температуры ниже 10 °C. Это вызывает пожелтение листьев. Открытый грунт: предпочтительны теплые солнечные местоположения

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Zinnia angustifolia (Z. haageana, Z. mexicana)

Y 0420 'Персидский ковер' (Perserteppich) (в кг)
40 см, пестрая смесь, махровые и густомахровые цветки, VI-X, ⚔

Zinnia elegans (Benary) 'Великаны Benary' (Benarys Riesen)-серия (в кг)

100 см, элитный стандарт георгиновидных цветков за счёт интенсивного отбора. Величина 10-13 см и 100% махровость цветов, на длинных, толстых и особо прочных стеблях. Много цветков на стеблях на срезку, разнообразие применения, долго стоят в вазе. Замечательно для получения срезки в закрытом грунте.


Y 5050 'Великаны Benary золотисто-желтый'
Y 4800 'Великаны Benary кармазиновый'
Y 5020 'Великаны Benary карминовый'
Y 5840 'Великаны Benary коралловый'
Y 5000 'Великаны Benary лососево-розовый'
Y 4840 'Великаны Benary лиловый'
Y 5010 'Великаны Benary Сладкий лимон' (Benarys Riesen Limette) неповторимая, модная окраска, замечательно подходит для трендовых флористических композиций, высота 80 см, несколько ниже, чем у сортов-сестер.
Y 5080 'Великаны Benary оранжевый'
Y 5710 'Великаны Benary розовый'
Y 5900 'Великаны Benary алый'
Y 5280 'Великаны Benary насыщенно-красный'
Y 5630 'Великаны Benary фиолетовый'
Y 5330 'Великаны Benary белый'
Y 5930 'Великаны Benary смесь серии' из вышеупомянутых сортов без 'Великаны Benary Limette '



Zinnia Великаны Benary Сладкий лимон'



'Оклахома белый' (л.) и 'Великаны Benary белый' (п.) Сравнение величин


Zinnia Великаны Benary Сладкий лимон'


'Великаны Benary кармазиновый'


'Великаны Benary карминовый'


'Великаны Benary коралловый'


'Великаны Benary лососево-розовый'


'Великаны Benary лиловый'



'Великаны Benary оранжевый'


'Великаны Benary розовый'


'Великаны Benary алый'


'Великаны Benary насыщенно-красный'


'Великаны Benary фиолетовый'


Zinnia 'Маленькая драгоценность смесь серии'

Zinnia elegans Срезка Цинния изящная для получения срезки ⊙

'Маленькая драгоценность' (Lilliput Gem) (в кг)

45 см, маленькие соцветия, VII-X

Y 1120	'Маленькая драгоценность золотистый' (Lilliput Gem Golden)
Y 1180	'Маленькая драгоценность оранжевый' (Lilliput Gem Orange)
Y 1150	'Маленькая драгоценность пурпурный' (Lilliput Gem Purple)
Y 1190	'Маленькая драгоценность розовый' (Lilliput Gem Rose)
Y 1230	'Маленькая драгоценность алый' (Lilliput Gem Scarlet)
Y 1270	'Маленькая драгоценность белый' (Lilliput Gem White)
Y 1310	'Маленькая драгоценность смесь серии' (Lilliput Gem Formel Mix) смесь вышеперечисленных отдельных окрасок для профессионального выращивания цветов на срезку.

'Оклахома' (Oklahoma)-серия (в кг)

75-100 см, помпонные цветы величиной примерно 5 см, на длинных, сильных стеблях на срезку. 'Оклахома' очень богато цветущие сорта и устойчивы к альтернариозу. Идеально для профессионального выращивания цветов на срезку с высокой прибылью.


Y 1820	'Оклахома желтый'
Y 1830	'Оклахома золотистый'
Y 1880	'Оклахома карминно-розовый'
Y 1840	'Оклахома лососевый'
Y 1860	'Оклахома розовый'
Y 1870	'Оклахома алый'
Y 1890	'Оклахома ванильный'
Y 1900	'Оклахома белый'
Y 1950	'Оклахома смесь серии', из вышеперечисленных окрасок


Zinnia 'Оклахома золотистый'


Zinnia 'Оклахома желтый'


Zinnia 'Оклахома лососевый'


Zinnia 'Оклахома карминно-розовый'


Zinnia 'Оклахома розовый'


Zinnia 'Оклахома ванильный'


Zinnia 'Оклахома алый'


Zinnia 'Оклахома белый'


Zinnia
'Оклахома смесь серии'

Zinnia культура для горшка Цинния ⊙

Применение: горшечное растение для контейнера, клумбы и балкона, для создания «ковров»
Сроки продажи: апрель-сентябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: с февраля по июнь
Проращивание*: стадия I: 7-10 дней при 20-22 °C
Стадия II: 5-7 дней при 20-21 °C
Стадия III: 7-10 дней при 18-20 °C
Стадия IV: 17-18 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. Избегают переувлажнения. Слишком высокие или слишком низкие температуры замедляют проращивание. Влажность воздуха со стадии II медленно сокращают.
Температура: 15-16 °C. Температура вентиляции 22-25 °C в течение летних месяцев. Для закаливания снижают температуру до 12-14 °C, но циннии не переносят температуры ниже 10 °C. Это вызывает пожелтение листьев.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Zinnia elegans (Benary)

‘Циннита’® (Zinnita)-серия (штучно)

15-20 см, компактный, хорошо разветвленный рост с шарообразным строением, великолепие множества густомахровых цветков величиной 4-5 см, в 5 ярких окрасках, неповторимое сочетание из быстрой и несложной культуры, новый превосходный продукт, который может быть свободно куплен садоводом по выгодной цене весной, летом и осенью.

Y 1600 ‘Циннита ® желтый’
Y 1630 ‘Циннита ® оранжевый’
Y 1650 ‘Циннита ® розовый’
Y 1670 ‘Циннита ® алый’
Y 1700 ‘Циннита ® белый’
Y 1730 ‘Циннита ® смесь серии’

Zinnia hybrida ‘Изобилие’ (Profusion) (в кг)

30 см, цветки величиной 5 см, богатое цветение, компактный унифицированный круглый рост, очень хорошее ветвление, высокая всхожесть и устойчивость, V-X

Y 0530 ‘Изобилие вишневый’ (Profusion Cherry)

Y 0540 ‘Изобилие оранжевый’ (Profusion Orange)

Y 0560 ‘Изобилие белый’ (Profusion White)

Семена цветов - смеси

для посева в открытый грунт, долгое, продолжительное цветение и хорошая подборка цветов, богатая палитра.

Y 8890 ‘Летние цветы среднерослая смесь’ (Sommerblumen Halbhohe Mix) (в кг)
Для машинного посева, ⊙ ⚔

Y 9160 ‘Цветы и травы луга смесь’ (Blumen und Kr_uterwiese Mix) (в кг)
Более 50 однолетних и многолетних видов, для разных требований поверхности, предназначены для создание подобия естественного «дикого» луга. Посев может происходить поверх или вместе с семенами газонных трав, ⊙ ⁂


‘Цветы и травы луга смесь’


Zinnia ‘Циннита ® розовый’


Zinnia ‘Циннита ® желтый’


Zinnia ‘Циннита ® оранжевый’


Zinnia ‘Циннита ® алый’


Zinnia ‘Циннита ® белый’


Zinnia ‘Изобилие вишневый’


Zinnia ‘Изобилие оранжевый’


Zinnia ‘Изобилие белый’



Eragrostis abyssinica



Briza maxima



Cyperus glaber



Bromus macrostachys


Однолетние декоративные травы
Общие характеристики для всех однолетних трав из ассортимента Benary

Применение:	альпинарии, для садов-степей, как почвопокровники, на срезку и засушки
Сроки продажи:	зеленый товар: март-май, срезка: июль-сентябрь
Срок посева:	декабрь-март для зеленого товара с мая; март-май для цветущего товара с июля; в открытый грунт: с апреля
Проращивание:	10-12 дней при 20-22 °C
Условия проращивания:	посевы только слегка присыпают и держат в постоянной влажности. В открытом грунте защищают от склевывания птицами и поедания мышами. Температурные колебания способствуют проращиванию.
Температура:	12-15 °C

Z 1250 'Смесь однолетних декоративных трав' (Ziergraeser Mix Einjaehriger)
40-100 широкое разнообразие видов и сортов (без кукурузы), на срезку и как сухоцветы, VI-X



Hordeum jubatum



Lagurus ovatus

Briza maxima Трясунка, Бриза большая

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0280 Briza maxima (в кг)
40 см, величиной 2-3 см, подобные шишечкам, зелено-желтые колосья, светло-зеленая листва, высокодекоративно для свежих и сухих букетов, VI-VIII

Bromus macrostachys Костер крупноколосный

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0330 Bromus macrostachys (в кг)
60 см, плотная метелка из колосков с короткими колосковыми чешуйками, зеленая листва, привлекательно для пестрых посадок на клумбах, идеально для сухих букетов, VII-VIII

Cyperus glaber Циперус, Сыть бурая

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0490 Cyperus glaber (в гр)
75 см, шарообразные, декоративные, светло-зеленые шаровидные колосья, которые растут из листьев, темно-зеленая листва, типичное растение-солитер для прибрежного сада или влажных клумб, переносит затопление на высоту 0-10 см, аксессуар для флористики, VI-VIII

Eragrostis abyssinica (Eragrostis tef) Эрагростис абиссинский

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0540 Eragrostis abyssinica (в кг)
50 см, изящные, раскидистые, светло-зеленые метелки, зеленая листва, ценный вид для получения срезки и как сухоцвет, возможно получение муки, VII-X

Hordeum jubatum Ячмень гривастый

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0660 Hordeum jubatum (в кг)
60 см, зеленые, позже ярко желтые и розовые, колосья с плотным пучком длинных колосковых чешуек, зеленая листва, привлекательное растение для групп в летних цветниках, идеально для засушенных букетов, VII-IX

Lagurus ovatus Лагурус яйцевидный, Заячий хвост

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0740 Lagurus ovatus
40 см, белесые, яйцевидные колоски с шелковистыми чешуйками, зеленая листва, образующий «ковёр» рост, идеально для летних цветников и засушивания, VII-IX

Melinis (Rhynchelytrum) Мелинис

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0970 Melinis nerviglumis 'Саванна' (Savannah) (штучно)
25 см, плотная бархатистая, окрашенная в рубиново-розовый тон метелка, сине-зеленая листва, осенью окрас становится темно-красным, плоский, очень широкий куст, идеально для посадки в контейнер, а также для свежих и сухих композиций, VI-IX

Z 0960 Melinis repens (в кг)
80 см, заостренный, пирамидальный очень широкий куст, хорошо разветвленный, пушистые, бронзово-розовые метелки, зеленая перистая листва, высокодекоративно для летних клумб и больших букетов, VI-X

Panicum violaceum Просо фиолетовое

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0830 Panicum violaceum (в кг)
70 см, несколько свисающий рост, фиолетово-бронзовые метелки, зеленая, привлекательная тонкая листва, как декоративный многолетний кустарник и цветущее растение для клумб, корм для попугаев, идеально на срезку, IX-X

Pennisetum Перистощетинник

Форма посевного материала: вытертые семена

Z 0840 Pennisetum setaceum (P. rueppelii) (в кг)
Перистощетинник щетинковидный
60 см, устойчивые, тонкие, длиной 12-20 см, розово-фиолетовые колосья, зеленая тонкая листва, привлекательные, плотные кусты для посадки на клумбах, прекрасный вид у засушенных цветов, идеально на срезку, IX-X

Z 0930 Pennisetum villosum (P. longistylum) (в кг)
Перистощетинник волосистый
60 см, длиной 8-10 см и шириной 4-5 см, цилиндрические, белёсо-зеленые колосья, зеленая листва, для отдельных и групповых посадок на клумбах, хорошо смотрится в срезке, VII-X

Phalaris canariensis Фаларис, Канареечник канарский

Форма посевного материала: очищенные семена

Z 0760 Phalaris canariensis (в кг)
100 см, прямые, напоминающие шишечки, белесо-зеленые «полосатые» колосья, зеленая листва, корм для канареек, идеально как для свежей срезки, так и для засушивания, VII-VIII

Polypogon monspeliensis (Alopecurus monspeliensis) Многобородник, Полипогон горный

Форма посевного материала: вытертые очищенные семена

Z 0950 Polypogon monspeliensis
40 см, плотные, прямые, устойчивые, плотные, светло-зеленые метелки, позже становящиеся кремовыми, сине-зеленая листва, идеально для групп и срезки, VI-VIII



Melinis repens

Melinis 'Саванна'



Panicum violaceum



Pennisetum setaceum



Pennisetum villosum



Phalaris canariensis



Polypogon monspeliensis




Setaria macrostachya

Setaria macrostachya (Panicum macrostachyum) Щетинник крупноколосный

Форма посевного материала: очищенные семена


Z 0990 Setaria macrostachya
80 см, прямой устойчивый рост, похожие на лисий хвост, зелено-желтые «бубенчики» на сильных, прямых стеблях, зеленая листва, привлекательное растение-солитер для клумб, срезки, VI-X



Pennisetum setaceum



Cyperus alternifolius



Briza media



Многолетние декоративные травы Briza media (Briza tremula) Трясунка, Бриза средняя

Применение:	для альпинариев и для садов-степей, экстенсивного озеленения, почвопокровник, для получения срезки и засушивания
Сроки продажи:	зеленый товар: апрель-май, срезка: июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-март
Проращивание:	10-12 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают, возможно неравномерное прорастание семян. Температурные изменения способствуют проращиванию.
Температура:	12-17 °C. В первую зиму необходимо укрыть растения.

Z 0250 Briza media (в гр)
25 см, сердцевидные соцветия, прекрасные декоративные плоды, золотые плотно сжатые колосья, зеленая листва, свободный рост, нуждается в вернализации, V-VI

Cortaderia selloana Кортадерия Село, Пампасная трава

Применение:	многолетник-солитер, для песчаных садов-степей, как сухоцвет
Сроки продажи:	зелёный товар: апрель-май, срезка: июнь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	октябрь-декабрь
Проращивание:	12-21 день при 22-25 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Посевы только слегка присыпают вермикулитом. Посевной материал не хранят.
Температура:	15-18 °C. Выносит температуры до−10 °C. Рекомендуется зимняя защита.

Z 0400 Cortaderia selloana 'Белое перо' (Feder Weiss) (в гр)
200 см, многолетник-солитер, великолепные, на длинных стеблях, серебристо-белые «перья», длиной 80 см, серо-зеленые вечнозелёные листья, нуждается в вернализации, VIII-IX

Z 0430 Cortaderia selloana 'Розовое перо' (Feder Rosa) (в гр)
200 см, многолетник-солитер, великолепные, на длинных стеблях, розоватые «перья», длиной 80 см, серо-зеленые вечнозелёные листья, нуждается в вернализации, VIII-IX

Cyperus alternifolius (Cyperus involucratus) Сыть, Циперус очереднолистный

Применение:	горшечное, комнатное растение, для аквариумов, террариумов, водных садов
Сроки продажи:	круглый год
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	Круглый год
Проращивание:	10-12 дней при 20-24 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают и держат в постоянной влажности. Обязательно избегают высушивания субстрата.
Температура:	14-25 °C. Зимовка возможна при 12-15 °C.

Z 0470 Cyperus alternifolius (в гр)
60 см, зелено-коричневого цвета, на недлинных стеблях цветки на оригинальных высоких листьях, угловатые стебельки, популярное растение для создания плотного покрова для водных садов, аквариумов и террариумов, культивируется как однолетник,

FastraX -Композиция


Festuca Овсяница

Применение: декоративнолиственное растение, для альпинариев и песчаных садов-степей, экстенсивного озеленения, посадки на могилах, почвопокровник
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: F. amethystina и F. valesiaca: январь-март; F. glauca: февраль-апрель
Проращивание: 7-14 дней при 18-21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности.
Температура: 10-18 °C.

Z 0500 Festuca amethystina (в гр) FastraX
Овсяница аметистовая
30 см, темно-зеленая, тонкая листва, стройные, поникающие, рубиново-розовые метелки, кочкообразующий рост, вечнозелёное растение, нуждается в вернализации, VI-VII

Z 0550 Festuca glauca (F. cinerea) (в гр) FastraX
Овсяница сизая
50 см, сине-зеленая листва, от сине-зеленого до желтовато-коричневого оттенков свободные метелки, кочкообразующий рост, вечнозелёное растение, нуждается в вернализации, идеально для посадки на могиле, VI-VII

Z 0600 Festuca valesiaca 'Глауканта' (Glaucantha) (в гр) FastraX
(F. Cinerea-Hybride), Овсяница валлийская
30 см, серебристо-синяя листва, крохотные, бежевого тона, свободные метелки, кочкообразующий рост, вечнозелёное растение, нуждается в вернализации, идеально для осенней и зимней продажи, VII-IX


Festuca amethystina


Festuca glauca

Festuca valesiaca 'Глауканта'

Koeleria glauca Калерия сизая

Применение: песчаный сад-степь, экстенсивное озеленение, почвопокровник, многолетник для рабатки
Сроки продажи: апрель-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: декабрь-март
Проращивание: 7-14 дней при 21 °C
Условия проращивания: подсвечивать. Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в постоянной влажности. При слабом прорастании, содержат посевы 14 дней при 5 °C и затем далее культивируют снова при 20-22 °C. Возможно неравномерное прорастание.
Температура: 10-18 °C.

Z 0720 Koeleria glauca (в гр)
25 см, голубая со стальным отливом листва, сине-зеленые, позже золотисто-коричневые, плотные колосья на длинных стеблях 40 см, кочкообразующий вечнозелёный многолетник, ценный почвопокровник, нуждается в вернализации, VI-VII


Koeleria glauca



Melica «Красный шпиль»



Nassella «Хвост пони»



Stipa barbata



Stipa capillata



Stipa pennata



Luzula nivea

Luzula nivea Лузула белая, Ожика нежная

Применение:	многолетник для леса и края пруда, рабатки, почвопокровник, на срезку
Сроки продажи:	апрель-октябрь, срезка: июль-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-март
Проращивание:	7-14 дней при 18-20 °C
Условия проращивания:	подсвечивать. Семенам дают разбухнуть 24 часа. Посевы слегка присыпают вермикулитом и поддерживают постоянную влажность. При слабом проращивании, держат посевы 14 дней при 5 °C и затем далее культивируют снова при 18-20 °C. Возможно неравномерное прорастание.
Температура:	15-20 °C.

Z 0770 Luzula nivea (в гр)
60 см, изящные, белоснежные зонтичные соцветия, на длинных, элегантных стеблях, серебристая мохнатая темно-зеленая листва, рост в форме кочки, вечнозелёное растение. Идеально для любой тенистой местности, очень хороший многолетник на срезку, нуждается в вернализации, VII-VIII, ⚔

Melica transsilvanica Перловник трансильванский

Применение:	многолетник-солитер, образующий куст, для рабаток, получения срезки и засушивания, плоды декоративны
Сроки продажи:	апрель-октябрь, срезка: июнь-июль
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	февраль-апрель
Проращивание:	6-10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают и держат в постоянной влажности.
Температура:	15-20 °C.

Z 0850 Melica transsilvanica «Красный шпиль» (в гр) FastraX
160-180 см, привлекательные красно-коричневые, длинные колосья, прекрасные декоративные плоды, зеленая листва, образующий кустарник рост, очень прибыльное растение, замечательно для контейнера, идеально для получения срезки и засушивания, культивируется как однолетник, VI-VII, ⚔

Stipa Ковыль

Применение:	многолетник солитер и для рабаток, декоративные метелки, пригодные на срезку и как сухоцвет
Сроки продажи:	апрель-октябрь, срезка: в зависимости от момента цветения: июнь-август
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	декабрь-апрель
Проращивание:	Nassella: 6-10 дней при 18-20 °C; Stipa: 7 дней при 15-18 °C, 4-6 недель при 0-5 °C; затем культивируют при 18-20 °C.
Условия проращивания:	Nassella: в темноте. Посевы присыпают и поддерживают постоянную влажность. Stipa: в прохладе. Посевы присыпают и поддерживают постоянную влажность.
Температура:	10-18 °C. Рекомендуется защита при бесснежных зимах.

Z 1080 Nassella tenuissima «Хвост пони» (в гр) FastraX
(Stipa tenuissima) Ковыль декоративный
90 см, серебристо-блестящие метелки с длинными колосковыми чешуйками, тонкая, мягкая, вечнозелёная листва, напоминающая волосы, привлекательный, образующий кустарник многолетник-солитер, идеально для контейнера и получения срезки, культивируется как однолетник, VI-VII, ⚔

Z 1040 Stipa barbata «Перо» Ковыль бородатый (в гр)
80 см, шелковистые серебряные сверкающие метелки с очень длинными колосковыми чешуйками, вечнозеленая листва, привлекательный, образующий кустарник многолетник-солитер, идеально для контейнера и получения срезки, нуждается в вернализации, VI-VIII, ⚔

Z 1020 Stipa capillata (в гр)
'Фата невесты' Ковыль волосовидный
80 см, серебристо-зеленые, статные метелки с сильно раскидистыми колосковыми чешуйками, твердая прямая серо-зеленая листва, вечнозелёное растение, образующее кустарник, многолетник-солитер или для групп, нуждается в вернализации, VIII-IX, ⚔

Z 1050 Stipa pennata Ковыль перистый(в гр)
75 см, серебристые метелки с длинным перистыми колосковыми чешуйками, идеально для натуральных садов и песчаных садов-степей, нуждается в вернализации, V-VII, ϵ

Ассортимент декоративных тыкв

Curcurbita и Lagenaria

Применение:	создания изгородей и ширм из лиственного покрова, декоративные плоды
Сроки продажи:	середина апреля - июнь; плоды: сентябрь-октябрь
Форма посевного материала:	очищенные семена
Срок посева:	апрель-май для горшечных растений
Проращивание:	5-10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания:	в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и держат в постоянной влажности. После развития первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и сокращают влажность субстрата. Обязательно избегают переувлажнения.
Температура:	12-°C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают. Тыквы не переносят температуры ниже 5 °C, поэтому растения обязательно защищают от холодных ночей.



'Мелкоплодная смесь серии'

Мелкоплодные декоративные тыквы

Y 9400 'Бейби Бу' (Baby Boo) (в кг)
8-10 см, приземисто-шарообразная форма, слегка в бороздках, гладкая, белая кожура плода

Y 9410 'Коу-Тор Хейтив' (Cou-Tors Hative)
20 см, тыквы в форме сильно согнутых сосудов, как элегантно изогнутая лебединая шея, грубая, пузырчатая поверхность, яркая золотисто-оранжевая кожура

Y 9440 'Маленькая двуцветная' (Kleine Bicolor) (в кг)
8-12 см, гладкие плоды, привлекательные полосатые зелено-белые плоды

Y 9450 'Маленькая двуцветная груша' (Kleine Birne Bicolor) (в кг)
8-12 см, грушевидные, гладкие плоды, верхняя половина оранжевая, нижняя половина окрашена в зеленый цвет

Y 9460 'Маленькая оранжевая' (Kleine Orange) (в кг)
8-12 см, гладкая поверхность, шарообразные плоды, ярко оранжевая окраска

Y 9490 'Маленькая бородавчатая' (Kleine Warzen) (в кг)
10-15 см, шарообразные плоды с суровой, бородавчатой поверхностью

Y 9510 'Десять похвал' (Ten Commendments) (в кг)
10-15 см, звёздчатая форма, так же известна как "тыква-корона", во всех возможных комбинациях оранжевого, желтого, зелёного и белого.

Y 9390 'Мелкоплодная смесь серии' (Kleinfruechtige Formel Mix) (в кг)
5-20 см, удивительное разнообразие форм и красок в сбалансированной смеси с гармоничным цветовым составом. Смесь серии содержит шарообразные, звёздчатые, ребристые с бородавками, грушевидные и как лебединая шея формы. Осенние окраски: золотистые, оранжево-красные и матово-медные в большинстве, но хорошо смотрятся в привлекательном контрасте с белыми, желто-зелеными и бело-зелеными плодам.



'Бейби Бу'



'Коу-Тор Хейтив'



'Маленькая двуцветная'



'Маленькая двуцветная груша'



'Маленькая оранжевая'



'Маленькая бородавчатая'



'Десять похвал'



'Крупноплодная смесь'

Средне и крупноплодные декоративные тыквы

Y 9350 'Крупноплодная Тюрбан' (Grossfruechtige Turbane) (в кг)
30-50 см, очень декоративная "митра епископа", гладкая поверхность, яркая оранжево-красная шапочка, внизу с бело-зелёным мраморным пятном

Y 9340 'Крупноплодная смесь' (Grossfruechtige Mix) (в кг)
Дубинки, бутылки, и т.д., зеленого, желтого и пестрого окраса


Y 9330 'Тыквы-сосуды смесь' (Kalebassen Mix) - Бутылочная тыква (в кг)
20-30 см, выраженная форма бутылок, глянцевая гладкая форма, кожура зелено-желтого цвета

Y 9290 'Ракета' (F_1-тыква для Хэллоуин (штучно)
35-40 см (6-9 кг), высокая и круглая, немного ребристая, яркий насыщенный оранжевый окрас, высокий доход, очень ранняя, съедобна

'Крупноплодная Тюрбан'

'Бейби Бу'





'Ракета' F_1-тыква для Хэллоуин

'Тыквы-сосуды смесь'



Zea mays 'Амеро'

Zea mays japonica Кукуруза японская ⊙

Применение: для декоративности осенью и как сухоцвет
Сроки продажи: зеленый товар: май-июнь; початки: сентябрь-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: апрель-май для горшечных растений; открытый грунт: с мая
Проращивание: 3-5 дней при 18-24 °C
Условия проращивания: в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность субстрата. Обязательно избегают переувлажнения.
Температура: 15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до продажи растения закаливают. По возможности избегают температуры ниже 10 °C.

Z 1100 'Амеро' (Amero) (в кг)
180 см, початки с пестрыми зернами для цветочных магазинов и создания композиций высокого класса
Z 1140 'Золотистые зерна' (Gelbe Beere) (в кг)
100 см, маленькие окрашенные в желтый, плотные початки
Z 1170 'Красные зерна' (Rote Beere) (в кг)
100 см, маленькие насыщенно-пурпурные початки

Декоративные плоды и овощи

Fragaria vesca Земляника лесная

Применение: плоды, посадка в горшки и кашпо, балконные ящики, обрамление клумб
Сроки продажи: середина апреля - июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: январь-март для горшечных растений
Проращивание: 10-14 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность субстрата. Непременно избегают переувлажнения.
Температура: 15-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Незадолго до продажи растения закаливают.

P 2910 'Рюген Benary' (Benarys Ruegen) (в кг)
Отличные крупные плоды, от средне до темно-красного, ароматный, кисло-сладкий сорт, плотная мякоть у плодов, множество ягод с конца мая до поздней осени, много побегов и не образует усов, вечнозеленое растение, ♃

Lycopersicon esculentum Томат настоящий ⊙

Применение: овощ, посадка в горшки и вазоны
Сроки продажи: середина апреля - июль
Форма посевного материала: очищенные семена
Срок посева: середина февраля – апрель для горшечных растений
Проращивание: 5-10 дней при 18-22 °C
Условия проращивания: в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы присыпают вермикулитом, песком или субстратом и поддерживают постоянную влажность. После развития первых листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают влажность субстрата. Непременно избегают переувлажнения.
Температура: 17-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Незадолго до продажи растения закаливают. Томаты не переносят температуры ниже 5 °C, поэтому растения обязательно защищают от холодных ночей.

P 9970 'Садовая радость Benary'® (Benarys Gartenfreude®) (в кг)
80 см, маленькие, круглые, красные, сладкие плоды, обильно украшающие всё растение, идеально для посадки в горшки или для вазона на балконе, террасе или в открытом грунте, ○



Lycopersicon 'Садовая радость Benary'®

Лекарственные и пряные травы · однолетние (в кг)

Название	Вес семян шт/гр	Применение, высота растения, естественное цветение	Срок культивирования (горшок 9-10 см) количество растений	Проращивание, срок посева	Проращивание подсвечивать/ в темноте, расстояние между растениями (см)	Температура для роста, Замечания
Z 7930 Anethum graveolens Укроп ароматный	850	Пряное, лекарственное растение, 100 см, VI-VIII	6-8 недель 1-2 растения	5-12 дней при 15-21 °C Горшок: I-IV Открытый грунт: III-IV	Подсвечивать 25 x 30 см	12-18 °C Подробные культурные указания как для Anethum
Z 7950 Anethum graveolens 'Четверка' (Vierling) Укроп	1000	Пряное, лекарственное растение, срезка, 80 см, VI-VIII	6-8 недель 1-2 растения Открытый грунт: III-IV	5-12 дней при 15-21 °C Горшок: I-IV	Подсвечивать 25 x 30 см	12-18 °C Подробные культурные указания как для Anethum
Z 7530 Borago officinalis Огуречная трава	50	Пряное растение, 3 0-80 см, V-VII	10-12 недель 1-2 растения	5-8 дней при 21 °C Горшок: II-VII Открытый грунт: III-VII	В темноте 30 x 30 см	14-16 °C
Z 8320 Coriandrum sativum Кориандр	100	Пряное, лекарственное растение, 60 см	10-11 недель 6-10 растений	7-10 дней при 18-21 °C Горшок: II-VII Открытый грунт: IV	В темноте 25 x 15 см	13-14 °C
Z 8270 Matricaria chamomilla Ромашка аптечная	22800	Для чая, растение, лекарственное растение, 0 см, V-IX	-	5-8 дней при 21 °C Горшок:- Открытый грунт: IV	В темноте 30 x 15 см	Непосредственный посев в открытый грунт. Сбор только в полном роспуске
Z 7150 Ocinum basilicum 'Базилик тонколистный кудрявый зелёный'	800	Пряное растение, 30 см, VI-VIII	8-9 недель 6-10 растений	5-8 дней при 21 °C Горшок: II-VIII Открытый грунт: V	Подсвечивать 25 x 25 см	17-18 °C морозоусто йчиво
Z 7170 Ocinum basilicum 'Базилик Геновезе'	650	Пряное, лекарственное растение, 45 см, VI-VIII	8-9 недель 6-10 растений	5-8 дней при 21 °C Горшок: II-VIII Открытый грунт: V	Подсвечивать 25 x 25 см	17-18 °C морозоусто йчиво
Z 8540 Origanum majorana однолетний Майоран	4600	Пряное растение, 4 0 cm, VI	11-12 недель 6-10 растений	5-8 дней при 21 °C Горшок: II-VIII Открытый грунт: V	В темноте 20-30x15 см	13-14 °C морозоусто йчиво
Z 7580 Satureja hortensis einjaehriges Чабер садовый	1700	Пряное, лекарственное растение, 50 см, VI-X	10-12 недель 1-2 растения Открытый грунт: V	12-15 дней при 21 °C Горшок: IV-VIII	Подсвечивать 25x25 см	15-17 °C морозоусто йчиво



Ocinum basilicum
'Базилик Геновезе'

Лекарственные и пряные травы · многолетние (в кг)

Название	Вес семян шт/гр	Применение, высота растения, естественное цветение	Срок культивирования (горшок 9-10 см) количество растений	Проращивание, срок посева	Проращивание подсвечивать/ в темноте, расстояние между растениями (см)	Температура для роста, Замечания
Z 8980 Allium schoenoprasum Лук шнитт	1000	Пряное растение, 30 см, VI-VII	15-17 недель с комом земли не разделяя	4-8 дней при 15-21 °C; горшок: круглый год; открытый грунт: с III	Подсвечивать 30 см между рядами	16 °C
Z 8070 Artemisia dracunculus Эстрагон русский, полынь	6200	Пряное растение, 150 см, VIII-X	11-13 недель 1-2 растения	4-8 дней при 21-22 °C; горшок: I-IV; открытый грунт: III-IV	В темноте 40 x 40 см	13-14 °C Эстрагон русский по вкусу мягкий как французский Estragon
Z 7340 Artemisia vulgaris Полынь обыкновенная	6500	Пряное, лекарственное растение, 150 см, VII-VIII	11-13 недель 1-2 растения	4-8 дней при 21-22 °C; горшок: I-III; открытый грунт: посев в ящик: II и высадка в IV-V	В темноте 40 x 50 см	13-14°C
Z 9270 Gallium odoratum (Aspergula odorata) Подмаренник душистый	160	Пряное, лекарственное растение, 60 см 15 см, V-VI	16-20 недель 6-10 растений	7-14 дней при 18-20 °C 28-53 дня при 0-4 °C; 7 дней при 10 °C; далее культивируют при 20 °C; оршок: XII-III; открытый грунт: IX-X	В прохладе 25 x 10 см	15-20 °C местоположение - полутень. Листья употребляют до цветения
Z 9820 Hyssopus officinalis Иссоп Ромашка аптечная	850	Для чая, растение, лекарственное растение, для чая 40 см, VI-IX	10-12 недель 1-2 растения	7-10 дней при 20 °C горшок: II-V; открытый грунт: V	В темноте 30 x 20 см	10-18 °C
Z 8440 обработанные семена Lavanduala angustifolia 'Лаванда настоящая'	1000	Пряное, лекарственное растение, 50 см, VI-VII	16-20 недель 1 растение	10-14 дней при 22-24 °C; горшок: I-III открытый грунт: V	Подсвечивать 30 x 30 см	12-21 °C не Подробные культурные указания как для Lavandula
Z 8440T АреХ-семена Lavanduala angustifolia 'Лаванда настоящая'	1000 (штучно)	Пряное, лекарственное растение, 50 см, VI-VII	16-20 недель 1 растение	10-14 дней при 22-24 °C горшок: I-III открытый грунт: V	Подсвечивать 30 x 30 см	12-21°C не Подробные культурные указания как для Lavandula
Z 8500 Levisticum officinale 'Волшебная трава' Любисток	140	Пряное, лекарственное растение, 150 см, VII-VIII	10-11 недель 1-2 растения	5-9дней при 21-22 °C горшок: II-VIII открытый грунт: V	В темноте 40 x 50 см	10-16 °C не корнеплоды используют только на второй год
Z 9990 Melissa officinalis Мелисса лимонная, лекарственная	2000	Пряное, лекарственное растение, 80 см, VI-VIII	13-14 недель 1-2 растения	3-8 дней при 20-21 °C горшок: II-V открытый грунт: посев в ящик : III и высадка в V	В темноте 30 x 30 см	13-16 °C
Z 8680 Menta piperita Мята перечная	14600	Пряное, лекарственное растение, для чая, 70 см, VII	12-13 недель 1-2 растения	10-12 дней при 20-21 °C горшок: II-V открытый грунт: посев в ящик : III и высадка в V	В темноте 30 x 30 см	13-16 °C
Z 8560 Origanum vulgare Душица обыкновенная, майоран	8560	Пряное, лекарственное растение, 50 см, VII-IX	12-13 недель 1-2 растения	5-8 дней при 21 °C горшок: II-V открытый грунт: V	В темноте 20-30 x 15 см	13-18 °C
Z 8780 Rosmarinus officinalis Розмарин	1200	Пряное, лекарственное растение, 60 см, VI-VIII	16-18 недель 1-2 растения	10-15 дней при 21 °C горшок: II-V открытый грунт: V	Подсвечивать 40-30 см	13-18 °C Зимовка возможна только с зимней защитой.
Z 8810 Salvia officinalis Шалфей	130	Пряное, лекарственное растение, 70 см, VI-VIII	12-14 недель 1-2 растения	5-10 дней при 21 °C горшок: II-V открытый грунт: V	В темноте 30 x 40 см	10-15 °C
Z 8770 Sanguisorba minor Кровохлебка	160	Пряное растение, 50 см, V-VI	13-14 недель 1 растение	3-8 дней при 20-21 °C горшок: II-V открытый грунт: посев в ящик : III и высадка в V	В темноте 30 x 30 см	13-16 °C
Z 9170 Thymus vulgaris Тимьян	4600	Пряное, лекарственное растение, 40 см, VI-IX	13-15 недель 1-3 растения	3-6 дней при 21 °C горшок: II-V открытый грунт: V	В темноте 25 x 20 см	10-15 °C



FrühlingsFlirt®

Будьте законодателями модных тенденций!



Высококачественные, с прочной структурой и устойчивой окраской весенние первенцы очень хорошо были приняты на рынке. Производители и продавцы подтверждают: "Растения программы 'Весенний флирт' соответствуют последним тенденциям, приносят хорошую прибыль еще до начала основного сезона "

"Тон в тон" или пестрая смесь, предлагаются Benary и Kientzler примерно 50 лучших сортов, которые можно гибко комбинировать при производстве и в торговле (обзор продукции стр. 194-199).

Обширная реализация охватывает наряду с высоким качеством сортов также материалы "Point-of-Sale", которые предоставляются крупными заказчиками. Интернет-страница www. Fruehlingsflirt.de обильная информацией и не сможет оставить вас равнодушными к 'Весеннему флирту'®.

Используйте выгодные преимущества программы 'Весенний флирт'®:

- Огромное разнообразие сортов, крепкие, устойчивые растения
  - → Высокую гибкость в планировании производства и выращивании отдельных партий
- Быстрые и надежные культуры
  - → Прибыльное производство
- Длительный срок жизни
  - → Хороший внешний вид для продажи
- Создание креативных сочетаний в контейнерах и вазонах
  - → Высокое удовлетворение самых разнообразных требований
- Срок продажи до сезона клумбовых и балконных растений
  - → дополнительная прибыль наряду с классическим весенним ассортиментом
- Соответствующий сегодняшним тенденциям ассортимент
  - → Получение новых клиентов

www.Benary.de



Scabiosa
'Ритц синий'

FastraX

'Формула' для отбора многолетников: быстро, красиво, прибыльно



Композиция программы FastraX

Производители во всем мире используют многолетники FastraX от Benary для повышения своей прибыли
Для хорошей продажи сортов FastraX, с их широким разнообразием, открывают магазины многолетников, где так же продают растения для высадки на клумбах и для украшения балконов (обзор продукции стр. 194-199)
Секрет успеха от FastraX основывается на строгом отборе Benary по различным критериям, по которым отбираются многолетники: и как результат этого очень высококачественного отбора примерно 100 многолетников, которые всегда есть в наличии у нас для производителей:

- Короткий срок культивирования, без вернализации
  → Программируемое производство
- Огромное разнообразие, предназначенное для самых разных климатических условий
  → Высокая гибкость в использовании ресурсов
- Пригодность ассортимента в течение долгого периода
  → продление сезона продаж
- Разнообразие возможных творческих комбинаций
  → повышение потенциала продаж

Если Вы интересуетесь надежным, высоко прибыльным производством высококачественных многолетников, FastraX-многолетник являются надежной основой для Вашего успеха.



www.Benary.de



Маркетинговая поддержка Benary для повышения продаж и удовлетворения клиентов



Переговоры с клиентами на IPM в Эссене и во время выставки "Pack Trials" Benary в Ханн. Мюнден, 2005

Наша маркетинговая деятельность направлена, в том числе, на повышение Вашего экономического успеха с посевными материалами от Benary:

- Наглядные «презентации» для разнообразных культур, информативные сравнения сортов, привлекательные представления сортов и динамика продаж
- Исследования культур в сотрудничестве с учебными заведениями и лабораториями, а также международными учреждениями
- Работа прессы и отправка проб посевного материала примерно для 500 абонентов специальной периодики и журналов для любителей во всем мире
- Участие в международных отраслевых ярмарках и ориентированных на конечного потребителя выставках растений
- Обширный банк данных продукции с информацией по культивированию для всех продуктов Benary на домашней странице: www.benary.de и www.benary.com
- Подробный медиаматериал во всем мире больше чем в 25 журналах
- "Point of Sale" - программы для неповторимых продуктов Benary



Презентационный стенд Benary на IPM в Эссене в 2005

Используйте нашу концепцию "Point-of-Sale" для Вашего успеха!



Стимулируйте рост продаж вашей фирмы с помощью использования наших идей для реализации неповторимой продукции от Benary. Таким образом, Вы можете порадовать своих старых клиентов и приобрести новых.

- Постеры для ориентации в торговом помещении и сосредоточении внимания на продукции
- Ярлычки как важный источник информации для клиентов
- Информативные интернет-страницы:
  - www.begonia-nonstop.de
  - www.viola-cats.de
  - www.fruehlingsflirt.de

для профессионального садовода и просто любителя

Не забывайте, бесплатно зарегистрироваться на домашнем web-сайте как продавец бегоний серии ‘Нонстоп’®, фиалок ‘Кошки’ или растений программы ‘Весенний флирт’®. Так же можно позвонить в Benary по тел.: /0049/ 5 541 7 009 0.



Содержание

Род, вид, сорт	Страница	Вид растения	FastraX многолетники	ApeX семена	Для клумб	Для рабаток	Для открытого грунта	Ампельне	Выющееся	Для альпинариев	Комнатное	Раннецветущее
A												
Achilla filipendulina	10	♃, ✂			●	●	●					
Achillea millefolium	10	♃, ✂	●		●	●	●				●	
Achillea ptarmica	10	♃, ✂	●		●	●	●					
Achillea tomentosa	10	♃, ✂					●			●		
Aconitum napellus	10	♃			●	●	●					
Ageratum houstonianum F_1-Hybriden	11	☉			●		●					
Ageratum houstonianum Schnitt	11	☉, ✂					●					
Alchemilla mollis	11	♃, ✂		●	●	●	●				●	●
Allium schoenoprasum	188	♃										
Alyssum montanum	12	♃								●	●	●
Alyssum saxatile	12	♃								●	●	●
Amaranthus caudatus	12	☉, ✂			●	●	●					
Ammi majus	13	☉, ✂			●	●	●					
Ammobium alatum	13	☉, ✂			●	●	●					
Anacyclus depressus	13	♃			●					●	●	●
Anemone multifida	14	♃, 🗑				●					●	
Anemone sylvestris	14	♃, 🗑								●		
Anethum graveolens	15, 187	☉, ✂			●	●	●					
Antirrhinum majus	15, 16	☉, ✂			●	●						
Aquilegia alpina	17	♃, 🗑			●	●					●	
Aquilegia caerulea 'Benarys Spezialrasse'	17	♃, 🗑, ✂			●	●	●					
Aquilegia caerulea 'Himmelblau'	17	♃				●	●					
Aquilegia caerulea 'Musik'®	18	♃, 🗑, ✂			●	●	●				●	
Aquilegia flabellata 'Cameo'	18	♃, 🗑			●					●	●	●
Aquilegia flabellata 'Mini Star'®	18	♃, 🗑			●					●	●	
Aquilegia hybrida	19	♃, 🗑			●	●				●	●	●
Arabis caucasica	20	♃			●	●				●	●	●
Arenaria montana	20	♃			●					●	●	●
Argyranthemum frutescens	20	☉			●	●						
Armeria hybrida	21	♃, ✂			●	●				●	●	
Armeria latifolia	21	♃, ✂			●	●				●		
Armeria maritima	21	♃, ✂			●	●				●	●	
Artemisia	188	♃										
Asclepias tuberosa	21	♃, ✂	●		●	●	●					
Asparagus densiflorus, A. myriocladus	22	☉, 🗑, ✂										
Asparagus pseudoscaber, A. setaceus	22	♃, 🗑, ✂										
Aster alpinus	22	♃, 🗑			●	●				●	●	
Aster amellus 'Hybridus'	23	♃, ✂			●	●						
Aster novae-angliae + A. novi-belgii	23	♃, ✂	●		●	●	●					
Astilbe arendsii 'Bella', 'Showstar'®	24	♃, 🗑			●	●	●				●	
Astilbe arendsii 'Grande'	24	♃, ✂			●	●	●					
Astrantia major	24	♃, ✂			●	●					●	
Atriplex hortensis	25	☉, ✂										
Aubrieta cultorum	25	♃, 🗑			●	●				●	●	●
B												
Begonia cheimantha 'Love-Me'	26	🗑										
Begonia elatior 'Charisma'®	26	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Cocktail'®	30	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Derby'®	30	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Lotto'®	29	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Sprint'	29	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Olympia® Starlet'	30	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Organdy'®	30	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Party'	32	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Super Olympia'®	28	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia semperflorens 'Vision'®	31	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia tuberhybrida 'Illumination'®	37	☉, 🗑			●			●				
Begonia tuberhybrida 'Nonstop'®	34	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia tuberhybrida 'Ornament'®	36	☉, 🗑			●	●	●					
Begonia tuberhybrida 'Panorama'®	37	☉, 🗑			●		●	●				
Begonia tuberhybrida 'Pin Up'®	36	☉, 🗑			●	●	●					
Bellis perennis	38, 39	☉, 🗑			●	●						●
Bergenia cordifolia	39	♃, ✂			●	●	●			●		
Blumensamen Mischung 'Sommerblumen Halbhohe Mix'	179	☉, ✂					●					

Род, вид, сорт	Страница	Вид растения	FastraX многоцветники	AreX семена	Для клумб	Для рабаток	Для открытого грунта	Ампельне	Выющееся	Для альпинариев	Комнатное	Раннецветущее
Blumensamen Mischung 'Blumen- und Kräuterwiese Mix'	179	♀			●		●					
Borago officinalis	187	☉										
Brachycome iberidifolia	40	☉, 🗑			●		●					
Briza maxima	180	☉			●	●	●					
Briza media	182	♀, ✂			●	●	●					
Bromus macrostachys	180	☉			●	●	●					
Browallia speciosa	40	☉, 🗑										
Bupleurum griffithii	41	☉, ✂			●	●						
C												
Calceolaria herbeohybrida	41	☉, 🗑										
Calceolaria integrifolia	42	☉, 🗑					●					
Calendula officinalis	42	☉, 🗑, ✂			●	●	●					
Callistephus chinensis 'Schnittsorten'	44-50	☉, ✂			●	●	●					
Callistephus chinensis 'Zwerg-, Topf- und Beetastern'	43-45	☉, 🗑			●	●	●					
Campanula carpatica	51	♀, 🗑	●		●		●			●	●	
Campanula garganica	52	♀, ✂			●		●			●	●	
Campanula glomerata	52	♀, ✂			●		●					
Campanula poscharskyana	52	♀, ✂	●		●		●			●	●	
Carlina acaulis	53	♀, ✂			●	●	●			●	●	
Celosia cristata	53	☉, 🗑			●	●	●					
Celosia plumosa	54	☉, 🗑			●	●	●					
Centaurea cyanus	55	☉, ✂			●	●	●					
Centaurea macrocephala	55	♀, ✂				●	●					
Centaurea montana	55	♀, ✂	●		●	●	●					
Centranthus ruber	56	♀, ✂	●		●	●	●					
Cerastium tomentosum	56	♀			●	●				●	●	●
Chrysanthemum	57	☉			●	●	●					
Cleome spinosa	58	☉			●	●	●					
Cobaea scandens	58	☉							●			
Coleus blumei	59	☉, 🗑			●	●	●					
Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise'	59	♀	●		●		●				●	
Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind', 'Sunray'	59	♀, ✂			●	●					●	
Coriandrum sativum	187	☉										
Cortaderia selloana	182	♀, ✂			●	●	●				●	
Corydalis lutea	60	♀					●			●	●	
Cosmos bipinnatus	60	☉, ✂			●	●						
Cosmos sulphureus	61	☉, 🗑, ✂			●		●					
Craspedia globosa	61	☉, ✂			●	●	●					
Cucurbita pepo	185								●			
Cuphea ignea	62	☉, 🗑			●		●	●				
Cyperus alternifolius	182	♀, 🗑										
Cyperus glaber	180	☉, ✂			●							
D												
Dahlia variabilis 'Figaro Mix'	62	☉			●	●	●					
Dahlia variabilis 'Gartenfreude'®	62	☉			●	●	●					
Delphinium consolida	63	☉, ✂			●	●	●					
Delphinium cultorum (D. Hybriden)	63	♀, ✂	●		●	●	●				●	
Delphinium grandiflorum	64	♀, 🗑, ✂	●		●	●	●			●	●	
Delphinium nudicaule	65	♀	●			●					●	
Delphinium semibarbatum	65	♀, ✂				●						
Dianthus barbatus	66	☉, ✂			●	●	●					
Dianthus caryophyllus	67	☉, ✂			●	●	●					
Dianthus chinensis	68	☉, 🗑			●	●	●					
Dianthus deltoides	69	♀			●		●			●	●	
Dianthus gratianopolitanus	70	♀	●		●	●	●					
Dianthus hybridus	70	♀	●		●					●		
Dianthus plumarius	70	♀, ✂			●	●	●				●	
Dicentra eximia	71	♀, 🗑			●	●	●				●	
Dicentra spectabilis	71	♀, ✂			●	●	●				●	
Doronicum orientale 'Finesse'®	72	♀, ✂			●	●				●	●	
Doronicum orientale 'Little Leo'	72	♀			●	●				●	●	●
Doronicum orientale 'Magnificum'	72	♀, ✂			●	●						
Draba lasiocarpa	72	♀, 🗑			●	●	●			●	●	
E												
Echeveria peacockii	73	☉, 🗑			●	●	●					
Echinacea purpurea	73	♀, ✂			●	●					●	

Содержание

Род, вид, сорт	Страница	Вид растения	FastraX многолетники	ApeX семена	Для клумб	Для рабаток	Для открытого грунта	Ампельне	Выющееся	Для альпинариев	Комнатное	Раннецветущее
Echinops ritro	74	♃, ⚔			●	●	●				●	
Eragrostis abyssinica	180	☉, ⚔			●	●	●					
Erigeron aurantiacus	74	♃, ⚔				●					●	
Erigeron glaucus	74	♃, ⚔				●	●				●	
Erigeron karvinskianus	75	♃, ⚔	●		●	●	●	●				
Erigeron speciosus	75	♃, ⚔				●						
Erinus alpinus	76	♃			●	●						
Eryngium alpinum	76	♃, ⚔				●					●	
Eryngium bourgatii	76	♃, ⚔								●	●	
Eryngium planum	76	♃, ⚔				●					●	
Erysimum suffruticosum	77	♃, 🗑	●		●							
Eucalyptus gunii	77	☉, 🗑, ⚔			●							
Euphorbia marginata	77	☉, ⚔			●	●				●		
Euphorbia myrsinites, E. polychroma	78	♃			●	●	●			●		
Exacum affine	78	☉, 🗑										
F												
Festuca amethystina	183	♃					●			●	●	
Festuca glauca	183	♃					●			●	●	●
Festuca valesiaca	183	♃					●					
Fragaria vesca	186	♃						●				
G												
Gaillardia x grandiflora 'Arizona Sun'	79	♃, ⚔	●		●	●					●	
Gaillardia x grandiflora	79	♃, ⚔			●	●					●	
Galium odoratum	188	♃										
Gazania rigens	80	☉, 🗑			●	●	●					
Gentiana acaulis	81	♃, 🗑			●	●	●			●	●	
Gentiana septemfida lagodechiana	81	♃, ⚔, 🗑			●	●	●				●	
Geranium sanguineum 'Vision'®	82	♃		●	●	●	●				●	
Geum coccineum 'Cooky'	83	♃, 🗑	●	●	●	●	●				●	●
Geum hybridum	83	♃, ⚔				●						
Gomphrena globosa, G. haageana	84	☉, 🗑, ⚔			●		●					
Gypsophila repens	84	♃	●				●			●	●	
H												
Helenium autumnale	85	♃, ⚔	●		●	●	●					
Helianthemum nummularium	85	♃			●	●	●			●		
Helianthus annuus 'Big Smile'	87	☉, 🗑			●	●						
Helianthus annuus 'Florenza'	89	☉, ⚔			●							
Helianthus annuus 'Floristan'®	89	☉, ⚔			●		●					
Helianthus annuus 'Herbstschönheit'	89	☉, ⚔			●							
Helianthus annuus 'Hohe Sonnengold'	89	☉, ⚔			●							
Helianthus annuus 'Holiday'®	89	☉, ⚔			●		●					
Helianthus annuus 'Ikarus'	90	☉, ⚔			●		●					
Helianthus annuus 'Musicbox'	91	☉, ⚔			●		●					
Helianthus annuus 'Pacino'®	87	☉, 🗑			●	●						
Helianthus annuus 'Ring of Fire'	90	☉, ⚔			●							
Helianthus annuus 'Schnittgold'®	90	☉, ⚔			●							
Helianthus annuus 'Solita'	88	☉, 🗑			●	●						
Helianthus annuus 'Sonja'®	90	☉, ⚔			●		●					
Helianthus annuus 'Soraya'	90	☉, ⚔			●		●					
Helianthus annuus 'Sunrich'	91	☉, ⚔			●							
Helianthus annuus 'Sunspot'	87	☉, 🗑			●	●	●					
Helianthus annuus 'Teddybär'	87	☉, 🗑			●	●	●					
Helianthus annuus 'Valentin'®	91	☉, ⚔			●		●					
Helichrysum bracteatum	92	☉, ⚔			●		●					
Heliopsis scabra	93	♃, ⚔	●		●	●						
Heliotropium arborescens	93	☉					●					
Helleborus niger	93	♃, ⚔			●	●	●				●	
Hemerocallis Hybriden	94	♃, ⚔				●	●				●	
Heuchera sanguinea	94	♃			●	●					●	
Hordeum jubatum	180	☉, ⚔			●	●						
Hypericum polyphyllum	95	♃, 🗑					●			●	●	
Hyssopus officinalis	188	♃			●	●						
I												
Iberis sempervirens	95	♃, 🗑			●	●	●			●	●	●
Impatiens Neu Guinea-Hybriden	95	☉, 🗑					●					

Род, вид, сорт	Страница	Вид растения	FastraX многоцветники	ApeX семена	Для клумб	Для рабаток	Для открытого грунта	Ампельне	Выющееся	Для альпинариев	Комнатное	Раннецветущее
Impatiens walleriana	96	☉, ⍑			●		●					
Incarvillea delavayi	98	♃, ⚔			●	●	●			●	●	
Inula ensifolia	98	♃, ⚔	●		●	●	●			●	●	
J												
Jasione laevis	99	♃, ⚔			●	●	●			●		
K												
Kalanchoe blossfeldiana	99	☉, ⍑										
Kniphofia uvaria	100	♃, ⚔	●		●	●	●				●	
Koeleria glauca	183	♃			●	●	●			●	●	●
L												
Lagurus ovatus	180	☉			●	●	●					
Lathyrus latifolius	100	♃							●			
Lathyrus odoratus	101	☉, ⚔							●			
Lavandula angustifolia	102, 188	♃		●	●	●	●				●	
Lavatera trimestris	103	☉, ⚔			●	●	●					
Leontopodium alpinum	103	♃, ⚔			●	●	●			●	●	
Leucanthemum vulgare	103	☉, ⚔			●	●						
Leucanthemum x superbum	104	☉, ⚔	●		●	●						
Levisticum officinale	188	♃										
Lewisia cotyledon	104	♃, ⍑		●	●	●	●			●	●	
Liatris spicata	105	♃, ⚔			●	●					●	
Limonium latifolium, L. perezii	105, 106	♃, ⚔					●				●	
Limonium sinense	106	☉, ⚔										
Limonium sinuatum	107	☉, ⚔			●							
Limonium suworowii	107	☉, ⚔			●	●	●					
Limonium tataricum	105	♃, ⚔			●	●	●				●	
Linum flavum	108	♃, ⚔				●	●			●	●	
Lobelia erinus	108, 109	☉, ⍑					●	●				
Lobelia fulgens	109	♃, ⚔	●		●	●	●				●	
Lobelia speciosa 'Fan'®	110	☉, ⚔	●		●		●					
Lobelia speciosa 'Kompliment'®	111	♃, ⚔	●		●		●					
Lobelia tenuior	111	☉, ⍑					●	●				
Lobularia maritima	112	☉			●		●	●				
Lupinus polyphyllus	113	♃, ⚔			●	●	●				●	
Luzula nivea	184	♃, ⚔			●	●	●					
Lychnis (Silene) x haageana	114	♃, ⍑	●		●		●			●	●	
Lycopersicon esculentum	186	☉, ⍑										
M												
Matricaria chamomilla	187	☉										
Matthiola incana	115	⚔, ☉, ⍑			●							
Melampodium paludosum	116	☉, ⍑			●	●	●					
Melica transsilvanica	184	♃, ⚔			●	●	●					
Melinis nerviglumis	181	♃			●	●						
Melinis repens	181	☉, ⚔			●							
Melissa officinalis	188	♃			●		●					
Mentha piperita	188	♃			●		●					
Mimosa pudica	116	☉, ⍑			●	●						
Mimulus Hybriden	116	☉, ⍑					●					
Molucella laevis	117	☉, ⚔			●	●	●					
Monarda didyma	117	☉, ⚔			●	●						
Musa ensete	118	☉, ⍑			●							
Myosotis sylvatica	118	⚔, ☉, ⍑			●	●	●					●
N												
Nassella tenuissima	184	♃, ⚔	●		●							
Nemesia strumosa	119	☉, ⍑			●		●					
Nepeta faassenii	119	♃	●		●					●	●	●
Nigella damascena, N. hispanica, N. orientalis	120	☉, ⚔			●							
O												
Ocinum basilicum	187	☉			●	●						
Oenothera macrocarpa missouriensis	120	♃	●		●	●	●			●	●	
Origanum majorana	187	☉			●	●	●					
Origanum vulgare	188	♃			●	●	●					
P												
Panicum violaceum	181	☉			●							
Papaver alpinum	121	♃, ⍑	●		●		●			●		
Papaver miyabeanum	121	♃, ⍑	●		●	●				●	●	

Содержание

Род, вид, сорт	Страница	Вид растения	FastraX многоигетники	ApeX семена	Для клумб	Для рабаток	Для открытого грунта	Ампельне	Выощееся	Для альпинариев	Комнатное	Раннецветущее
Papaver nudicaule	122	♃, 🗑	●		●	●	●			●	●	
Papaver orientale	122	☉, 🗑				●						
Pelargonium peltatum	123	⊙, 🗑				●		●				
Pelargonium zonale	123	⊙, 🗑				●						
Pennisetum setaceum, P. villosum	181	⊙, ✂			●							
Penstemon barbatus	124	♃, ✂	●		●	●	●			●	●	
Penstemon digitalis	124	♃, ✂		●	●	●	●					
Penstemon hartwegii	124	⊙, ✂			●	●	●					
Pentas lanceolata	125, 126	⊙, 🗑			●	●	●					
Perilla frutescens	127	⊙, ✂			●		●					
Petunia grandiflora, P. milliflora	127-130	⊙, 🗑			●		●					
Phalaris canariensis	181	⊙			●							
Phlox drummondii	130	⊙					●					
Phlox paniculata	131	♃, ✂			●	●	●				●	
Physalis alkekengi	131	♃, ✂			●	●	●				●	
Physostegia virginiana	132	♃, ✂	●			●	●				●	
Polygonum capitatum	132	⊙				●	●	●				
Polypogon monspeliensis	181	⊙, ✂			●	●						
Potentilla nepalensis	133	♃				●	●				●	
Primula denticulata	133	♃, 🗑			●	●	●			●	●	●
Primula elatior	134	♃, 🗑, ✂			●	●	●			●	●	●
Primula malacoides	135	⊙, 🗑				●						
Primula obconica	135	⊙, 🗑				●						
Primula rosea	136	♃, 🗑, ✂			●	●	●			●	●	
Primula vialii	137	♃, ✂			●	●	●				●	
Primula x pubescens	136	♃				●	●			●	●	
Prunella grandiflora	137	♃	●		●						●	●
Pulsatilla vulgaris	138	♃			●	●	●			●	●	●
R												
Rhodochiton atrosanguineus	138	⊙, 🗑							●			
Ricinus communis	139	⊙, ✂			●		●					
Rosa chinensis	139	♃, 🗑			●	●	●				●	
Rosmarinus officinalis	188	♃			●	●	●				●	
Rudbeckia fulgida	140	♃, ✂		●	●	●					●	
Rudbeckia hirta	142-144	⊙, 🗑, ✂			●	●	●					
Rudbeckia speciosa	140	♃, ✂				●						
S												
Sagina subulata	144	♃			●	●	●			●	●	
Salvia coccinea	144	⊙					●					
Salvia farinacea	145	⊙, ✂			●		●					
Salvia officinalis	188	♃			●	●	●				●	
Salvia patens	145	⊙			●	●	●				●	
Salvia splendens	146	⊙			●	●	●					
Salvia splendens 'Salvano'	146	⊙		●	●		●					
Salvia superba	146	♃, 🗑, ✂	●		●	●	●			●	●	
Salvia viridis	147	⊙, ✂					●					
Sanguisorba minor	188	♃										
Santolina chamaecyparissus	147	♃			●					●	●	
Sanvitalia procumbens	148	⊙			●		●	●				
Sanvitalia speciosa	148	⊙		●	●		●	●				
Saponaria ocymoides	148	♃			●	●	●			●	●	
Satureja hortensis	187	⊙			●							
Saxifraga arendsii	149	♃			●	●	●			●	●	●
Scabiosa atropurpurea	149	⊙, ✂			●							
Scabiosa caucasica 'Fama'®	150	♃, ✂	●	●	●	●	●				●	
Scabiosa caucasica	150	♃, ✂	●		●	●	●				●	
Scabiosa japonica var. alpina	151	♃, 🗑	●		●	●					●	●
Scabiosa stellata	149	⊙, ✂			●							
Schizanthus wisetonensis 'Starparade'®	151	⊙, 🗑			●							
Sedum acre	152	♃			●	●	●			●	●	
Sedum reflexum	152	♃			●	●	●				●	
Sedum selskianum	152	♃	●		●	●	●				●	●
Sedum spurium	152	♃			●	●	●			●	●	●

Род, вид, сорт	Страница	Вид растения	FastraX многоцветники	ApeX семена	Для клумб	Для рабаток	Для открытого грунта	Ампельне	Выющееся	Для альпинариев	Комнатное	Раннецветущее
Sempervivum	153	♃			●	●	●			●	●	
Senecio cineraria	153	☉, ♽			●		●					
Senecio cruentus	154	☉, ♽				●						
Setaria macrostachya	181	☉			●							
Sidalcea hybrida	154	♃, ⚔	●		●		●					
Silene pendula	155	☉, ⚇, ⚔			●					●	●	●
Silene schafta	155	♃				●	●			●	●	
Silene uniflora	155	♃, ⚔	●		●		●			●	●	
Solanum pseudocapsicum	156	☉, ♽										
Solidago canadensis	156	♃, ⚔				●						
Stipa	184	♃, ⚔			●	●	●				●	
T												
Tagetes erecta	157	☉, ♽			●	●	●					
Tagetes patula	158, 159	☉, ♽			●	●	●					
Tagetes tenuifolia	159	☉			●		●					
Tanacetum parthenium, T. ptarmiciflorum	160	☉, ♽, ⚔			●		●					
Teucrium chamaedrys	160	♃					●			●	●	
Thalictrum aquilegifolia	161	♃, ⚔				●	●					
Thunbergia alata	161	☉, ♽							●			
Thymophylla tenuiloba	161	☉			●	●	●	●				
Thymus serpyllum	162	♃			●	●	●			●	●	
Thymus vulgaris	188	♃			●	●	●				●	
Tithonia rotundifolia	162	☉, ♽			●		●					
Trachelium caeruleum	162	☉, ♽, ⚔					●					
Trollius chinensis	163	♃, ⚔		●		●	●				●	
Tropaeolum majus (nicht rankend)	163	☉, ♽			●		●					
Tropaeolum majus (rankend)	163	☉							●			
Tropaeolum peregrinum	163	☉						●	●			
V												
Verbascum bombyciferum	164	♃, ⚔	●			●	●				●	
Verbena bonariensis	164	☉, ⚔			●	●	●					
Verbena canadensis	164	☉			●	●	●					
Verbena hybrida	165	☉, ♽			●	●	●					
Verbena rigida	164	☉		●	●	●	●					
Verbena speciosa	165	☉			●	●	●	●				
Verbena tenuisecta	164	☉			●			●				
Veronica incana	166	⚇, ⚔			●	●				●		
Veronica repens	166	⚇, ⚔			●					●	●	
Veronica spicata	166	♃, ⚔			●	●	●				●	
Veronica teucrium	166	⚇, ⚔			●	●				●	●	
Vinca hybrida	167	☉, ♽				●						
Viola cornuta	168	⚇, ♽			●	●	●			●		
Viola odorata	169	♃, ⚔				●	●			●	●	
Viola wittrockiana 'Bravissimo'®	174	⚇			●	●	●					
Viola wittrockiana 'Cats'	171	⚇, ♽			●	●						●
Viola wittrockiana 'Fama'®	174	⚇, ♽			●	●	●					
Viola wittrockiana 'Fancy'	173	⚇, ♽			●	●						●
Viola wittrockiana 'Joker'®	175	⚇			●	●						
Viola wittrockiana 'Padparadja'®	175	⚇			●	●	●					
Viola wittrockiana 'Riesen Vorbote'	176	⚇			●	●						
Viola wittrockiana 'Schweizer Riesen'	176	⚇, ♽			●	●						
Viola wittrockiana 'Weseler Eis'®	176	⚇			●	●						
Viscaria alpina	176	♃			●	●	●			●		●
Z												
Zea mays japonica	186	☉, ⚔			●							
Ziergräser (einjährig- u. mehrjährig)	180	♃, ☉, ⚔			●	●	●				●	
Zinnia angustifolia	177	☉, ⚔					●					
Zinnia elegans 'Benarys Riesen'	177	☉, ♽, ⚔			●		●					
Zinnia elegans 'Lilliput Gem'	178	☉, ⚔					●					
Zinnia elegans 'Oklahoma'	178	☉, ♽, ⚔			●		●					
Zinnia elegans 'Zinnita'®	179	☉, ♽			●		●					
Zinnia hybrida	179	☉					●					

Рекомендация по высадке растений

копичесво растений на 100 м² · Расстояние между растениями в см												
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
10	10 000	6 666	5 000	4 000	3 333	2 500	2 000	1 666	1 428	1 250	1 111	1 000
15	6 666	4 444	3 333	2 666	2 222	1 666	1 333	1 111	942	833	740	666
20	5 000	3 333	2 500	2 000	1 666	1 250	1 000	833	714	625	555	500
25	4 000	2 666	2 000	1 600	1 333	1 000	800	666	571	500	444	400
30	3 333	2 222	1 666	1 333	1 111	833	666	555	476	416	370	333
35	2 857	1 905	1 428	1 143	952	714	571	476	408	357	317	286
40	2 500	1 666	1 250	1 000	833	625	500	416	357	312	277	250
45	2 222	1 481	1 111	889	740	556	444	370	317	278	247	222
50	2 000	1 333	1 000	800	666	500	400	333	285	250	222	200
55	1 818	1 212	909	727	606	454	363	303	259	227	202	182
60	1 666	1 111	833	666	555	416	333	277	238	208	185	166
65	1 538	1 026	769	615	513	385	308	256	220	192	171	154
70	1 428	942	714	571	476	357	285	238	204	178	158	142
75	1 333	889	667	548	444	333	267	222	190	167	148	133
80	1 250	833	625	500	416	312	250	208	178	156	138	125
90	1 111	740	555	444	370	277	222	185	158	138	123	111
100	1 000	666	500	400	333	250	200	166	142	125	111	100



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Helianthus annuus F_1
'Солита'



Benary

Ernst Benary Samenzucht GmbH
Абонентский ящик: Postfach 11 27
34331 Hann. Muenden
Deutschland
Адрес офиса: Petersweg 72
34346 Hann. Muenden
Телефон: +49 (0) 55 41 70 09 0
Факс: +49 (0) 55 41 70 09 20
e-mail: info@Benary.de
Интернет: www.Benary.de

05.06